

保育员（中级）理论知识题库四

一、选择题（单项选择）

*1.婴幼儿的咽鼓管相对较短、粗、位置水平，当上呼吸道感染时，容易并发()。

A. 鼻炎

B.咽炎

C.中耳炎

D.喉炎

* 2.()不是婴幼儿肺的特点。

A.肺容量小

B.肺泡商量少

C.肺泡表面弹性差

D.不易患肺炎

*3.为防止气道窒息，进餐时，保育员应(

A.对吃得快的孩子进行奖励

B.让孩子细嚼慢咽

C.让孩子边吃边交流

D.大声训斥

*4 保护牙齿最好的方法是(。

A.早晚刷牙、饭后漱口

B.睡前不吃零食

C.吃粗纤维食物

D.嚼口香糖

*5.体内缺少蛋白质和铁时，会影响()的合成而发生缺铁性贫血。

A.胶原蛋白

B.纤维蛋白

C.血红蛋白

D.白蛋白

*6.为预防缺铁性贫血，应给幼儿提供蛋白质及含铁丰富的食品，如()。

A.海带、虾米

B.牛奶、动物肝脏

C.蔬菜、水果

D.面包、饼干

*7.()不是婴幼儿皮肤的特点。

A.皮肤保护机能差

B.对温度耐受性好

C.汗腺丰富

D.散热快

*8.年龄不同，睡眠时间及次数也应作相应的改变，但每个孩子夜间应保证有()。

*9.小儿各阶段之间的生长发育存在着()关系。

A.相互联系

B.相互影响

C.承上启下

D.以上都是

*10.由于小儿生长发育呈波浪式，因此必须掌握其规律。根据规律给予()，能促进小儿更好地生长发育。

A.多锻炼

B.合理喂养合理运动

C.多高跳

D.足够的营养

*11.当儿童患有急性感染性疾病时，影响最明显的是()。

A.身高

B.体重

C.精神

D.胃口

*12.为小儿测量体重要求()。

A.在饭前

B.在饭后

C.在饭前便后

D.空腹*13.测量体重的秤应选用(。

A.杠杠式秤

○B.电子秤

○C.指数秤 D.以上都不是

*14.小儿体格锻炼中发现()情况，应暂停运动，并及时采取措施。

A.面色苍白

B.大汗淋漓

C.心率过快

D.以上都是

*15.小儿户外活动时间应达到()。

A.0.5h

B.1h

C.2h

D 以上都可以

*16.空气锻炼是最简单易行的方法，可以再()中进行。

A.睡眠

B.游戏

C.学习和运动

D.以上都可以

*17.小儿的年龄越小，生长越迅速，所需热能越多，所以在几项所需热能中，小儿特有的需要是()。

A.基础代谢

B.生长发育

C.运动

D.排泄消耗

* 18.幼儿缺乏维生素 D 会得()。

A.佝偻病

B.干眼病

C.脚气病

D.夜盲症

*19.()和磷是组成骨骼的主要成分，在乳制品、蛋黄和海产品中含量较丰富。

A.钠

B.铁

C.锌

D.钙

* 20.膳食纤维的作用是()。

A.促进肠蠕动

B.有利排便

C.清洁肠道

D.以上都是

*21.食物品种多样化，合理搭配可以使食品中的营养素有()作用。

A.易消化 B.互补 C.易吸收 D.互换

*22.每天早晨用抹布擦拭活动室门窗、物体表面的灰尘，是对环境做()工作。

A.消毒

B.灭菌

C.清洁

D.整理

*23.酸奶中含有多种益生菌有助于人体肠道菌群的平衡，这是利于微

生物的()关系。

- A.排斥
- B.共生
- C.拮抗
- D.协同

* 24.不同的传染病科采用不同的隔离方式，腮腺炎可采用()。

- A.住院隔离
- B.观察室隔离
- C.家庭隔离
- D.班内隔离

* 25.细菌性痢疾的医学观察期是。

- A.7 天
- B.14 天
- C.21 天
- D.30 天

*26.发生肠道传染病后，发病班级的餐具应() 。

- A. 先清洗后消毒
- B. B.先消毒后清洗
- C.先消毒后清洗再消毒
- D.先清洗后消毒再清洗

* 27.下列不属于特殊传染病的是(。

- A.结核病

- B.菌痢
- C.病毒性肝炎
- D.艾滋病

*28.猩红热好发于(年龄段的儿童。

- A.1 岁以上
- B.2 岁以上
- C.3 岁以上
- C. 以上都是

D. * 29.引起流行性乙型脑炎的病毒式由蚊虫叮咬而进入人体的,好发于()季节。

- A.冬季
- B.春季
- C.夏季
- D.秋季

*30.以下属于呼吸道传染病的是()。

- A.甲型肝炎
- B.菌痢
- C.急性流行性结膜炎
- D.流行性感冒

* 31.预防感染性感染性腹泻应做到()洗手。

- A.饭后便前
- B.饭前便后

我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。——《白居易》

C.便前饭后

D.饭后便前

*32.儿童刚入园所，由于生活环境和习惯的改变，可引起()便秘。

A.长期

B.短期

C.习惯性

D.永久性

* 33.贫血的小儿应多吃()。

A.鸡肝、鸭肝

B.猪、牛、羊肉

C.血

D.A+B+C

* 34.引起佝偻病的原因是(

A.遗传

B.坚持锻炼

C.活动过少

D.营养过盛

* 35. 蛔虫卵主要(，亦可岁灰尘飞扬被吸入咽部吞下。

A.经口入手

B.经手入口

C.以灰尘入口

D.经虫叮咬

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

*36.幼儿在挥舞木棍时，丝毫不会考虑对别人有什么危害，这是因为幼儿()

- A.顽皮
- B.好动
- C.对危险因素缺乏认识
- D.运动机能不完善

*37.幼儿户外活动场地应做到宽敞，平整，最好铺设()，减少运动中的损伤

- A.水泥地
- B.地毯
- C.塑胶地
- D.沙地

*38.从安全角度考虑，玩具的体积和重量的关系是()

- A.体积不宜太大，重量不一太重
- B.体积不宜太小，重量不一太重
- C.体积不宜太大，重量不宜太轻
- D.体积不宜太小，重量不宜太轻

*39.()适宜3岁幼儿食用

- A.杏仁，花生
- B.汤团，果冻
- C.薯片，瓜子
- D.牛奶，水果

*40.加强门卫管理，在幼儿入园后及时关上大门和门边，是预防()的有效措施

- A.摔伤
- B.走失
- C.坠落
- D.烫伤

*41.进餐时，保育员要做好巡视工作，并教育幼儿()

- A.吃饭速度
- B.争做第一名
- C.边吃边聊
- D.细嚼慢咽

*42.盥洗室的地面应保持干燥，在每次组织盥洗后，保育员都应及时将地面拖干净，以防()

- A.滑到
- B.擦伤
- C.割伤
- D.烫伤

*43.给药必须做“三查四对”是指()

- A.拿药时，倒药时，对姓名，药名
- B.拿药时，倒药时，放药时对姓名，药名，计量，服药时间
- C.倒药时对姓名，药名，剂量，时间
- D.拿药放药时对姓名，药名

*44.给幼儿滴鼻药应让幼儿(

- A.仰卧
- B.坐位
- C.头垫枕
- D.鼻孔朝天

*45()会使小儿脉搏加速

- A 哭吵
- B.安静活动
- C.睡眠
- D.以上都是

* 46.晨检发现可疑传染病患儿时应(。

- A.立即隔离疑似病人
- B.接触地点进行消毒
- C.发给观察牌进班观察
- D.A 和 B

*47.幼儿一般应 ()一次，为幼儿定期检查视力，以便及早发现弱视，及时矫治

- A.3 个月
- B. 半年
- C. 1 年
- D. 2 年

*48.先天性心脏病的幼儿适宜进行的活动是

A.竞争性游戏

B.跑步

C.幼儿体操

D.跳跃

*49.《中华人民共和国未成年人保护法》的适用年龄范围是(

A.未满 16 周岁的公民

B.未满 18 周岁的公民

C.未满 20 周岁的公民

D 未满 19 周岁的公民

* 50.幼儿园对家长的育儿指导措施错误的是()

A. 收取费用

B. B.举办讲座

C. C.亲子同乐

D. D.专家咨询

* 51. 餐桌消毒常用的消毒剂为() 。

A、浓度为 5%的过氧乙酸

B、浓度为 5%的来苏儿

C、浓度为 0.2%的过氧乙酸

D、浓度为 5%的漂白粉溶液

*52. 门拉手的消毒可采用()的方法。

A、消毒剂喷雾

B、清水擦拭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036045225052010105>