

2021 年考研西医综合真题及答案

1. 下列关于内环境概念的描述, 说法错误的是

- A. 机体内全部的液体
- B. 细胞赖以生存环境
- C. 其理化性质变动很小
- D. 生物进化的结果

【正确答案】 A

2. 实测神经细胞静息电位略小于钾离子平衡电位的主要原因是

- A. 在钾外流的背景下存在少量的钠内流
- B. 在钾外流背景下存在少量的钙内流
- C. 在钾外流背景下存在一定量的氯内流
- D. 在钾外流背景下存在钠泵的生电作用

【正确答案】 A

3. 神经-肌接头兴奋传递过程, 终板电位以钠为主的主要原因

- A. 阳离子中钠的活动度最大
- B. 阳离子中钠的直径最小
- C. Ach 阳离子通道钠的通透性最大
- D. 静息电位钠的内向驱动力大于钾的外向驱动为

【正确答案】 D

4. 血管性血友病的发病机制

- A. FVIII 因子缺陷
- B. PF4 缺乏
- C. VWF 缺陷
- D. 维生素 k 缺乏

【正确答案】 C

5. 心室压力容积环向左扩大, 收缩末期心室压力容积关系曲线增大, 表示心功能

- A. 前负荷增加
- B. 后负荷增加
- C. 心室顺应性下降
- D. 心肌收缩力增强

【正确答案】 C

6. 长期卧床的人突然起身后感头晕, 眼前发黑, 其原因是?

- A. 循环血量下降
- B. 静脉回流下降
- C. 心泵功能下降
- D. 降压的敏感性下降

【正确答案】 B

7. 肺通气比血流比值异常会导致缺氧, 下列与原因无关的是

- A. 二氧化碳溶解系数远大于氧的溶解系数
- B. 在肺静脉血和动脉血中氧的分压差大于二氧化碳的分压差
- C. 氧解离离线上段平坦再增加肺通气, 也不会导致氧饱和度上升

D. 外周化学感受器对缺氧敏感, 对二氧化碳易适应

【正确答案】 D

8. 胆石症患者在切除胆囊后可能会发生下列变化

- A. 不会再发生胆道梗阻
- B. 可能减少胆汁分泌的量
- C. 可能会引起消化道溃疡
- D. 可能会影响脂肪吸收和消化

【正确答案】 D

9. 物理热价与生理热价不同的物质是

- A. 糖
- B. 蛋白质
- C. 动物脂肪
- D. 植物脂肪

【正确答案】 B

10. 正常人下列何种情况可使尿量无明显变化

- A. 一次性饮清水 1000ml
- B. 一次性饮糖水 1000ml
- C. 一次性饮生理盐水 1000ml
- D. 一次性静脉输入生理盐水 1000ml

【正确答案】 C

11. 新斯的明治疗重症肌无力的作用机制

- A. 模拟乙酰胆碱
- B. 抑制胆碱酯酶
- C. 激活乙酰胆碱受体通道
- D. 增大终板电位幅度

【正确答案】 B

12. 临床上应用呋塞米导致感音性耳聋的原因是

- A. 损伤内毛细胞
- B. 损伤外毛细胞
- C. 阻止内淋巴细胞高钾离子的生成
- D. 阻止听神经传导

【正确答案】 C

13. 使用左旋多巴治疗帕金森病时, 下列症状不能缓解的是

- A. 动作缓慢
- B. 静止性震颤
- C. 肌张力增高
- D. 随意运动减少

【正确答案】 B

14. 胰岛素样生长因子-1 水平过高, 会导致以下哪种疾病

- A. 侏儒症
- B. 呆小症
- C. 糖尿病
- D. 肢端肥大症

【正确答案】 D

15. 实验切除动物双侧肾上腺会导致动物很快死亡的原因

- A. 缺乏肾上腺髓质素
- B. 缺乏肾上腺髓质皮质激素
- C. 缺乏肾上腺皮质激素
- D. 缺乏血管紧张素 2[正确答案 C

16. 妊娠期妇女通过胎盘合成和分泌的雌激素是

- A. 雌酮
- B. 雌二醇
- C. 雌三醇
- D. 乙烯雌酚

【正确答案】C

17. 亮氨酸拉链属于蛋白质的哪种结构

- A. 一级结构
- B. β -转角
- C. 模体
- D. 结构域

【正确答案】C

18. 酶促反应中的“临近效应”的含义

- A. 底物在酶的活性中心相互临近
- B. 醇和辅酶之间的相互临近
- C. 商活性基团之间的相互临近
- D. 酶和抑制物之间的相互临近

【正确答案】A

19. 寡霉素与 ATP 合酶的结合位点是

- A. α 亚基
- B. β 亚基
- C. 亚基
- D. c 亚基

【正确答案】D

20. 肌 L 肉组织氨基酸脱氨基的机制是

- A. 甲硫氨酸循环
- B. 三羧酸循环
- C. 丙氨酸-葡萄糖循环
- D. 乳酸循环

【正确答案】C

21. 一碳单位直接参与合成的是

- A. dCMP
- B. dAMP
- C. dTMP
- D. dGMe

【正确答案】C

22. 具有逆转录酶活性的酶

- A. 光修复酶
- B. DNA 聚合酶

- C. 端粒酶
- D. RNA 聚合酶

【正确答案】B

23. 真核生物生成单顺反子 mRNA 的意思

- A. 一个 DNA 转录生成一个 RNA
- B. 一个 RNA 生成一条肽链
- C. 一个 RNA 生成一个 eDNA
- D. 不同生物生成同一肽链

【正确答案】A

24. 由 RNA 起催化作用的是

- A. 氨基酰 tRNA 转移酶
- B. 脱乙酰基酶
- C. 二硫键异构酶
- D. 肽酰转移酶

【正确答案】D

25. 下列能够调控真核生物转录的 DNA 元件中

- A. 增强子
- B. 操纵子
- C. CAP 结合位点
- D. 阻遏蛋白基因

【正确答案】A

26. 符合“转染”含义技术操作的是

- A. 用电穿孔技术将外源 DNA 转入大肠埃希菌
- B. 用质粒将外源 DNA 转入动物细胞
- C. 用病毒载体将外源 DNA 转入大肠埃希菌
- D. 用转基因技术克隆动物

【正确答案】B

27. 能与富含脯氨酸的蛋白质结合的分子结构域是

- A. SH2
- C. SH3
- C. PH
- D. PTR

【正确答案】B

28. 在基因分子上游插入沉默子可能出现的结果是

- A. 编码的肽链缩短
- B. 终止密码提前
- C. 基因转录减慢
- D. 点突变率增加

【正确答案】C

29. 关于化生的说法错误的是

- A. 由成熟细胞转变而致
- B. 可增强局部抵御刺激的能力
- C. 通常发生在同源细胞之间
- D. 可发生在上皮组织或间叶组织

【正确答案】 A

30. 细小动脉管壁常见的坏死是

- A. 凝固性坏死
- B. 液化性坏死
- C. 脂肪坏死
- D. 纤维素样坏死

【正确答案】 D

31. 与黏膜相关淋巴组织淋巴瘤发生密切关系的细菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 草绿色链球菌
- C. 幽门螺旋杆菌
- D. 大肠杆菌

【正确答案】 C

32. 急性重型肝炎残留少量肝细胞, 主要分布于

- A. 中央静脉周围
- B. 肝小叶周边上
- C. 全小叶随机分布
- D. 残留的网状支架旁

【正确答案】 B

33. 女, 45 岁。自觉双手指关节疼痛 2 年, 近半年感觉关节僵直, 血清学检查: 类风湿因子阳性。该患者关节腔内主要病理变化是

- A. 大量嗜酸性粒细胞浸润
- B. 肉芽肿性炎
- C. 非化脓性增生性滑膜炎
- D. 浆液渗出性炎

【正确答案】 C

34. 胃痛的好发部位

- A. 胃前壁
- B. 胃后壁
- C. 胃窦
- D. 胃底

【正确答案】 C

35. 关于心衰细胞叙述正确的是

- A. 心衰时出现的形态特殊的心肌细胞
- B. 肺内吞噬碳末的巨细胞
- C. 肺内吞噬含铁血红蛋白的巨噬细胞
- D. 肺内吞噬脂质的巨噬细胞

【正确答案】 C

36. 透明血栓的主要成分是

- A. 纤维蛋白
- B. 血小板
- C. 红细胞
- D. 白细胞

【正确答案】 A

37. 导致支气管扩张症的主要病理改变是 e 中

- A. 支气管纤毛柱状上皮的鳞状上皮化生
- B. 支气管壁粘液腺增多
- C. 支气管壁结构破坏
- D. 肺间质纤维化

【正确答案】 C

38. 电镜下驼峰样免疫物质沉积

- A. 急进型肾小球肾炎
- B. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎
- C. 系膜增生性肾小球肾炎
- D. 膜性增生性肾小球肾炎

【正确答案】 B

39. 符合绒毛膜癌病理学变化的是

- A. 肿瘤自身无间质血管
- B. 癌组织出血坏死不明显
- C. 癌细胞形成绒毛结构
- D. 滋养层细胞增生

【正确答案】 A

40. 间质内有淀粉样物质沉积的甲状腺肿瘤是

- A. 未分化癌
- B. 髓样癌
- C. 滤泡状癌
- D. 乳头状癌

【正确答案】 B

41. 符合肝细胞性黄疸检验的是

- A. 尿胆素原减少
- B. 尿胆红素阳性
- C. 血结合胆红素显著减少
- D. 血非结合胆红素显著减少

【正确答案】 B

42. 诊断慢性阻塞性肺气肿的肺功能标准

- A. 吸入支气管舒张剂后 $FEV_1 < 80\%$
- B. 吸入支气管舒张剂后 $FEV_1 < 70\%$
- C. 吸入支气管舒张剂后 $FEV_1/FVC < 80\%$
- D. 吸入支气管舒张剂后 $FEV_1/FVC < 70\%$

【正确答案】 D

43. 男，23 岁，接触花粉后突发憋喘半小时，家人送至急诊，既往体健。查体：意识模糊，双肺呼吸音明显减低，心率 135 次/分，律齐，鼻导管吸氧 $5L/min$ 情况下查动脉血气

分析示 $PH 7.1$ ， $PaCO_2 92mmHg$ ， $PaO_2 65mmHg$ ，下一步治疗措施错误的是

- A. 雾化吸入支扩
- B. 静脉滴注糖皮质激素
- C. 气管插管机械通气
- D. 静脉滴注大剂量利尿剂

【正确答案】D

44. 血源性肺脓肿的致病菌

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 军团菌
- C. 厌氧菌
- D. 铜绿假单胞菌

【正确答案】A

45. 男性, 60 岁, 高血压病 20 余年, 最高血压 190/100mmHg, 无自觉不适, 未规律口服降压药物, 未院健康体检, P:62 次/分, 血压 180/100mmHg, 心肺(-), 化验:尿蛋白+, 血 TC:6.4mmol/L, HDL-c : 0.98mmol/L, LDL-c: 4.96mmol/L, glu8.6mmol/L, 血肌酐 122umol/L, UA365umol/L, 该病人首选降压药物为

- A. 培哚普利
- B. 氨氯地平
- C. 吲达帕胺
- D. 比索洛尔

【正确答案】B

46. 男性, 60 岁, 因((凌晨 5:00) 在睡眠中突发心前区疼痛伴大汗, 自服速效救心丸无效, 急诊入院(晨 7:00)做心电图检查示:II、III、avF 导联 ST 段抬高 0.2-0.4mV, 采血检查, 下列

指标最可能升高的是

- A. 肌钙蛋白 T
- B. 肌酸激酶同工酶 CK-MB
- C. 谷草转氨酶
- D. 肌红蛋白

【正确答案】D

47. 下列急性心肌炎最不可能发生的并发症

- A. 心脏压塞
- B. 猝死
- C. 急性肺水肿
- D. 酷似心肌梗死的临床表现

【正确答案】A

48. 女性, 46 岁。因活动后心前区疼痛 2 个月, 每次自含酸甘油无效来诊。既往有高血压病, 关节炎病史。查体: P:80 次/分. BP: 160/85mmHg, BMI: 35kg/m, 甲状腺无肿大双肺 kS, 心界向左扩大, 心律整, 心尖部 S1 减弱, 可闻及舒张早中期隆隆样杂音, 胸骨左缘第 3 肋间可闻及舒张期叹气样杂音, 双下肢水肿(+). 导致该患者心前区疼痛的最主要病

因是

- A. 冠心病, 高血压病
- B. 肥厚性心肌病
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全

【正确答案】D

49. 下列不属于胃食管反流病并发症的是

- A. 食管狭窄

- B. 食管憩室
- C. 上消化道出血
- D. Barrett 食管

【正确答案】B

50. 男性, 25 岁, 2 年来反复出现上腹痛。一般多发生于进餐后, 1 天来呕吐咖啡样渣样胃内容物伴黑便 1 次, 既往无肝炎病史, 查体 BP100/60mmHg, 心率 92 次/分, 心率整, 上腹部轻压痛, 肝脾肋下未触及, 最可能的诊断是

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡出血
- C. 胃癌出血
- D. 肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血

【正确答案】A

51. 女, 41 岁, 腹胀。低热三个月。右侧附件结核 2 年, T 37.8 心肺未见异常。腹壁柔韧感, 腹部轻压痛, 肝脾触诊不满意, 腹都移动性浊音阳性, 首选的检查是

- A. 腹部 B 超
- B. 腹部 CT
- C. 腹水穿刺
- D. 妇科检查

【正确答案】C

52. 女性, 月经时长近 5 年来周期 20 天左右, 每次 7-8 天, 量多, 心悸、乏力, 既往有关节炎病史, 心尖部听诊可闻及收缩期 3/6 级杂音, 首先考虑的诊断是

- A. 风湿热
- B. 结核
- C. 缺铁贫血
- D. 甲减

【正确答案】A

53. 女性 26 岁, 乏力头晕 2 年, 既往无特殊病史, 检查 Hb65g/L, RBC $2.8 \times 10^{12}/L$, MCV69fL, MCHC28%, Ret1.2%, WBC $4.5 \times 10^9/L$, Plt $350 \times 10^9/L$ 用铁剂治疗后最先上升的指标

- A. RBC
- B. HB
- C. MCV
- D. Ret

【正确答案】D

54. Cushing 综合征一侧肾上腺皮质腺瘤、行单侧肾上腺皮质切除后。激素替代维持治疗一般需要多久?

- A. 一周
- B. 一个月
- C. 两个月
- D. 6 个月到 1 年以上

【正确答案】D

55. 贝赫切特病特异性临床表现有;

- A. 颊部形红斑
- B. 腮腺肿大

- C. 针刺阳性
- D. 腹部血管杂音

【正确答案】 C

56. 下列属于 ANCA 相关血管炎的是;

- A. 显微镜下多血管炎
- B. Ig 人血管炎
- C. SLE 相关血管炎
- D. 类风湿关节炎相关血管炎

【正确答案】 A

57. 下列关于术前准备叙述中、错误的是 rR

- A. 高血压患者应继续服用抗压药物, 避免戒断综合症
- B. 确有凝血障碍者, 择期手术前应做相应治疗
- C. 肾功能重度损害者, 在有效透析疗法处理下可耐受手术
- D. 糖尿病人术前需将血糖挑制到正常

【正确答案】 D

58. 下列不需要使用全胃肠外营养的情况是

- A. 短肠综合征
- B. 溃疡性结肠炎长期腹泻
- C. 重症急性胰腺炎
- D. 胆囊造瘘术后

【正确答案】 D

59. 麻醉平面到达脐部, 对应的脊神经节段

- A. T6
- B. T8
- C. T10
- D. T12

【正确答案】 C

60. 女性, 32 岁。间断性吞咽困难和呕吐 10 年, 上消化道造影食管扩张, 蠕动减弱, 钡餐呈鸟嘴征, 狭窄部黏膜尚光滑, 应选择的手术方式是

- A. 食管大部分切除+胃代食管
- B. 食管下部, 贲门肌层切开
- C. 食管切除+近段胃切除
- D. 胃镜下胃底折叠术

【正确答案】 B

61. 关于乳腺癌血行转移的叙述错误的是

- A. 癌细胞可经淋巴途径进入静脉
- B. 癌细胞可直接侵入血循环
- C. 血行转移只发生在肿瘤晚期
- D. 最常见的远处转移部位依次为骨肺肝

【正确答案】 C

62. 男性, 55 岁, 因腹痛 1 个月来诊, 肠镜发现乙状结肠肿物, 病理示中分化腺癌, 腹部 CT 示; 乙状结肠肿物, 5cmx4cm, 侵及浆膜. 未见转移灶. 肝左叶有一占位性病变, 有强化, 治疗首选:

- A. 结肠癌根治性术

- B. 结肠癌根治术同时切除肝左叶
- C. 全身化疗
- D. 局部化疗

【正确答案】 B

63. 患者男，65 岁，上腹部不适食欲下降两个月，皮肤粘膜出现黄染，并进行性加重，粪便灰白尿色深，查体，肝脾未触及，右肋缘下可触及一肿大的半圆形肿物，无疼痛，血 TBIL230，DBI. 186，最有可能的诊断是

- A. 急性肝炎
- B. 胆总管结石
- C. 胰头癌
- D. 原发性肝癌

【正确答案】 C

64. 下列不属于绞窄性肠梗阻的典型临床表现的是

- A. 早期出现休克
- B. 腹胀
- C. 腹膜炎体征
- D. 血便

【正确答案】 C

64. 下列不属于绞窄性肠梗阻的典型临床表现的是

- A. 早期出现休克
- B. 腹胀
- C. 腹膜炎体征
- D. 血便

【正确答案】 B

65. 站立前期先天性髋关节脱位的典型体征

- A. 屈髋畸形
- B. 摇摆式跛行
- C. 骨盆挤压实验(+)
- D. 弹入实验(Ortolani+)

【正确答案】 D

66. 单纯腰椎间盘突出症患者行经皮腰椎间盘切除术的适应证是

- A. 脱出型
- B. 经骨突出型
- C. 膨出型
- D. Schmorl 结节型

【正确答案】 A

67. 骨盆骨折最常见的并发症是

- A. 尿道损伤。
- B. 膀胱损伤
- C. 肾脏损伤
- D. 直肠挫伤

【正确答案】 A

68. 男性，28 岁，半小时前在山区修建公路时突发上腹部剧痛，持续加重，近一年来患者常有空腹上腹痛。此时工地医师给患者做体格检查时，下列对明确病因诊断最有价值的体

征是

- A. 心率加快至 106 次/分
- B. 上腹部压痛
- C. 肠鸣音减弱
- D. 肝浊音界消失

【正确答案】D

69. 男性, 28 岁, 半小时前在山区修建公路时突发上腹部剧痛, 持续加重, 近一年来患者常有空腹上腹痛。根据上述体征, 可初步判断患者的疾病是

- A. 急性心肌梗死
- B. 消化道穿孔
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎

【正确答案】B

70. 女性, 35 岁, 因两个月来渐进性乏力、心悸、头晕来诊。平素食欲差, 近五年来月经长期每 20 天左右一次, 每次持续 7-8 天, 量多。查体: 王 37.28

C. P 162 次/分, BP108/68mmHg, 皮肤干燥, 睑结膜苍白, 双肺查体(-5, 心率整, 心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音, 肝脾肋下未及, 下肢不肿。根据上述病史级体征, 最可能诊断

- A. 急性风湿热
- B. 结核病
- C. 缺铁性贫血
- D. 甲状腺功能减退症

【正确答案】C

71. 女性, 35 岁, 因两个月来渐进性乏力、心悸、头晕来诊, 平素食欲差, 近五年来月经长期每 20 天左右一次, 每次持续 7-8 天, 量多。查体: T37.2

C. P 162 次/分, BP108/68mmHg, 皮肤干燥, 睑结膜苍白, 双肺查体(-), 心率整, 心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音, 肝脾肋下未及, 下肢不肿, 该患者还可能出现的体征是

- A. 杵状指
- B. 爪形手
- C. 匙状指
- D. 手末端指节肿大

72. 女性, 35 岁, 因两个月来渐进性乏力、心悸、头晕来诊, 平素食欲差, 近五年来月经长期每 20 天左右一次, 每次持续 7-8 天, 量多。查体: T37.2℃. P 162 次/分, BP108/68mmHg, 皮肤干燥, 睑结膜苍白, 双肺查体(-), 心率整, 心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音, 肝脾肋下未及, 下肢不肿。下列不支持上述诊断的外周血检查结果是

- A. 红细胞形态大小不等
- B. 血小板可增高
- C. 白细胞可正常
- D. 可见镰形红细胞

【正确答案】D

73. 女, 56 岁, 劳累后发热, 最高 39℃, 多汗、纳差, 体重下降 2kg, 右侧胸痛, 夜间难以入眠, 外院给予哌拉西林和??, 既往史: 类风湿关节炎 20 年, 服用来氟米特和强的松治疗, 病情稳定, 右侧胸腔积液检查, 比重大于 1.038, 白细胞大于 16800* 10⁶, 多核细胞 ≥80%, 单核细胞大于 20%, LDH >1167, ADA ≥1160 患者最可能的诊断是

- A. 结核性胸腔积液
- B. 恶性胸腔积液
- C. 脓胸
- D. 类风湿相关性胸腔积液

【正确答案】 C

74. 56 岁，劳累后发热，最高 39℃，多汗、纳差，体重下降 2kg，右侧胸痛，夜间难以入眠，外院给予哌拉西林他唑巴坦，既往史：类风湿关节炎 20 年，服用来氟米特和强的松

治疗，病情稳定，右侧胸腔积液检查，比重大于 1.038，白细胞大于 16800*10⁶，多核细胞大约 80%，单核细胞大于 20%，LDH >1167, ADA>116。为明确诊断，首选检查是

- A. 胸水找肿瘤细胞
- B. 胸水细菌培养+药敏试验
- C. 胸水结核杆菌培养
- D. 胸水找类风湿因子

【正确答案】 B

75. 56 岁，劳累后发热，最高 39℃、多汗、纳差。体重下降 2kg，右侧胸痛。夜间难以入眠，外院给予哌拉西林他唑巴坦，既往史；类风湿关节炎 20 年，服用来氟米特和强的松治疗，病情稳定，右侧胸腔积液检查，比重大于 1.038，白细胞大于 16800*10⁶，多核细胞>80%，单核细胞大于 20%，LDH >1167，ADA>116。最适合的治疗是

- A. 全身化疗
- B. 胸腔积液引流
- C. 全身使用四联抗结核药物治疗
- D. 增加强的松剂量或加用免疫抑制剂治疗

【正确答案】 B

76. 男性，66 岁。半年来劳累后心悸、气短。1 周来发热，咳嗽、心悸、气短症状明显加重，夜间不能平卧，尿少，下肢水肿。既往有高血压，心脏扩大病史。查体：T38.1℃，P88 次/分，R18 次/分，BP110/70mmHg。半卧位，颈静脉充盈，双肺均可闻及湿罗音，心界向左扩大，心率 118 次/分，心律绝对不齐，心健部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肢

四陷性水肿(++)。超声心动图题诗：左房、左室扩大，左室壁弥漫性运动障碍，LVEF 40%。该患者目前最主要的诊断是

- A. 瓣膜性心脏病
- B. 原发性高血压
- C. 扩张型心肌病
- D. 冠心病

【正确答案】 C

77. 男性，66 岁。半年来劳累后心悸、气短。1 周来发热，咳嗽、心悸、气短症状明显加重，夜间不能平卧，尿少，下肢水肿。既往有高血压，心脏扩大病史 R 查体：T38.1℃，P88 次/分，R18 次/分，BP110/70mmHg。半卧位，颈静脉充盈，双肺均可闻及湿罗音，心界向左扩大，心率 118 次/分，心律绝对不齐，心健部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肢凹陷性水肿(++)。超声心动图题诗：左房、左室扩大，左室壁弥漫性运动障碍，LVEF 40%。该患者即刻选择的治疗药物，不正确的是

- A. 利尿剂
- B. β 受体拮抗剂

C. 抗凝剂

D. ACEI

【正确答案】 B

78. 男性, 66 岁。半年来劳累后心悸、气短。1 周来发热、咳嗽、心悸、气短症状明显加重, 夜间不能平卧, 尿少, 下肢水肿, 既往有高血压, 心脏扩大病史。查体: T38.1℃, P88 次/分, R18 次/分, BP100/70mmHg。半卧位, 颈静脉充盈, 双肺均可闻及湿罗音, 心界向左扩大, 心率 118 次/分, 心律绝对不齐、心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音, 双下

肢凹陷性水肿(++)。超声心动图提示:左房、左室扩大,左室壁弥漫性运动障碍,LVEF 40%。该患者经治疗 1 周后,体温正常,心悸、气短症状缓解,夜间可平卧,下肢水肿消失。查体:P68 次分,B0 125/70mmHg,左下肺偶闻及湿罗音,心率 92 次 1 分,心律绝对不齐,杂瓷同前。对该患者在长期治疗心功能不全的方案中,不正确的是

A. 坚持服用 ACEI 或 ARB 类药物

B. 选用那受体拮抗剂

C. 选用醛固酮受体拮抗剂

D. 选用 CCB

【正确答案】 D

79. 男性, 55 岁。发热, 呕吐, 腹泻 1 天, 烦躁不安, 意识障碍 1 小时急诊入院。查体: T 37.8°C, P 90 次/分, BP 110/70mmHg, 神志模糊, 颈部及前胸皮肤可见蜘蛛痣, 巩膜轻度黄染, 心肺未见异常, 腹软, 肝肋下未触及、脾肋下 2cm, 血常规: Hb 112g/L, WBC 3.43*10⁹/L, PLT 98*10⁹/L; 尿常规: 蛋白(D), 糖(+), 沉渣镜检(-)。最可能的诊断是

A. 肝性脑病”

B. 糖尿病南症酸中毒

C. 脑血管病

D. 尿毒症

【正确答案】A

80. 男性, 55 岁。发热, 呕吐, 腹泻 1 天, 烦躁不安, 意识障碍 1 小时急诊入院。查体: T37.8°C, P 90 次/分, BP 110/70mmHg, 神志模糊, 颈部及前胸皮肤可见蜘蛛痣, 巩膜轻度黄染, 心肺未见异常, 腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm, 血常规: Hb 112g/L, WBC 3.4*10⁹/L, PLT 98*10⁹/L; 尿常规: 蛋白(±), 糖(+), 沉渣镜检。对确诊最有价值的检查是

A. 血糖

B. 血氨

C. 血肌酐

D. 头颅 CT

【正确答案】 B

81. 男性, 55 岁。发热、呕吐、腹泻 1 天, 烦躁不安, 意识障碍 1 小时急诊入院。查体: T37.8°C, P 90 次/分, BP 110/70mmHg, 神志模糊, 颈部及前胸皮肤可见蜘蛛痣, 巩膜轻度黄染, 心肺未见异常, 腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm, 血常规: Hb 112g/L, wBC34*10⁹/L, PLT 98*10⁹/L; 尿常规: 蛋白(±), 糖(+), 沉渣镜检(-)。为缓解患者的躁动, 首选的治疗药物是

A. 巴比妥

B. 地西洋

C. 水合氯醛

D. 异丙嗪

【正确答案】 | D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036200224240010111>