

2025 抗菌药物临床应用指导原则考试题 及答案

- 1.氨基糖苷类的抗结核药是（）A、链霉素
- 2.（）是最常见的社区获得性感染 A、急性上呼吸道感染
- 3.氨基糖苷类抗生素不宜与呋塞米合用的原因是（）A、呋塞米增加其耳毒性
- 4.对尚未发生侵袭性真菌感染的高危患者进行（）A、预防性治疗
- 5.对厌氧菌无效的药物是（）A、克林霉素
- 6.对于实施隧道式血管导管或药盒置入术的患者，建议（）A、不推荐预防用药
- 7.对于实施主动脉内支架植入术的高危患者，建议预防性使用抗菌药物（）次 A、1
- 8.关于白喉抗毒素说法正确的是（）A、青霉素不可代替白喉抗毒素
- 9.关于脓胸的治疗原则，叙述有误的是（）A、慢性脓胸患者可口服给药，若无好转可静脉给药
- 10.关于社区获得性肺炎的治疗原则，叙述有误的是（）A、重症患者选用口服药，若临床表现无显著改善可肌肉注射
- 11.关于碳青霉烯类抗菌药物在儿童群体中应用说法错误的是（）A、大于6月龄儿童的碳青霉烯类抗菌药物临床应用

适应证与成人相 12.关于头霉素类药物的使用考前须知说法错误的是（） A、不举荐头孢西丁用于<6个月的婴儿

13.经验治疗动物咬伤，宜选药物为（） A、阿莫西林/克拉维酸 14.抗菌药物品种的选用，准绳上应根据病原菌种类及病原菌对抗菌药物敏感性，即（）而定 A、XXX 尝试结果

15.可诱发红斑狼疮的抗真菌药物是（） A、灰黄霉素

16.流行性脑脊髓膜炎患者家庭的儿童，可预防性给予下列哪种抗菌药物

A、XXX

17.葡萄球菌性烫伤样综合征的病原体为（） A、产毒素金黄色葡萄球菌

18.侵袭性真菌病的治疗疗程平日较长，需求考虑患者的免疫状态、熏抱病原菌和药物种类，一般在（）周或以上 A、6~12

19.时间依赖性抗菌药如青霉素类、头孢菌素类和其他 β -内酰胺类、红霉素、克林霉素等，应（）给药 A、一日多次

20.施行心脏射频消融术的患者，发起防备性使用（）类抗菌药物 1次 A、第一代头孢菌素

21.使用（）时，应注意抗生素相关腹泻和假膜性肠炎的发生，如有可疑应及时停药 A、克林霉素

22.鼠咬伤所致的皮肤、软组织感染可选药物（）A、多西环素
23.四环素用于（）A、斑疹伤寒

24.碳青霉烯类抗菌药物临床合理应用的重点不包括（A、多重耐药定植菌或携带状态，不宜使用碳青霉烯类抗菌药物治疗

25.碳青霉烯类抗菌药物使用量增加的主要原因不包括（）
A、免疫抑制治疗患者减少

26.下列关于青霉素类药物的使用，叙述错误的是（）A、青霉素钾盐应快速静脉注

27.下列关于碳青霉烯类药物使用注意事项描述错误的是（）
A、本类药物不宜用于治疗轻症感染，可作为预防用药

28.以下关于吸入炭疽的治疗说法错误的是（）A、宜选磺胺类治疗
29.以下关于中性粒细胞减少伴发热说法错误的是（）
A、常见病原体以病毒为主

30.下列关于中性粒细胞缺乏伴发热说法错误的是（）A、常见病原体以病毒为主

31.下列属于引起细菌性眼内炎的革兰阴性杆菌是（）A、铜绿假单胞菌

及肠杆菌科细菌

32.医疗机构应每月对院、科两级抗菌药物临床应用情况开展调查，项目不

包括（）A、II、III类切口手术抗菌药物预防使用率和品种选择，给药时

机和使用疗程合理率

33.以下对于抗菌药物给药剂量的认识，错误的是（）A、治疗单纯性下

尿路熏染时，应应用可耐受的最大剂量

34.以下哪类手术II、III类切口可能含有革兰阴性杆菌、厌氧菌（如脆弱拟杆菌）（）A、结肠、直肠、阑尾手术

35.以下哪类手术II、III类切口可能含有厌氧菌（如脆弱拟杆菌）（）A、肝、胆系统及胰腺手术

36.治疗阿米巴肠病宜选药物（）A、甲硝唑

37.治疗肠球菌属所致的血流感染，宜选药物为（）A、氨苄西林或青霉素氨基糖苷类

38.治疗蜱传回来热可选多西环素 100mg 口服，（），7~10天 A、

40.中性粒细胞缺少伴发热治疗准绳说法错误的是（）A、尽早入手下手诊断性尝试治疗

41. () 与异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合是各型肺结核短程疗法的基石 B、XXX

42.大环内酯类 () 制止与特非那定适用，以制止引起心脏不良回响反映 B、克拉霉素

43.对磺胺类药物不敏感的细菌是 () B、立克次体

44.对青霉素过敏的细菌性脑膜炎病人，可选用 () B、氯霉素 45.对于施行下腔静脉滤器植入术的患者，关于防备性应用抗菌药物的发起是 () B、不举荐通例防备使用抗菌药物

46.对于头霉素类药物的适应证描述错误的是 () B、大肠埃希菌等肠杆菌科细菌、拟杆菌属等需氧菌引起的腹腔感染

47.关于感染性心内膜炎的治疗原则叙述有误的是 () B、根据病原选用杀

菌剂，应单一用药

48.抗菌药物疗程因感染不同而异，一般宜用至体温正常、症状消退后 () 小时，有局部病灶者需用药至感染灶控制或完全消散 B、72~96

49.抗菌药物临床应用的 () 是抗菌药物管理的核心策略 B、分级管理 50.青霉烯类抗菌药物适应证不包括 () B、下呼吸道感染

51.人工瓣膜熏染性心内膜炎、真菌性心内膜炎疗程需 () 或更长，以降低复发率 B、6~8周

- 52.属于大环内酯类抗生素的是 () B、罗红霉素
- 53.替加环素的作用机制是 () B、按捺细菌卵白质的合成
- 54.万古霉素对哪种细菌引起的熏染无效 () B、绿脓杆菌
- 55.为预防外固定架植入术 II 类手术感染，围手术期可以预防应用下列哪类抗菌药物 () e、第一、二代头孢菌素
- 56.以下关于肾功能消退的成人美罗培南使用剂量错误的是 () B、血液透析患者剂量每次为 0.5g 每 12h 给药一次
- 57.下列哪些品种不属于 β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂 ()
B、头孢拉定/舒巴坦
- 58.下列哪种抗菌药物已证实对妊娠期妇女有危险性，但仍可能受益多 ()
B、替加环素
- 59.以下哪项属于 IV 类切口（污秽—感染手术） () B、有失活组织的陈旧创伤手
- 60.以下哪种抗菌药物可以引起新生儿的溶血性贫血 () B、磺胺药及呋喃类
- 61.由 A 组溶血性链球菌引起的颌面部感染不选的药物是 () B、第三代头孢菌素

62. () 可用于治疗重症或伴血流熏染的尿路熏染患者 C、碳青霉烯类
63. 氨基糖苷类药物的不良回响反映不包括 () C、肝毒性
64. 滴虫炎的宜选药物是 () C、甲硝唑
65. 对庆大霉素的描述，下列说法错误的是 () C、耐药菌少
66. 肝病时制止应用以下哪种抗菌药物 () C、两性霉素 B
67. 钩端螺旋体病治疗时为制止治疗后出现 ()，初始治疗阶段抗菌药物的剂量宜小 C、XXX 回响反映
68. 关于替加环素，下列说法错误的是 () C、替加环素可用于铜绿假单胞菌感
69. 急性化脓性骨髓炎疗程为 () C、4~6 周
70. 经常发生链球菌咽峡炎或风湿热的儿童及成人，可预防性给予下列哪种抗菌药物 () C、苄星青霉素
71. 可用于合并 HIV 患者的抗分枝杆菌感染的预防与治疗的药物是 (C、XXX
72. 利奈唑胺的适应证不包括 () C、社区获得性肺炎，由敏感的肺炎链球菌所致

73.伤寒带菌者治疗可选用阿莫西林或氟喹诺酮类口服，疗程为（）周 C、6

74.肾功能减退的患者使用磺胺甲噁唑时，应（） C、轻、中、重度肾功能减退时均需减量

75.施行经颈静脉肝内门腔静脉分流术的患者，发起防备性使用抗菌药物，但以下哪种药物不在举荐之列（） C、阿奇霉素

76.实施淋巴管造影术的患者，建议预防性使用（）类抗菌药物 1 次 C、第一代头孢菌素

XXX 推荐的成人麻风病患者少菌型疗程为（）个月 C、6
678.碳青霉烯类抗菌药物临床应用存在的问题不包括（） C、自我国开展抗菌药物临床应用专项整治以来，我国住院患者抗菌药物使用率上升

79.碳青霉烯类抗菌药物临床应用评价细则中不包括以下哪种药物（） C、多立培南

80.替加环素适应证不包括（） C、中枢神经系统熏染患者

81.下列关于立克次体病说法正确的是（） C、立克次体病是由立克次体科，柯克斯体科，巴通体科中的多个属、种的病原微生物引起的感染病

82. 下列关于碳青霉烯类抗菌药物在特殊人群中的使用说法错误的是（）
C、肝功能不全患者使用时一般都需要调整剂量

83. 下列哪种抗菌药物已证实对人类致畸，危险性大于受益（）
C、奎宁

84. 心脏人工瓣膜置换术、人工关节置换术等，若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该机构 MRSA 发生率高，可选用（）防备熏染，但应严格控制用药延续时间
C、万古霉素、去甲万古霉素
85. 新生儿期应制止应用可导致脑性核黄疸及溶血性贫血的（）
C、磺胺类药和呋喃类药

86. 猩红热主要由（）引起
C、A 组溶血性链球菌

87. 严重中性粒细胞缺乏持续时间超过（）天的高危患者和实体器官移植及造血干细胞移植的患者，在某些情况下也有预防用抗菌药物的指征
C、7

88. 以下哪类手术 II、III 类切口可能含有口咽部厌氧菌（如消化链球菌）（）

C、胃、十二指肠、小肠手术

89. 以下情况原则可以预防使用抗菌药物（）
C、尚无细菌感染征象但暴露于致病菌感染的高危人群

90.易透过血脑屏障，对隐球菌性脑膜炎有较好疗效的药物是（C、氟胞嘧啶

91.由流感嗜血杆菌引起的细菌性结膜炎不选的药物是（）
C、阿糖腺苷

92.有关特比萘芬的叙述不正确的（）C、对念珠菌有杀菌作用
93.粘脓性宫颈炎最多见的病原是（）C、淋病奈瑟菌和

沙眼衣原体
94.治疗肠杆菌科细菌所致的肺脓肿，宜选药物为
（）C、第三代头孢菌素

氨基糖苷类

95.治疗肺炎克雷伯菌所致的皮肤、软组织熏染，宜选药物为（C、第三代头孢菌素

96.治疗淋球菌性宫颈炎宜选的治疗药物是（）C、第三代头孢菌素
97.治疗鼠疫的首选药物是（）C、链霉素

98. BSI 肺炎链球菌对（）耐药者多见，需注意药敏试验结果
D、红霉素或克林霉素

99.百日咳的治疗药物首选（）D、红霉素

100.不属于时间依赖性杀菌剂的是（）D、阿奇霉素

101.多黏菌素类药物适用于以下哪类感染（）D、铜绿假单胞菌
102.革兰阴性杆菌脑膜炎疗程至少为（）D、4周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037022200102010041>