

2024 年海南省五指山市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。近日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗应告知该患者用药后需漱口的药物是

- A: 孟鲁司特钠咀嚼片
- B: 多索茶碱注射液
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 布地奈德混悬液

答案：D

2. 下列常见的外文缩写，其含义是"立即"的是

- A: Sol
- B: St
- C: ss
- D: Dos

答案：B

3. （2018 年真题）患者，女，50 岁，近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状，临床诊断为围绝经期综合征，在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是（）

- A: 严重肝功能障碍
- B: 耳硬化症
- C: 近 6 月内患活动性静脉栓塞性疾病

D: 乳腺增生

答案：D

4. 抗类风湿关节炎药物中,至少服用 6 个月才能宣布无效,长期大剂量服用可出现肾损害和骨髓抑制的是

A: 柳氮磺吡啶

B: 来氟米特

C: 氯喹

D: 青霉胺

答案：D

5. 脑出血的内科治疗最重要的是

A: 降低血压

B: 给予止血剂

C: 抗生素治疗

D: 控制脑水肿

答案：D

6. 判断尿路感染是复发还是再感染,多以在停药后几周再发为依据

A: 4 周

B: 6 周

C: 3 周

D: 5 周

答案：B

7. 以下有关肝功能不全病人用药的叙述中,不正确的是

A: 定期检查肝功能,及时调整治疗方案

B: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物

C: 静脉给药可不调整剂量

D: 明确诊断，合理选药

答案：C

8. (联合用药) 普通感冒患者应用抗病毒药+抗生素属于

A: 超适应证用药

B: 非适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 超剂量用药

答案：B

9. 1 日 1 次用药的外文规范缩写是

A: qod

B: qh

C: qn

D: qd

答案：D

10. 不可逆地抑制环氧化酶，可以用于降低心肌梗死、脑卒中和心血管死亡的发生风险的药物是

A: 硝酸甘油

B: 阿司匹林

C: 氨氯地平

D: 美托洛尔

答案：B

11. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

A: 经济性

B: 技术性

C: 法律性

D: 有效性

答案：B

12. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 100mg

B: 80mg

C: 60mg

D: 120mg

答案：A

13. （2021 年真题）为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L，需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为 6.0%）和纯化水的量分别是（）

A: 150mL 和 9850mL

B: 830mL 和 9170mL

C: 120mL 和 9880mL

D: 83mL 和 9917mL

答案：D

14. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 每 24 小时 1g
- B: 每 12 小时 1g
- C: 每 8 小时 2g
- D: 每 24 小时 0.5g

答案：A

15. 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 定期监测肝功能
- B: 遵从联合治疗原则
- C: 有条件的应测定药物血液浓度
- D: 长期规律用药

答案：B

16. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 腔内注射
- B: 膀胱灌注
- C: 腹腔注射

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 动脉注射

答案: C

17. 稳定型心绞痛发作时的治疗选用

A: 氯贝丁酯

- B: 硝酸甘油
- C: 阿司匹林
- D: 低分子肝素

答案：B

18. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓后 12h?
- B: 溶栓后 1h?
- C: 溶栓后 24h?
- D: 溶栓后 3h?

答案：C

19. 血脂调节药的合理应用主要用于高胆固醇血症，尤其是黄色瘤患者的是（）

- A: 依折麦布
- B: 伊曲康唑
- C: 普罗布考
- D: 他汀类与贝特类联用

答案：C

20. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。头孢曲松属于（）

- A: C 级
- B: A 级
- C: D 级
- D: B 级

答案：D

21. 与胆酸螯合剂合用，应至少提前 2h 服用的药物是

- A: 他汀类与烟酸类联用
- B: 伊曲康唑
- C: 依折麦布
- D: 螺内酯

答案：C

22. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 20～30 分钟
- B: 15～30 分钟
- C: 10～20 分钟
- D: 5～10 分钟

答案：B

23. 可减弱华法林抗凝作用的食物有

- A: 葡萄柚
- B: 大蒜
- C: 韭菜
- D: 洋葱

答案：C

24. 处方是医疗机构的重要医疗文书，具有

- A: 经济性、法律性和合理性
- B: 技术性、经济性和合法性
- C: 技术性、有效性和经济性

D: 法律性、技术性和经济性

答案：D

25. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 立即停止使用维生素 D

B: 降钙素 50~100U/d 肌注

C: 泼尼松 2mg/(kg·d) 口服

D: 少饮水

答案：D

26. 肾素抑制剂

A: 依普利酮

B: 阿米洛利

C: 雷米普利

D: 阿利吉仑

答案：D

27. 患者，女，57 岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足 5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20 / 5mgqd

A: 服药后第二天上班禁止开车

B: 要防止晨起跌倒

C: 坚持每晚服用 1 片

D: 每周给药 2~3 次

答案: C

28. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

A: 餐前服用

B: 餐中服用

C: 餐后服用

D: 清晨服用

答案: C

29. (2021 年真题) 患者, 男, 52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作, 长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 低血压

B: 消化性溃疡

C: 该患者可能出现的不良反应中, 不包括的是 ()

D: 骨质疏松

答案: C

30. 患者, 男, 54 岁, 患冠心病 3 年, 长期服用阿司匹林, 近几天肢体多处出现瘀斑, 故前来就诊。实验室检查: $PLT 70 \times 10^9 / L$ 。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

A: 碳酸锂

B: 磺胺异噁唑

C: 阿司匹林

D: 氯霉素

答案: A

31. 碱化尿液，服药期间需监测尿 pH 以调整剂量，防止发生尿酸性肾结石的药物是

- A: 非布司他
- B: 拉布立酶
- C: 苯溴马隆
- D: 枸橼酸氢钾钠

答案：D

32. 服药时，应该限制饮水的药品是

- A: 苯溴马隆
- B: 阿仑膦酸盐
- C: 口服补液盐
- D: 硝酸甘油

答案：D

33. 少数人用后可出现视力降低和辨色困难

- A: 西咪替丁
- B: 金刚烷胺
- C: 布洛芬
- D: 硝酸甘油

答案：C

34. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

- A: 技术性、经济性和合法性
- B: 经济性、法律性和合理性
- C: 法律性、技术性和经济性
- D: 技术性、有效性和经济性

答案：C

35. 伴发 OAB 的前列腺增生症治疗药物索利那新的不良反应是

- A: 性功能障碍
- B: 体位性低血压
- C: 加重闭角型青光眼
- D: 心动过缓

答案：C

36. 以下药物中，可影响华法林吸收的为（）

- A: 雷尼替丁
- B: 硫糖铝
- C: 奥美拉唑
- D: 胶体果胶铋

答案：B

37. 哮喘急性发作的首选药为

- A: 福莫特罗？
- B: 沙丁胺醇？
- C: 沙美特罗？
- D: 布地奈德？

答案：B

38. 患者，男，40 岁，因感冒所致鼻塞到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 氯苯那敏片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 酚麻美敏片
- D: 萘甲唑啉滴鼻液

答案：D

39. 发热的程度按体温状况分级。“低热”者的体温是

- A: 1℃以上
- B: 38.1℃～39℃
- C: 7℃以上
- D: 37.4℃～38℃

答案：D

40. 患者，男，54岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾3日”就诊，患者无基础疾病，近1周内未服用药物，诊断为支气管炎。

对该患者的经验治疗应选择

- A: 头孢克洛颗粒剂
- B: 美托洛尔片
- C: 复方甲氧那明胶囊
- D: 阿奇霉素分散片

答案：C

41. 易吸湿的药品

- A: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处
- B: 可贮存于严密的药箱内
- C: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧
- D: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

答案：C

42. 禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

- A: 苯二氮
- B: 5-HT

C: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

D: 三环类药物

答案：A

43. (引起药源性肾病的药物) 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 肾小管阻塞

B: 不可逆性肾小管坏死

C: 直接肾毒性

D: 肾间质纤维化

答案：B

44. 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是()

A: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

B: 脂溶性高，分子量小

C: 蛋白结合率高，具有手性、分布容积大

D: 分子量大、弱碱性

答案：B

45. 服用异烟肼抗结核治疗时，应注意的事项是

A: 用药期间宜吃高蛋白食物

B: 服药期间不宜饮茶

C: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

D: 服药期间不宜饮酒

答案：C

46. 原发性失眠首选

A: 氯氮

B: 米氮平

C: 阿戈美拉汀

D: 唑吡坦

答案: D

47. 以下血浆中脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

A: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)高于同年龄正常值

B: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值

C: 总胆固醇(TC)高于同年龄正常值

D: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)高于同年龄正常值

答案: A

48. 急诊处方药品用量一般不宜超过

A: 3 日用量

B: 7 日用量

C: 15 日用量

D: 1 日用量

答案: A

49. 患者，女，65 岁，因稳定型心绞痛服用阿替洛尔治疗，药师应告知患者每天应自测心率，静息心率控制在

A: 55~60 次 / 分

B: 65~70 次 / 分

C: 35~40 次 / 分

D: 40~45 次 / 分

答案: A

50. 一日一次用药的外文规范缩写是

A: q. h

B: q. n

C: q. o. d

D: q. d

答案：D

51. (2015 年真题) 药师在指导合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法。下列交代的内容，错误的是 ()。

A: 泡腾片可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用

B: 肠溶片要整片吞服，不宜嚼碎服用

C: 栓剂是外用制剂，不可口服

D: 活菌制剂不能用超过 40℃ 的水送服

答案：A

52. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果要更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停药

A: 10 天

B: 5 天

C: 14 天

D: 7 天

答案：C

53. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

A: 红细胞

B: 真菌

C: 吞噬细胞增多

D: 上皮细胞

答案：B

54. 属于超长效的胰岛素制剂是

- A: 甘精胰岛素
- B: 赖脯胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：A

55. 骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

- A: 内分泌系统
- B: 水盐代谢
- C: 运动系统
- D: 血液系统

答案：D

56. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

- A: C 级
- B: E 级
- C: D 级
- D: B 级

答案：D

57. 有明确的风险，有必要采取措施以降低风险；评判为

- A: 驳倒
- B: 确认
- C: 验证
- D: 待验证

答案：B

58. 制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都参考循证医学的研究结果表明

- A: 有利诊断特殊疾患
- B: 有助个体化给药
- C: 列为行政决策的依据
- D: 改变降脂治疗观念

答案：C

59. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 尼美舒利
- B: 美洛昔康
- C: 双氯芬酸钠
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

60. 就乙肝血清免疫学检查而言，判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

- A: 抗-HBe(+)
- B: 抗-HBs(+)
- C: HBsAg(+)
- D: HBeAg(+)

答案：D

61. 可导致手、足、脸以及内部器官不正常发育的兴奋剂是

- A: 蛋白同化激素

B: B 受体阻断剂

C: 人生长激素

D: 精神刺激剂

答案: C

62. 应报告药品引起的严重、罕见或新的不良反应的是

A: 国家重点监测的药品

B: 上市 3 年以内的药品

C: 上市 5 年以上的药品

D: 上市 5 年以内的药品

答案: C

63. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为预防治疗，最佳剂量范围是

A: 25~50mg / d

B: 75~150mg / d

C: 150~300mg / d

D: 25~75mg / d

答案: B

64. 维生素 C 用于

A: 防治坏血病

B: 防治夜盲症

C: 习惯性流产的辅助治疗

D: 防治佝偻病

答案: A

65. 肺炎用药注意事项不符的是

- A: 体温正常 48~72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物。
- B: 肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素。
- C: 观察疗效抗菌药物治疗后 48~72h 应对病情进行评价。
- D: 肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即马上给予首剂抗菌药物。

答案：B

66. 患者用药咨询的内容是

- A: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- B: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：A

67. 适用于哺乳期女性避孕，须每日的同一时间服用并且不能有一日间断，一旦漏服应采用额外的避孕方法的药物是

- A: 短效复方口服避孕药
- B: 口服左炔诺孕酮(1.5mg)
- C: 甲羟孕酮 150mg 肌内注射
- D: 口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮 0.35mg)

答案：D

68. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 涂片、培养鉴定
- B: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）
- C: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

D: 临床治疗方案

答案: D

69. 急性期

A: 2 周

B: 1 个月内

C: 1~6 个月

D: 1~3 个月

答案: B

70. 含马兜铃酸的中药可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 肾小管阻塞

C: 肾间质纤维化

D: 直接肾毒性

答案: C

71. 属于非麻醉性镇咳药的是

A: 沙丁胺醇

B: 羟甲唑啉

C: 苯丙哌林

D: 羧甲司坦

答案: C

72. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

A: 肺炎？

B: 支气管哮喘？

C: 肺结核?

D: 慢性阻塞性肺病?

答案: C

73. 患者，女，20 岁，1 天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。

查体：T36.5℃，P70 次/分，R18 次/分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体 I 度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良 Centor 评分：患者，20 岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良 Centor 评分为 0 分。药师对该患者的建议，错误的是

A: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d

B: 避免环境温度突然变化

C: 可服用布洛芬混悬液止痛

D: 告知患者不要强行发声

答案: A

74. (2017 年真题) 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应, 用药期间不宜饮酒的药物是 ()

A: 阿奇霉素

B: 阿司匹林

C: 甲硝唑

D: 对乙酰氨基酚

答案: C

75. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊。化验结果显示 TSH 增高，TT4 降低。临床诊断为甲状腺功能减退症。

药师对该患者的用药指导和教育，错误的是

- A: 治疗初期每 4~6 周测定甲状腺激素指标，然后根据检查结果调整给药剂量
- B: 若出现手抖、心悸、心律不齐、多汗、腹泻、体重下降、失眠和烦躁，必要时需停药，直至不良反应消失后，再从更小的剂量开始
- C: 左甲状腺素钠片应于早餐前 1 小时，空腹将 1 日剂量一次性用水送服
- D: 推荐使用甲状腺激素含量稳定的甲状腺素片

答案：D

76. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 腹胀
- B: 高血脂
- C: 肝功能异常
- D: 高血压

答案：C

77. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

- A: 氯吡格雷
- B: 依诺肝素钠
- C: 尿激酶
- D: 达比加群酯

答案：A

78. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

- A: 四环素
- B: 阿莫西林
- C: 呋喃唑酮
- D: 左氧氟沙星

答案：D

79. 属于肾上腺素能 α 受体阻断剂，可改善尿道梗阻症状的药品

- A: 非那雄胺
- B: 氟他胺
- C: 黄酮哌酯
- D: 阿夫唑嗪

答案：D

80. 患者，女，69 岁，近一个月出现入睡困难，白天有头昏、疲倦等不适感，尝试非药物治疗无改善，推荐的药物治疗方案是()

- A: 唑吡坦 5mgpoqn
- B: 地西泮 5mgpoqn
- C: 氯硝西泮 2mgpoqn
- D: 苯巴比妥 100mgpoqn

答案：A

81. 香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是

- A: 纳洛酮
- B: 乙酰胺
- C: 维生素 K
- D: 青霉胺

答案：C

82. 心力衰竭抗高血压药物的禁忌证

- A: 氢氯噻嗪
- B: 依那普利
- C: 维拉帕米
- D: 美托洛尔

答案：C

83. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

- A: 密切监护
- B: 避免食物的影响
- C: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- D: 严格掌握用药剂量

答案：C

84. 关于患者用药注意事项的说法错误的是()

- A: 应定期监测血压、心率
- B: 应定期监测地高辛血药浓度
- C: 应注意观察是否有黑便
- D: 在患者症状好转后,应立即停用比索洛尔

答案：D

85. 治疗皮肤疾病适宜选择

- A: 软膏剂
- B: 栓剂
- C: 片剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 注射剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/037040136051010024>