

2024 年甘肃省合作市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库附答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 急性痛风性关节炎期首选药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 碳酸氢钠
- D: 别嘌醇

答案：B

2. 审核发现用药失误的处方，药师应该

- A: 修改、调配此处方并发出药品
- B: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告
- C: 依照此处方调配药品、发出药品
- D: 拒绝调配此处方

答案：B

3. 处方中"餐后给药"的外文缩写是

- A: qn
- B: pc
- C: po
- D: ac

答案：B

4. 在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

- A: 药物评价
- B: 药物重整
- C: 药学干预
- D: 处方审核

答案：B

5. 钙制剂

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 骨形成刺激剂
- C: 促进骨矿化剂
- D: 激素替代剂

答案：C

6. 起效快，抗焦虑作用强，对急性期焦虑患者可考虑短期使用的治疗药是

- A: 丁螺环酮
- B: 苯海索
- C: 地西泮
- D: 加兰他敏

答案：C

7. 治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，可选择的药物是

- A: 比沙可啶
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 东莨菪碱

答案：C

8. 宜于清晨服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿卡波糖
- C: 糖皮质激素
- D: 洛伐他汀

答案：C

9. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

- A: 米氮平
- B: 唑吡坦
- C: 阿戈美拉汀
- D: 艾司唑仑

答案：B

10. 药师接待医师咨询问题时，常见的咨询内容不包括

- A: 药品的适应证、用法与用量
- B: 药物的药效学与药动学有关问题
- C: 国内外新药动态
- D: 新药临床评价

答案：A

11. 下列具有肝药酶诱导作用的药物中，所抑制的酶系类型最多的是

- A: 苯妥英钠
- B: 利福平
- C: 卡马西平
- D: 苯巴比妥

答案：B

12. 属于胃黏膜保护剂的是（）

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案：A

13. 对合并糖尿病及肾病的高血压患者的降压目标是

- A: <150 / 90mmHg
- B: <130 / 80mmHg
- C: <160 / 90mmHg
- D: <140 / 85mmHg

答案：B

14. （2018 年真题）患者，男，65 岁，临床诊断：2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A: 瑞格列奈片用量不合理
- B: 选用阿卡波糖片不合理
- C: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- D: 选用美托洛尔缓释片不合理

答案：C

15. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A: 奥司他韦
- B: 利巴韦林
- C: 金刚烷胺
- D: 金刚乙胺

答案：A

16. 茶碱、咖啡因、可卡因等容易引起癫痫发作，属于

- A: 药源性肾损害
- B: 药源性神经损害
- C: 药源性血损害
- D: 药源性肝损害

答案：B

17. 阿米洛利及复方制剂

- A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B: 可导致驾驶员多尿或多汗
- C: 可使驾驶员出现定向力障碍
- D: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

答案：B

18. 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括()

- A: 自行修改错误处方
- B: 进行用药指导
- C: 严格审核处方
- D: 仔细核对药品

答案：A

19. 氟哌啶醇的禁用范围是

- A: 新生儿
- B: 1 岁以下婴儿
- C: 婴幼儿
- D: 3 岁以下幼儿

答案：C

20. 患者,女 67 岁出现认知功能障碍 5 年,诊断为阿尔茨海默病,予以美金刚治疗。下列药物中,可增加美金刚血药浓度的是 ()

- A: 氯化铵
- B: CYP3A4 制剂
- C: 碳酸氢钠
- D: CYP2D6 抑制剂

答案：C

21. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式, 正确的是

- A: 宜多饮水, 减轻刺激
- B: 直接吞咽
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用, 充分咀嚼后咽下

答案：D

22. 为减少共济失调, 幻觉及"宿醉现象", 老年人失眠患者宜选用:

- A: 水合氯醛
- B: 劳拉西泮
- C: 苯巴比妥

D: 佐匹克隆

答案：D

23. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

A: 很可能

B: 肯定

C: 可能无关

D: 可能

答案：A

24. (2016 年真题) 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是 ()。

A: 合并高胆固醇血症的患者

B: 合并轻度高血压的患者

C: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者

D: 甲状腺切除后的患者

答案：C

25. 使用前应用原药进行皮试的药物是

A: 左氧氟沙星片

B: 阿奇霉素片

C: 注射用头孢曲松钠

D: 注射用阿莫西林

答案：C

26. (在乳汁中排泄的药物) 地西泮可分布在乳汁中的机制是地西泮

A: 脂溶性高

B: 在脂肪与水中都有一定的溶解度

C: 呈弱碱性

D: 呈弱酸性

答案：A

27. 巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

A: 维生素 B12

B: 硫酸亚铁片

C: 苯妥英钠注射液

D: 叶酸片

答案：A

28. 关于处方开具和调剂的说法正确的是()

A: 剂处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量

B: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品

C: 调剂处方时应做到“四查十对”

D: 处方开具后 7 日内有效

答案：C

29. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

A: 左旋多巴

B: 多奈哌齐

C: 氟西汀

D: 卡马西平

答案：A

30. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

- A: 盲目联合用药
- B: 有禁忌症用药
- C: 超适应症给药
- D: 撒网式给药

答案：C

31. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 尿沉渣白细胞
- B: 尿沉渣结晶
- C: 尿沉渣管型
- D: 尿沉渣磷酸盐

答案：C

32. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是（）

- A: 氨氯地平
- B: 维拉帕米
- C: 阿米洛利
- D: 缬沙坦

答案：C

33. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- B: 两者合用作用相反，互相降低药效
- C: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- D: 合用后增加毒性，出现药物中毒

答案：D

34. 下列药物中，解救复方樟脑酊中毒的特效药是

- A: 碳酸氢钠
- B: 氟马西尼
- C: 硫酸铜
- D: 纳洛酮

答案：D

35. 可能引起肺间质病变的药物是（）

- A: 硫唑嘌呤
- B: 羟氯喹
- C: 甲氨蝶呤
- D: 柳氮磺吡啶

答案：C

36. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 维持肠道正常菌群的平衡
- B: 减少肠内毒素的生成
- C: 对促进营养物质的吸收没有帮助
- D: 可制约致病菌的生长繁殖

答案：C

37. 能够作为“药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径”的工作内容是

- A: 处方点评
- B: 静脉药物配置
- C: 药物信息服务

D: 治疗药物监测

答案：D

38. 同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是

A: 预混胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：A

39. 某患者，男，71 岁，既往有血脂异常，胆固醇 7.7mmol/L，甘油三酯 2.3mmol/L，肝功能正常，患者连续服用氟伐他汀和非诺贝特 5 个月，检测肝功能 AST142U/L(正常值为 40U/L)，ALT126(正常值为 40U/L)，磷酸激酶 CPK2000U/L(正常值为 25~200U/L)。依据上述复查结果判断患者

A: 肝脏毒性

B: 心脏毒性

C: 肌肉毒性

D: 肾脏毒性

答案：C

40. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

A: 西地碘含片

B: 地塞米松粘贴片

C: 替硝唑含漱液

D: 氯己定含漱液

答案：B

41. 可沉淀大部分有机物及无机物的洗胃液是

- A: 3%~5%鞣酸溶液
- B: 药用炭混悬液
- C: 鸡蛋白
- D: 1%氯化钠溶液

答案: A

42. 目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的 IL-1 拮抗剂类生物制剂为

- A: 阿达木单抗
- B: 阿那白滞素
- C: 阿巴西普
- D: 英夫利昔单抗

答案: B

43. 摄入过多可导致甲状腺功能亢进症的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 甲巯咪唑
- C: 碳酸锂
- D: 丙硫氧嘧啶

答案: A

44. 患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 高钾血症
- B: 快速性房性心律失常伴传导阻滞
- C: 直立性低血压

D: 心动过缓

答案：B

45. 患者,男,65 岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

A: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平或 CCB 降压药

C: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

D: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

答案：B

46. 对巨幼细胞贫血者应选用 ()

A: 甲磺酸去铁胺

B: 富马酸亚铁

C: 叶酸+维生素 B12

D: 维生素 K1

答案：C

47. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

A: 昆布片 (碘)

B: 蛇胆川贝液 (苦杏仁苷)

C: 香连片 (黄连)

D: 丹参片 (丹参酮)

答案：A

48. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

- A: 西咪替丁+格列本脲
- B: 青霉素+丙磺舒
- C: 四环素+硫酸亚铁
- D: 多潘立酮+维生素 C

答案：A

49. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

- A: 氯化钾
- B: 青霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 红霉素

答案：D

50. （2021 年真题）患者，男，52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作，长期自行服用泼尼松片 20mgq

- A: 消化性溃疡
- B: 骨质疏松
- C: 该患者可能出现的不良反应中，不包括的是（）
- D: 低血压

答案：C

51. 具有球后视神经炎不良反应的药物是

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

答案：D

52. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

A: 1605 中毒

B: 3911 中毒

C: 巴比妥类中毒

D: 乐果中毒

答案：C

53. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 急性肾盂肾炎

B: 膀胱炎

C: 压力性尿失禁

D: 急迫性尿失禁

答案：A

54. 用于治疗前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂为

A: 坦索罗辛

B: 托特罗定

C: 索利那新

D: 特拉唑嗪

答案：A

55. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

- A: 呋塞米片 200mgqdp
- B: 尼莫地平注射液 20mgqdiv
- C: 甘露醇注射液 250mlq6hiv
- D: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

答案: C

56. 可导致体重增加的抗焦虑药物为 ()

- A: 氟西汀
- B: 文拉法辛
- C: 舍曲林
- D: 米氮平

答案: D

57. 以下可提示“高度黄疸，完全梗阻性黄疸”的总胆红素检查结果是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $<85.5 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案: A

58. 用于治疗痴呆的胆碱酯酶抑制剂不包括

- A: 加兰他敏
- B: 多奈哌齐
- C: 卡巴拉汀

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 美金刚

答案：D

59. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

- A: 甲基多巴
- B: 依那普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 拉贝洛尔

答案：B

60. 新生儿的相对总体液量比成人高，体液占体重

- A: 70%~80%
- B: 72%~80%
- C: 75%~85%
- D: 75%~80%

答案：D

61. IV 期临床试验是在广泛使用的条件下考察药品疗效和不良反应，样本数常见病不少于

- A: 2000 例
- B: 100 例
- C: 1000 例
- D: 300 例

答案：A

62. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是()。

- A: 2.81(%, g/mL)
- B: 2.61(%, g/mL)
- C: 3.11(%, g/mL)
- D: 2.91(%, g/mL)

答案：A

63. 患者，女，48 岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 干酵母片
- B: 乳酶生片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 多潘立酮片

答案：B

64. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 脱发
- B: 食欲下降
- C: 骨髓抑制
- D: 恶心、呕吐

答案：C

65. 阿糖胞苷属于

- A: 抗肿瘤药
- B: 抗病毒药

C: 抗真菌药

D: 抗过敏药

答案: A

66. 引起药源性肾病的药物,含马兜铃酸的中药可导致

A: 前列腺素合成障碍

B: 直接肾毒性

C: 肾小管阻塞

D: 肾间质纤维化

答案: D

67. 青霉素钠注射液作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 750U/ml

B: 500U/ml

C: 250U/ml

D: 100U/ml

答案: B

68. 主要检查均匀度、细腻度、有无异臭酸败的是

A: 胶囊剂

B: 片剂

C: 糖浆剂

D: 软膏剂

答案: D

69. (2018 年真题) 患者,女,46 岁,高血压病史 3 年,2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛,诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重,采用了联合用药方案:患者用药如下:

- A: 氨氯地平片
- B: 双氯芬酸钠缓释片
- C: 甲氨蝶呤片
- D: 羟氯喹片

答案：D

70. 患者女,56 岁,既往有高血压、高脂血症病史,长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周,伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛,服用布洛芬,疼痛未缓解,自行加用萘普生。胃镜检查显示:胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡,幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 十枸橼酸铋钾+阿莫西林+甲硝唑
- B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 十阿莫西林+克拉霉素
- C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) +枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星 A

答案：A

71. 一般情况下, 每张处方中开具的西药和中成药的总数目最多为

- A: 4 种
- B: 2 种
- C: 5 种
- D: 3 种

答案：C

72. 1 日 1 次用药、初治短程化疗方案是

- A: 2S (E)HR2/4HR
- B: 2HSP (E) /10HP (E)
- C: 1HS/11H2S2

D: 2S(E)HR2/4H3R3

答案：A

73. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处 1 片，一日不得超过 3 片的药物是 ()。

A: 甲硝唑口腔粘贴片

B: 冰硼咽喉散

C: 地塞米松粘贴片

D: 西地碘含片

答案：C

74. 非甾体类抗炎药导致消化性溃疡病的主要机制是 ()

A: 破坏胃黏膜屏障

B: 影响胃、十二指肠协调运动

C: 促进胃酸分泌

D: 抑制胃酸分泌

答案：A

75. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A: 红细胞生成减少

B: 血红蛋白生成减少

C: 红细胞生成过多

D: 红细胞丢失过多

答案：A

76. 患者，女，31 岁，因丙型病毒性肝炎使用 α 干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法，正确的是 ()

- A: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应,治疗期间和治疗后 6 个月内,必须采取避孕措施
- B: 干扰素、利巴韦林较为安全,不必停药,即可备孕
- C: 干扰素、利巴韦林较为安全,停药 3 个月后可备孕
- D: 干扰素、利巴韦林较为安全,停药后即可备孕

答案: A

77. 痉挛性便秘

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 羧甲基纤维素钠
- D: 比沙可啶

答案: C

78. 主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

- A: 亚硝酸钠
- B: 盐酸烯丙吗啡
- C: 谷胱甘肽
- D: 双解磷

答案: B

79. 关于腹泻下列说法正确的是

- A: 排便一日超过 4 次
- B: 急性腹泻病程小于 2 周
- C: 慢性腹泻病程大于 1 个月
- D: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月

答案: B

80. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 药动学相互作用
- B: 药物制剂因素
- C: 药物的使用
- D: 药理作用

答案：B

81. 患儿，女，5 岁，误服香豆素类杀鼠药。可选用的解救药物是

- A: 维生素 K
- B: 二巯丙醇
- C: 纳洛酮
- D: 亚甲蓝

答案：A

82. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 停用了苯妥英钠
- B: 丙戊酸钠的不良反应
- C: 卡马西平的不良反应
- D: 糖尿病病情进展

答案：B

83. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A: 地高辛用于肾功不全患者
- B: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- C: 利巴韦林可致畸与肿瘤
- D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案：A

84. （2016 年真题）患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是（）。

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：B

85. 正常高值的血压范围是（）。

- A: 收缩压 160~179mmHg，舒张压 100~109mmHg
- B: 收缩压 120~139mmHg，舒张压 80~89mmHg
- C: 收缩压 140~159mmHg，舒张压 90~99mmHg
- D: 收缩压 ≥ 180 mmHg，舒张压 ≥ 110 mmHg

答案：B

86. 长期服用可引起男性性功能障碍的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 奥美拉唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/038013074044007022>