

复习备考宝典

（考试点/考卷/真题）

精选考点
考前抢分
强化训练
检验成果

2021 护理专业知识试题及答案

1. 宫口扩张潜伏期需要的时间为：

- A. 4 小时
- B. 6 小时
- C. 8 小时
- D. 10 小时

答案： C

解析： 宫口扩张的速度有一定的规律性，在潜伏期扩张较慢，约需 8 小时。

2. 初产妇，足月临产入院。检查：宫口已开大 6cm，枕右前位，胎心正常，其他无异常。以下护理措施中错误的是：

- A. 卧床休息
- B. 鼓励进食
- C. 给予温肥皂水灌肠
- D. 外阴清洁并灌肠

答案： C

解析： 初产妇宫口扩张 $<4\text{cm}$ ，经产妇 $<3\text{cm}$ 时，可行温肥皂水灌肠，其目的是通过反射作用刺激子宫收缩；清除粪便，避免分娩时粪便溢出污染消毒区。

3. 胎儿娩出后多长时间胎盘尚未娩出者，称为胎盘滞留：

- A. 15min
- B. 30min

C. 20min

D. 60min

答案： B

解析： 胎盘一般在 5~15min 之内娩出，超过 30min 未娩出者称为胎盘滞留。

4. 产后子宫内膜完全修复的时间：

A. 产后 6 周

B. 产后八周

C. 产后 10 周

D. 产后四周

答案： A

解析： 产后子宫内膜修复的时间一般为 6 周。

5. _____指妇女绝经前后的一段时期，出现与绝经有关的内分泌学、生物学及临床特征起至绝经一年内的时期。

A. 功能失调性子宫出血

B. 闭经

C. 痛经

D. 经前期综合征

E. 围绝经期

答案： E

解析： 围绝经期指妇女绝经前后的一段时期，出现与绝经有关的内分泌学、生物学及临床特征起至绝经一年内的时期。

6. _____指月经完全停止 1 年以上。

- A. 绝经
- B. 闭经
- C. 痛经
- D. 经前期综合征
- E. 围绝经期

答案： A

解析： 绝经指月经完全停止 1 年以上。

7. _____是由于卵巢卵泡活动的丧失引起月经永久停止，无明显病理或其他生理原因。

- A. 自然绝经
- B. 人工绝经
- C. 痛经
- D. 经前期综合征
- E. 围绝经期

答案： A

解析： 自然绝经是由于卵巢卵泡活动的丧失引起月经永久停止，无明显病理或其他生理原因。

8. _____是手术切除双卵巢或因医源性丧失双卵巢功能。

- A. 自然绝经
- B. 人工绝经
- C. 痛经

D. 经前期综合征

E. 围绝经期

答案： B

解析： 人工绝经是手术切除双卵巢或因医源性丧失双卵巢功能。

9. _____是指由于生殖内分泌轴功能紊乱造成的异常子宫出血，而全身及内外生殖器官无明显器质性病变存在。

A. 功能失调性子宫出血

B. 闭经

C. 痛经

D. 经前期综合征

E. 围绝经期

答案： A

解析： 从受精卵形成至胎儿娩出止为胎儿期，共 40 周

10. _____是妇科常见症状，表现为无月经或月经停止。

A. 功能失调性子宫出血

B. 闭经

C. 痛经

D. 经前期综合征

E. 围绝经期

答案： B

解析： 闭经是妇科常见症状，表现为无月经或月经停止。

11. _____为妇科最常见的症状之一，是指行经前后或月经期

出现下腹疼痛、坠胀、腰酸或合并头痛、乏力、头晕、恶心等其他不适，严重者可影响生活和工作质量。

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 闭经
- C. 痛经
- D. 经前期综合征
- E. 围绝经期

答案： C

解析：痛经为妇科最常见的症状之一，是指行经前后或月经期出现下腹疼痛、坠胀、腰酸或合并头痛、乏力、头晕、恶心等其他不适，严重者可影响生活和工作质量。

12. _____ 又称经前症候群，是指妇女反复在月经周期黄体期出现生理、精神以及行为方面改变，严重者影响学习、工作和生活量，月经来潮后，症状可自然消失。

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 闭经
- C. 痛经
- D. 经前期综合征
- E. 围绝经期

答案： D

解析：经前期综合征又称经前症候群，是指妇女反复在月经周期黄体期出现生理、精神以及行为方面改变，严重者影响学习、工作和

生活质量，月经来潮后，症状可自然消失。

13. 下列关于普查子宫颈癌最优的普查方案是：

- A. 碘试验阴性区—子宫颈活体组织检查
- B. 子宫颈刮片细胞学检查—子宫颈活体组织检查
- C. 阴道镜检查—子宫颈活体组织检查
- D. 子宫颈刮片细胞学检查—阴道镜检查—子宫颈活体组织检查
- E. 子宫颈刮片细胞学检查—阴道镜检查—子宫颈锥形切除术

答案： D

解析：开展宫颈病变的筛查，目的是为了早期发现、及时治疗高级别病变，从而阻断子宫颈癌的发生。主要的筛查方法如下：早期病例的诊断应采用子宫颈细胞学检查和(或)高危 HPV DNA 检测、阴道镜检查、子宫颈活组织检查的“三阶梯”诊断程序，组织学诊断为确诊依据。

14. 子宫肌瘤的发生可能与下列哪项因素有关：

- A. 性生活紊乱
- B. 高胆固醇饮食
- C. 肥胖
- D. 生育过多
- E. 体内雌激素水平过高

答案： E

解析：子宫肌瘤确切的发病因素尚不清楚，一般认为其发生和生长可能与女性性激素长期刺激有关。雌激素指使子宫肌细胞增生肥

大，肌层变厚，子宫增大；雌激素还通过子宫肌组织内的雌激素受体起作用。

15. 子宫内膜异位最常侵犯的部位是：

- A. 输卵管
- B. 卵巢
- C. 外阴
- D. 子宫后壁下段
- E. 直肠子宫陷凹

答案： B

解析：子宫内膜异位以侵犯卵巢及宫骶韧带者最常见，其次是子宫浆膜、子宫直肠陷凹、子宫后壁下段等，异位内膜也可出现在手术切口、脐、外阴、肺等部位。

16. 20 岁，女性，以下腹剧痛急诊来诊，B 超示：右附件卵巢肿物，诊为卵巢肿物蒂扭转，其首选护理措施是：

- A. 遵医嘱输液
- B. 镇静止痛剂
- C. 应用抗生素
- D. 严密观察
- E. 做急诊手术术前准备

答案： E

解析：卵巢肿瘤蒂扭转属妇科急腹症，一旦确诊须立即手术。故护士需立即做急诊手术术前准备。

17. 绒毛膜癌患者最主要的死亡原因是癌细胞转移至：

- A. 肺
- B. 肝
- C. 脑
- D. 肾
- E. 阴道

答案： C

解析：绒毛膜癌脑转移的发生率不高，但预后凶险，为主要死亡原因。

18. 恶性葡萄胎和绒毛膜癌主要区别取决于：

- A. 良性葡萄胎清宫后发生的时间
- B. 绒毛膜促性腺激素值的高低
- C. 阴道出血时间长短
- D. 镜下见有无绒毛结构
- E. 子宫大小程度不同

答案： D

解析：侵蚀性葡萄胎显微镜下可见葡萄胎组织的滋养细胞有不同程度的增生，并有出血和坏死，但仍可见变形的或完好的绒毛结构。绒毛膜癌显微镜下检查典型的病变为滋养细胞极度不规则增生，并伴有大量出血和坏死，绒毛结构消失。病理切片中是否存在绒毛结构是二者的主要鉴别点。

19. 30 岁，女性，停经 11 周，阴道不规则流血 10 余天，量不多

暗红色，血中伴有小水泡物。妇科检查：BP150/90mmHg，子宫前倾，如孕4个月大，两侧附件可触到鹅卵大、囊性、活动良好、表面光滑的肿物。此病例最可能诊断是：

- A. 双胎妊娠
- B. 妊娠合并子宫肌瘤
- C. 葡萄胎
- D. 先兆流产
- E. 妊娠合并卵巢囊肿

答案：C

解析：停经后阴道流血，且血中有水泡状物，这是葡萄胎的典型表现。葡萄胎患者卵巢常会发生黄素化囊肿。

20. 患者，女，29岁。已婚未育，葡萄胎清宫术后准备出院，护士告知患者应随访1年，1年内不应妊娠，推荐选用的避孕方法为：

- A. 口服避孕药
- B. 针剂避孕药
- C. 阴茎套
- D. 安全期避孕
- E. 宫内节育器

答案：C

解析：葡萄胎清宫术后，避孕方法宜选用阴茎套或阴道隔膜。

21. 胎儿期共计：

- A. 28周

B. 32 周

C. 36 周

D. 40 周

E. 42 周

答案：A

解析：子宫收缩乏力所致出血：常表现为胎盘娩出后阴道大量出血，色暗红，子宫软，轮廓不清；(2)胎盘因素所致出血：多在胎儿娩出数分钟后出现大量阴道流血，色暗红；(3)软产道裂伤所致出血：多表现为胎儿娩出后立即出现阴道流血，色鲜红。隐匿性软产道损伤时，常伴阴道疼痛或肛门坠胀感，而阴道流血不多；(4)凝血功能障碍性出血：胎儿娩出后阴道流血呈持续性，且血液不凝。

22. 某产妇，24 岁。胎盘娩出后，阴道出现大量出血，色暗红，子宫软，轮廓不清，首选的止血方法是：

A. 按摩子宫

B. 宫腔纱布填塞

C. 结扎盆腔血管

D. 软产道缝合

答案：E

解析：从题干“出血颜色暗红，子宫软，轮廓不清”可判断该患者产后出血的主要原因是子宫收缩乏力。处理子宫收缩乏力所致出血，加强宫缩是最迅速、有效的止血方法。另外，还可通过宫腔内填塞纱布条或结扎血管等方法达到止血的目的。按摩子宫可起到加强宫

缩的作用，A 选项首选。

23. 导致子宫破裂的常见原因是：

- A. 瘢痕子宫
- B. 头盆不称
- C. 缩宫药使用不当
- D. 手术创伤

答案：A

解析：瘢痕子宫是近年来导致子宫破裂的常见原因。如既往剖宫产史、子宫肌瘤剔除术史、子宫穿孔史、宫角切除术后等，因子宫肌壁留有瘢痕，在妊娠晚期或分娩期由于子宫收缩的牵拉及宫腔内压力升高而致瘢痕破裂。

24. 某产妇，32 岁。足月分娩一男婴 3 分钟左右，产妇突然出现寒战、呛咳、气急，继而出现呼吸困难、发绀，心率 38 次/分，测血压 80/60。该患者最有可能发生了：

- A. 子宫破裂
- B. 胎盘早剥
- C. 羊水栓塞
- D. 过敏性休克

答案：C

解析：羊水栓塞发生于分娩过程中或分娩前后一段时间内，尤其是刚破膜不久，产妇突然出现寒战、呛咳、气急、烦躁不安、恶心、呕吐等前驱症状，继而出现呼吸困难、发绀、抽搐、昏迷、脉搏细数、

血压急剧下降，心率加快、肺底湿啰音，短时间内迅即进入休克状态。

从题干中可判断该患者发生了羊水栓塞。

25. 产后出血是指：

A. 胎儿娩出后 24 小时内阴道分娩者出血量超过 500ml，剖宫产者超过 1000ml

B. 胎盘娩出后 24 小时内阴道分娩者出血量超过 500ml，剖宫产者超过 1000ml

C. 胎盘娩出后 24 小时内阴道分娩者出血量超过 1000ml，剖宫产者超过 500ml

D. 胎儿娩出后 12 小时内阴道分娩者出血量超过 1000ml，剖宫产者超过 500ml

答案： A

解析： 产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内阴道分娩者出血量超过 500ml，剖宫产者超过 1000ml。产后出血是分娩期的严重并发症，居我国产妇死亡原因首位。

26. 下列哪项不是胎盘滞留的原因：

A. 膀胱充盈

B. 胎盘嵌顿

C. 胎盘剥离不全

D. 胎盘植入

答案： D

解析： 胎盘滞留：胎儿娩出后，胎盘多在 15 分钟内排出。若超

过 30 分钟仍未排出，胎盘剥离面血窦不能正常关闭，导致产后出血。常见原因有：(1)膀胱充盈：阻碍已剥离胎盘下降，使其滞留于宫腔，影响子宫收缩而出血；(2)胎盘嵌顿：使用宫缩剂不当，宫颈内口附近子宫平滑肌出现环形收缩，使已剥离的胎盘嵌顿于宫腔内，多为隐性出血；(3)胎盘剥离不全：第三产程胎盘完全剥离前过早牵拉脐带或按压子宫，影响胎盘正常剥离，导致胎盘剥离不全，已剥离部分血窦开放致出血。胎盘植入是胎盘因素导致产后出血的原因之一，而不是导致胎盘滞留的原因，故本题选 D。

27. 引起产后出血的原因不包括：

- A. 子宫收缩乏力
- B. 产妇精神心理因素
- C. 胎盘部分残留
- D. 凝血功能障碍

答案： B

解析： 子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道损伤及凝血功能障碍是引起产后出血的主要原因。产妇精神心理因素是影响正常分娩的因素。

28. 患者，女，30 岁。足月分娩一男婴后，阴道出现持续出血，血液不凝，造成产后出血最可能的原因是：

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎盘剥离不全
- C. 凝血功能障碍

D. 软产道裂伤

答案：C

解析：阴道流血不同原因所致的产后出血临床表现不同。(1)子宫收缩乏力所致出血：常表现为胎盘娩出后阴道大量出血，色暗红，子宫软，轮廓不清；(2)胎盘因素所致出血：多在胎儿娩出数分钟后出现大量阴道流血，色暗红；(3)软产道裂伤所致出血：多表现为胎儿娩出后立即出现阴道流血，色鲜红。隐匿性软产道损伤时，常伴阴道疼痛或肛门坠胀感，而阴道流血不多；(4)凝血功能障碍性出血：胎儿娩出后阴道流血呈持续性，且血液不凝。

29. 雄激素结合蛋白的生成部位：

- A. 支持细胞
- B. 曲精小管上皮
- C. 间质细胞
- D. 基底细胞

答案：A

解析：支持细胞分泌雄激素结合蛋白(A对)；睾丸间质细胞分泌雄激素(C错)；曲细精管上皮是精子生成的部位(B错)。

30. 月经的发生是由于：

- A. 雌激素急剧减少
- B. 孕激素急剧减少
- C. FSH 下降
- D. 雌孕激素急剧减少

答案： D

解析： 如果排卵后没有发生受精、着床，则黄体萎缩退化，导致血中雌、孕激素水平突然降低(D 对)，螺旋小动脉痉挛性收缩，因而内膜靠腔面三分之二的功能层组织出现缺血、变性、坏死，最后剥脱，血管破裂，出血，从而导致月经来潮。综上所述，本题选择 D。

31. 关于睾酮的生理作用，下列说法错误的是：

- A. 促进男性第二性征发育
- B. 睾酮抑制蛋白质的合成
- C. 睾酮抑制蛋白质分解
- D. 睾酮促进肾脏合成促红细胞生成

答案： B

解析： 睾酮作用：①胚胎性别分化；②促进男性第二性征发育(A 不选)；③促进精子形成；④促进蛋白质合成并抑制分解(B 错 C 对，故选 B)；⑤促进肾脏合成促红细胞生成(D 不选)。

32. 女性在排卵后使基础体温升高 $0.2\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，体温升高跟哪种激素有关：

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. FSH
- D. LH

答案： B

解析： 孕激素可增强能量代谢，也可作用于下丘脑体温调节中枢，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038134075003006052>