

急诊科优质护理服务理论试题

一、单选题

1.需特级护理的患者晨间护理的内容不包括（ ） [单选题] *

A 整理床单位

B.面部清洁和梳头

C.口腔护理

D.会阴护理 ✓

2.特级护理的患者晚间护理的内容包括（ ） [单选题] *

A.卧位护理

B.排泄护理

C.口腔护理 ✓

D.患者安全管理

3.协助患者翻身及有效咳嗽的间隔时间为（ ） [单选题] *

A.1次/2小时 ✓

B.2次/1小时

C.1次/3小时

D.1次/4小时

4.患者留置尿管护理需（ ） [单选题] *

A.2次/周

B.2次/日 ✓

C. 1次/日

D. 3次/日

5.对患者进行卧位护理时，可进行以下哪种项目（ ） [单选题] *

A. 床上使用便器

B. 协助床上移动 ✓

C. 床上洗头

D. 协助更衣

6.根据病情协助患者沐浴或擦浴间隔时间可以定为（ ） [单选题] *

A. 1次/2-3日 ✓

B. 1次/3-5日

C. 1次/4-6日

D. 1次/1-2日

7.整理床单位时，应遵循什么原则（ ） [单选题] *

A. 节约原则

B. 清洁原则

C. 节力安全原则 ✓

D. 舒适原则

8.整理床单位的工作目标是（ ） [单选题] *

A. 节约

B. 节力

C. 增进舒适 ✓

D. 安全

9.整理床单位时需要采用（ ）[单选题] *

- A. 干扫法
- B. 湿扫法 ✓
- C. 不需清扫
- D. 干.湿扫法均使用

10.进行面部清洁和梳头时，不需要（ ）[单选题] *

- A. 告知患者，做好准备
- B. 选择时间
- C. 协助患者取舒适体位
- D. 评估患者年龄 ✓

11.口腔护理可以（ ）[单选题] *

- A. 治疗口腔感染 ✓
- B. 使患者面部清洁
- C. 促进痰液排出
- D. 保持呼吸道通畅

12.化疗.放疗.使用免疫抑制剂患者可以用（ ）清洁口腔。[单选题] *

- A. 生理盐水
- B. 漱口水 ✓
- C. 灭菌用水
- D. 碳酸氢钠溶液

13.对昏迷患者口腔护理时，不需要使用（ ）配合进行。[单选题] *

- A. 开口器

B. 舌钳

C. 压舌板

D. 口咽通气管 ✓

14. 口腔护理时必须在（ ）清点核对棉球数量。[单选题] *

A. 操作前后 ✓

B. 操作中

C. 终末处置前后

D. 不需清点

15. 足部清洁的工作目标是（ ）[单选题] *

A. 保持足部清洁 ✓

B. 促进足部血液循环

C. 预防感染

D. 治疗感染

16. 协助患者进食、进水时，不需要评估的内容有（ ）[单选题] *

A. 液体出入量

B. 有无偏瘫

C. 视力减退

D. 听力减退 ✓

17. 协助患者进食过程中，护士应注意的内容不包括（ ）[单选题] *

A. 食物温度

B. 食物软硬度

C. 饮食种类 ✓

D. 患者的咀嚼能力

18. 为保证患者治疗效果，进食进水前先评估（ ） [单选题] *

A. 餐前.餐中用药 ✓

B. 饮食种类

C. 自行进食能力

D. 食物温度

19. 翻身叩背时，应严格掌握叩背原则（ ） [单选题] *

A. 从下至上.从外至内 ✓

B. 从上至下.从外至内

C. 从下至上.从内至外

D. 从上至下.从内至外

20. 翻身拍背时，（ ）禁止背部叩击。 [单选题] *

A. 高血压

B. 低血压 ✓

C. 胫骨骨折

D. 肢体肌力减退

21. 翻身前要评估患者（ ）是不正确的。 [单选题] *

A. 年龄

B. 体重

C. 性别 ✓

D. 病情

22. 压疮预防与护理应遵循的原则不包括（ ）。 [单选题] *

- A. 安全
- B. 节力 ✓
- C. 消毒隔离
- D. 无菌技术

23. 小便失禁的患者，根据医嘱可以采取相应的保护措施，如（ ） [单选题] *

- A. 进行膀胱功能训练
- B. 进行盆底肌的训练
- C. 可以采用尿垫 ✓
- D. 保护患者隐私

24. 出院病人床单位处理不妥的是（ ） [单选题] *

- A. 床头桌床旁椅用过氧乙酸擦拭
- B. 床单位消毒后铺备用床
- C. 被褥，枕芯可紫外线消毒
- D. 被褥，枕芯日光暴晒 5 小时 ✓

25. 测肛温时将肛温计轻轻插入肛门（ ） 厘米 [单选题] *

- A. 1-2 厘米
- B. 2-3 厘米
- C. 3-4 厘米 ✓
- D. 4-5 厘米

26. 下列不能使病人体温值偏高的因素有（ ） [单选题] *

- A. 进食后立即测量体温
- B. 使用镇静剂后立即测量体温 ✓

C. 下午 6 点测量体温

D. 焦虑时测量体温

27. 在发热的表现中，属于客观资料的是（ ） [单选题] *

A. 畏寒

B. 触摸有热感

C. 呼吸.脉搏增快

D. 皮肤苍白或颜面潮红 ✓

28. 尿潴留患者一次导出尿量不应超过（ ） [单选题] *

A. 800

B. 1000 ✓

C. 1500

D. 2000

29. 测量血压时听不清或有异常时，应间隔（ ）分钟后重测。 [单选题] *

A. 5-10 分钟

B. 10-15 分钟

C. 1-2 分钟 ✓

D. 30 分钟

30. 关于胃肠减压的护理下列哪项不正确（ ） [单选题] *

A. 病人应禁食

B. 保持减压管通畅

C. 胃管堵塞禁止冲洗 ✓

D. 注意口腔护理

31. 为阿米巴痢疾患者灌肠时，患者应取（ ） [单选题] *

- A. 左侧卧位
- B. 右侧卧位 ✓
- C. 截石位
- D. 头低足高位

32. 超声雾化吸入后，不需消毒的物品是（ ） [单选题] *

- A. 水槽 ✓
- B. 雾化罐
- C. 螺纹管
- D. 口含嘴

33. 雾化吸入的常用药物不包括（ ） [单选题] *

- A. 氨茶碱
- B. 庆大霉素
- C. 地塞米松
- D. 洛贝林 ✓

34. 强心苷中毒最常见的早期症状为（ ） [单选题] *

- A. 头痛
- B. 胃肠道反应 ✓
- C. 房室传导阻滞
- D. 低血钾

35. 为伤寒患者灌肠时，灌肠液量不能超过（ ） 毫升 [单选题] *

- A. 300

B. 500 ✓

C. 800

D. 1000

36. 密闭式静脉输液技术规范要点不包括 () [单选题] *

A. 无菌技术

B. 医嘱执行制度 ✓

C. 标准预防

D. 安全给药原则

37. 为患者置静脉留置针前应评估内容不包括 () [单选题] *

A. 病情

B. 治疗

C. 穿刺部位皮肤和血管情况

D. 肢体活动度 ✓

38. 采血后指导患者按压穿刺点 () 分钟 [单选题] *

A. 3 分钟

B. 5 分钟

C. 3-5 分钟

D. 5-10 分钟 ✓

39. 静脉输液拔针后嘱咐患者按压穿刺点 () 勿揉 [单选题] *

A. 2-3 分钟

B. 3-5 分钟 ✓

C. 5 分钟

D. 5-10 分钟

40. 物理降温时应避开的部位 () 除外 [单选题] *

A. 腹部

B. 枕后

C. 心前区

D. 腹股沟 ✓

41. 经鼻 (口腔) 吸痰前后给予高流量氧气吸入 () 分钟 [单选题] *

A. 2 分钟 ✓

B. 3 分钟

C. 5 分钟

D. 10 分钟

42. 吸痰过程中应密切观察患者血氧饱和度情况, 低于 () 时应立即停止吸痰 [单选题] *

A. 80%

B. 85%

C. 90% ✓

D. 95%

43. 吸痰时应遵循原则除外 () [单选题] *

A. 无菌技术

B. 标准预防

C. 消毒隔离

D. 节力原则 ✓

44. 吸痰过程中应鼓励患者 () [单选题] *

A. 深吸气

B. 多饮水

C. 咳嗽 ✓

D. 勤翻身

45. 心电监测技术的工作目标不包括 () [单选题] *

A. 遵医嘱正确监测心率

B. 心律

C. 动态评价病情变化

D. 治疗 ✓

46. 测口温时应将体温表怎样放置 () [单选题] *

A. 体温计平放于患者舌下 ✓

B. 体温计斜放于患者舌下

C. 体温计平放于患者舌上

D. 体温计斜放于患者舌上

47. 鼻饲患者胃内容物超过 () 毫升时，应通知医生减量或暂停鼻饲。 [单选题] *

A. 100

B. 120

C. 150 ✓

D. 200

48. 鼻饲液温度为 () [单选题] *

A. 35-38℃

B. 36-40℃

C. 38-40℃ ✓

D. 40-42℃

49. 为伤寒患者灌肠时，液面距肛门不得超过（ ） [单选题] *

A. 30 ✓

B. 50

C. 80

D. 100

50. 关于清洁灌肠，下列说法正确的是（ ） [单选题] *

A. 应反复多次，首先用肥皂水，再用温开水，直至排出液澄清

B. 应反复多次，首先用温开水，再用肥皂水，直至排出液澄清

C. 应反复多次，首先用肥皂水，再用生理盐水，直至排出液澄清

D. 应反复多次，首先用生理盐水，再用肥皂水，直至排出液澄清 ✓。

测验

一、A1 型题共 50 题（单句型最佳选择题）

1. 抢救完毕，（小时内应完成抢救护理记录） [单选题] *

A. 4

B. 6 ✓

C. 8

D. 12

E. 24

2. 隔离患者病房应有明显隔离标识，（为空气传播的隔离。） [单选题] *

A. 蓝色

- B. 粉色
- C. 黄色 ✓
- D. 红色
- E. 以上都不对

3. 尿失禁病人的护理错误的是（） [单选题] *

- A. 用接尿器接尿
- B. 保持皮肤清洁干燥，预防皮肤感染
- C. 必要时留置导尿
- D. 控制病人饮水，减少尿量 ✓
- E. 理解.安慰.鼓励病人

4. 静脉输液过程中发生空气栓塞的致死原因是（） [单选题] *

- A. 空气栓塞在主动脉入口
- B. 空气栓塞在肺动脉入口 ✓
- C. 空气栓塞在上腔动脉入口
- D. 空气栓塞在下腔动脉入口
- E. 空气栓塞在肺静脉入

5. 输液中发生肺水肿时吸氧需用 20%-30% 的乙醇湿化，其目的是（） [单选题] *

- A. 使病人呼吸道湿润
- B. 使痰液稀薄，易咳出
- C. 消毒吸入的氧气
- D. 降低肺泡表面张力
- E. 降低肺泡泡沫表面张力 ✓

6. 诊断 COPD 的必备条件是 () [单选题] *

- A. 完全可逆的气流受限
- B. 不完全可逆的气流受限 ✓
- C. 可逆的气流受限
- D. 不可逆的气流受限
- E. 完全气流受限

7. 进展期胃癌最早出现的症状是 () [单选题] *

- A. 上腹痛 ✓
- B. 严重消瘦
- C. 腹泻.便秘
- D. 恶心.呕吐
- E. 呕血.黑便

8. 低钾血症和高钾血症病人均可出现的临床表现是 () [单选题] *

- A. 心动过速
- B. 软瘫 ✓
- C. 腹胀
- D. 代谢性碱中毒
- E. 心电图 T 波高而尖

9. 颅内压增高的三主征是 () [单选题] *

- A. 血压升高.脉缓有力.呼吸深慢
- B. 头痛.眩晕.呕吐
- C. 头痛.呕吐.视神经乳头水肿 ✓

D. 头痛.颈项强直.复视

E. 昏迷，一侧瞳孔散大，对侧肢体痉挛性瘫痪

10. 《护士条例》的根本宗旨是（） [单选题] *

A. 维护护士合法权益

B. 促进护理事业发展，保障医疗安全和人体健康 ✓

C. 规范护理行为

D. 保持护士队伍稳定

E. 保证护理专业性

11. 护士被吊销执业证书的,自执业证书被吊销之日起()内不得申请执业注册。 () [单选题] *

A. 6个月

B. 1年

C. 2年 ✓

D. 3年

E. 5年

12. 下列病历资料不可以复印的有（）。 [单选题] *

A. 门诊病历

B. 医嘱单

C. 会诊意见 ✓

D. 手术同意书

E. 护理记录

13. 住院病历应在病人入院后()小时内完成。() [单选题] *

A. 6小时

- B. 8小时
- C. 12小时
- D. 24小时 ✓
- E. 48小时

14. 世界卫生组织(WHO) 提出的医务人员手卫生“五个重要时刻”不包括以下哪项? () [单选题] *

- A. 接触患者前
- B. 接触患者后
- C. 接触患者周围环境前 ✓
- D. 接触患者体液.血液后
- E. 无菌操作前

15. 标准预防措施不包括以下哪项? () [单选题] *

- A. 手卫生
- B. 安全注射
- C. 根据预期可能的暴露选用手套.口罩.护目镜.隔离衣等个人防护用品
- D. 在疫情流行期间增加环境.物体表面消毒频次 ✓
- E. 急救场所出现需要复苏时, 用简易呼吸气囊代替口对口人工呼吸

16. 静脉输液补钾时, 其浓度不应超过 () [单选题] *

- A. 0.1%
- B. 0.3% ✓
- C. 0.5%
- D. 0.7%

E. 1%

17. 护患之间建立良好信任关系的基础是 () [单选题] *

A. 信任

B. 友好

C. 真诚 ✓

D. 体谅

E. 关爱

18. 《中华人民共和国护理管理办法》的实施完善了护士注册及考试制度, 其颁布的时间是 () [单选题]

*

A. 1993 年 ✓

B. 1994 年

C. 1995 年

D. 1996 年

E. 1997 年

19. 正常人血 PH 值. PaCO₂. PaO₂ 正常值分别为 ()。 [单选题] *

A. 7. 20-7. 30, 30-40mmHg, 80-90mmHg

B. 7. 25-7. 35, 30-40mmHg, 80-90mmHg

C. 7. 30-7. 40, 35-45mmHg, 80-90mmHg

D. 7. 35-7. 45, 35-45mmHg, 90-100mmHg ✓

E. 7. 40-7. 50, 40-50mmHg, 90-100mmHg

20. 热疗法的局部生理效应为 () [单选题] *

A. 血管收缩

- B. 血流加快 ✓
- C. 神经传导速度减慢
- D. 代谢减慢
- E. 需氧量减少

21. 维生素 K 的主要功能是 () [单选题] *

- A. 促进细胞发育成熟
- B. 参与糖代谢
- C. 改善微循环
- D. 促进凝血功能 ✓
- E. 抗氧化的作用

22. 鼻饲饮食时，成人胃管插入深度为 () [单选题] *

- A. 30—35cm
- B. 35—40cm
- C. 45—55cm ✓
- D. 50—55cm
- E. 55—60cm

23. 少尿是指每小时排尿量少于 () [单选题] *

- A. 17ml ✓
- B. 18ml
- C. 19ml
- D. 20ml
- E. 21ml

24. 低盐饮食每日食盐摄入量不超过 () [单选题] *

A. 1g

B. 2g ✓

C. 3g

D. 4g

E. 5g

25. 做真菌培养时取分泌物的位置是 () [单选题] *

A. 双侧腭弓

B. 溃疡面 ✓

C. 咽部

D. 扁桃体

E. 舌面

26. 测尿肌酐时加入的防腐剂是 () [单选题] *

A. 浓盐酸

B. 乙酚

C. 甲苯 ✓

D. 稀盐酸

E. 甲醛

27. 血尿颜色是 () [单选题] *

A. 浓茶色

B. 深黄色

C. 白色

D. 洗肉水样 ✓

E. 鲜黄色

28. 超声雾化吸入器水温超过多少需要调换 () [单选题] *

A. 30℃

B. 40℃

C. 50℃ ✓

D. 60℃

E. 70℃

29. 输血前后及两袋血之间应加入的药物是 () [单选题] *

A. 5% 葡萄糖

B. 5% 葡萄糖盐水

C. 0.9% 氯化钠 ✓

D. 复方氯化钠

E. 碳酸氢钠等渗盐水

30. 成人的脉搏每分钟低于 60 次称缓脉，常见于 () [单选题] *

A. 休克病人

B. 虚脱病人

C. 高血压病人

D. 颅内压增高病人 ✓

E. 心房纤维性颤动病人

31. 口温测量的禁忌不包括 () [单选题] *

A. 昏迷.精神异常

B. 心肌梗死 ✓

C. 不合作

D. 口鼻手术

E. 呼吸困难

32. 患者不慎将体温计咬破，可口服（ ） [单选题] *

A. 硫酸镁

B. 石蜡油

C. 蛋黄

D. 牛奶 ✓

E. 清水

33. 如有运动、沐浴、吸烟、进食、情绪激动、紧张等情况时，须让患者休息（ ）测量血压。（ ） [单选题]

*

A. 1 小时

B. 30 分钟 ✓

C. 40-50 分钟

D. 20-30 分钟

E. 10-15 分钟

34. 尽量保持患者舒适，又能减少或避免摩擦力和剪切力的体位是侧卧位<（ ）度、抬高床头<（ ）度。

（ ） [单选题] *

A. 30， 30 ✓

B. 30， 15

C. 15， 30

D. 20, 30

E. 30, 20

35. 夹板扎带松紧度以夹板上下移动 () cm 为宜。() [单选题] *

A. 1 ✓

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

36. 全血或红细胞血出库后应(内输完 () [单选题] *

A. 30 分钟

B. 1 小时

C. 2 小时

D. 4 小时 ✓

E. 6 小时

37. 高热降温时, 冰袋不可放置的部位是 () [单选题] *

A. 耳廓 ✓

B. 腹股沟

C. 腋窝

D. 颈部两侧

E. 前额

38. 护士执业注册有效期届满需要继续执业的, 应当在护士执业注册有效期届满前 () 向执业地省、自治区、直辖市人民政府卫生主管部门申请延续注册。() [单选题] *

- A. 20 天
- B. 30 天 ✓
- C. 1 年
- D. 2 年
- E. 3 年

39. 护士执业注册的有效期为（） [单选题] *

- A. 2 年
- B. 5 年 ✓
- C. 8 年
- D. 10 年
- E. 3 年

40. 护士条例的根本宗旨是（） [单选题] *

- A. 维护护士合法权益
- B. 促进护理事业发展，保障医疗安全和人体健康 ✓
- C. 规范护理行为
- D. 保持护士队伍稳定
- E. 保障护士安全

41. 营养性巨幼细胞贫血，缺乏最多的物质是（） [单选题] *

- A. 内因子
- B. 蛋白质
- C. 铁剂
- D. 维生素 B12

E.叶酸 ✓

42. 下肢深静脉血栓脱落容易栓塞的部位是 () [单选题] *

A. 肾

B. 脑

C. 肝

D. 肺 ✓

E. 心

43. 急性白血病出血的主要原因是 () [单选题] *

A. 红细胞减少

B. 血小板减少 ✓

C. 白细胞减少

D. 凝血因子减少

E. 弥漫性血管内凝血

44. 大面积烧伤后 48 小时内最主要的病理生理反应为 () [单选题] *

A. 低血容量性休克 ✓

B. 脓毒症

C. 急性呼吸衰竭

D. 急性肾损伤

E. 应激性溃疡

45. 患者麻醉前肌注阿托品的目的是 () [单选题] *

A. 镇静

B. 催眠

C.减少呼吸道分泌物 ✓

D.止痛

E.强心

46.不属于医院感染的是（） [单选题] *

A. 骨盆骨折病人住院第4天查出尿路感染

B. 肺炎链球菌感染的病人进行痰培养分离出肺炎克雷伯杆菌

C. 出生4天的新生儿诊断为“新生儿脐炎”

D. 保洁员在倾倒医疗垃圾时不慎被针头刺伤脚踝致局部感染

E. 脑卒中病人的骶尾部见到压之不褪色的红斑 ✓

47.协助病人向平车挪动的顺序为（） [单选题] *

A. 上身、臀部、下肢 ✓

B. 上身、下肢、臀部

C. 下肢、臀部、上身

D. 臀部、下肢、上身

E. 臀部、上身、下肢

48.输液时液体滴入不畅，局部肿胀，检查无回血，此时应（） [单选题] *

A. 改变针头方向

B. 更换针头重新穿刺 ✓

C. 抬高输液瓶位置

D. 局部热敷

E. 用注射器推注

49.关于采集血标本的操作方法，错误的是（） [单选题] *

- A. 严禁在输液的针头处采血
- B. 如需空腹采血，应提前通知病人禁食
- C. 全血标本不可摇动试管以防溶血 ✓
- D. 血清标本应注入干燥试管
- E. 血培养标本应在使用抗生素前采集

50. 危重症病人护理中首先观察 () [单选题] *

- A. 意识状态的改变 ✓
- B. 有无脱水、酸中毒
- C. T、P、R、BP、瞳孔
- D. 肢体活动情况
- E. 大小便情况

二. A2 型题共 50 题 (病例摘要型最佳选择题)

1. 刘先生，30 岁，诊断为“伤寒”，对于刘先生使用过的床单，正确的处理步骤是 () [单选题] *

- A. 先灭菌，再清洁、消毒、灭菌 ✓
- B. 清洁后用高压蒸汽灭菌
- C. 清洗后用化学消毒剂浸泡消毒
- D. 直接采取燃烧法
- E. 先用消毒液浸泡再清洗

2. 吴先生，58 岁，诊断为“肝硬化”，曾有乙肝病史 20 年。护士王某在给吴先生换药过程中发现手套破损，她正确的做法是 () [单选题] *

- A. 加戴一副手套
- B. 用消毒液消毒破损处

- C. 用胶布粘贴破损处
- D. 用无菌纱布覆盖破损处
- E. 立即更换手套 ✓

3.周先生,48岁,诊断为“急性传染性非典型肺炎”,对于隔离区域的划分,属于污染区的区域为 ()

[单选题] *

- A. 储物间
- B. 治疗室
- C. 医务人员值班室
- D. 内走廊
- E. 病室 ✓

4.张护士,女,26岁,在外科工作,某日在为一位 HIV 阳性病人拔针时不慎被带血的针头刺伤食指,

应首先采取的措施是 () [单选题] *

- A. 用流动水和肥皂水反复冲洗
- B. 用 75% 乙醇或 0.5% 碘伏消毒伤口
- C. 从伤口旁轻轻挤压出受伤部位的血液 ✓
- D. 向医院感染管理科报告
- E. 检测抗体

5.病人李某,胆石症术后感到疼痛,为减轻病人疼痛,10am 医生开出医嘱:布桂嗪 100mg im sos ,此

项医嘱失效时间为 () [单选题] *

- A. 当天 2pm
- B. 当天 10pm ✓
- C. 第二日 10am

D. 第二日 10pm

E. 医生开出停止时间

2、一急性重症肺炎患者，体温 39℃，脉搏 110 次/分，呼吸 38 次/分，血压 120/90mmHg 。患者

咳嗽，呼吸急促，双肺及喉头痰鸣音，你会先如何处理患者（） [单选题] *

A 给以冰敷降温

B 给予心电监护

C 解除呼吸道梗阻 ✓

D 加快静脉输液速度

E 立即给氧

7.患者，女性，28 岁，1 周来出现晨起眼睑水肿，肉眼血尿，疑急性肾小球肾炎，需留 12 小时尿作艾

迪计数。应在尿液中加入（） [单选题] *

A. 甲醛 ✓

B. 乙醛

C. 乙酚

D. 稀盐酸

E. 浓盐酸

8.病人吴某，5 分钟前误服硫酸，目前病人神志清楚，最好立即给病人（） [单选题] *

A. 用硫酸镁导泻

B. 用 1:15000 高锰酸钾液洗胃

C. 用 1%~4% 碳酸氢钠液洗胃

D. 口服碳酸氢钠

E. 饮牛奶 ✓

9.病人张某，患尿毒症，护士查房时发现他表情冷漠，反应迟钝，这种表现是（）[单选题] *

- A. 意识模糊 ✓
- B. 谵妄
- C. 嗜睡
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

10.齐某，男，62岁。诊断为大量胸腔积液，拟行减压抽液治疗。首次胸腔穿刺放液量应（）[单选题] *

- A. 少于 1000ml
- B. 少于 800ml
- C. 少于 600ml ✓
- D. 少于 500ml
- E. 少于 700ml

11.李某，男，53岁。出院前6分钟步行试验，行走距离为320米。该病人的心力衰竭程度为（）[单选题] *

- A. 极轻度心力衰竭
- B. 轻度心力衰竭
- C. 中度心力衰竭 ✓
- D. 重度心力衰竭
- E. 极重度心力衰竭

12.王某，女，49岁。诉心悸。心电图：心房扑动，心室率130次/分。为终止发作，最有效的方法是（）

[单选题] *

- A. 维拉帕米

B. 艾司洛尔

C. 洋地黄

D. 华法林

E. 同步直流电复律 ✓

13. 张女士, 33岁, 头部损伤后, 乳突部皮下和咽结膜下有淤血, 耳部有脑脊液流出, 听力丧失, 眩晕。

正确的处理是 () [单选题] *

A. 应用利尿脱水剂

B. 给予镇静镇痛药

C. 用棉球堵塞外耳道

D. 头低足高位卧床休息

E. 用生理盐水棉球清洁外耳道 ✓

14、某患者误将一小块牛骨头吞入食管, 经 X 线检查该骨头卡在食管的第二个狭窄处。食管第 2 处狭

窄距中切牙距离 () [单选题] *

A、15 cm

B、25 cm ✓

C、35 cm

D、45 cm

E、55 cm

15. 赵先生, 35岁, 肱骨干骨折后局部软组织肿胀明显, 手法复位后行石膏固定术, 术后护士在观察肢

端血运有无障碍时, 最不可能发生的是 () [单选题] *

A. 发绀

B. 肿胀

- C. 疼痛
- D. 皮温升高 ✓
- E. 脉搏减弱或消失

16. 患者，女性，30 岁，扁桃腺炎，注射青霉素后第 10 天自觉皮肤瘙痒，腹痛。体检：T37.8℃，膝关节肿痛，全身淋巴结肿大，患者可能发生（） [单选题] *

- A. 皮肤过敏反应
- B. 消化道过敏反应
- C. 血清病型反应 ✓
- D. 关节炎
- E. 过敏性休克

17. 患者，男性，25 岁。在工作中不慎被生锈铁钉刺伤左足底，伤口较深，来院治疗。医生对伤口处理后，要求做破伤风抗毒素注射，护士在询问时得知病人半月前曾用过此药，皮试结果阳性。在脱敏注射过程中病人出现轻微反应，待反应消退后护士应采取的措施是（） [单选题] *

- A. 按原计划注射
- B. 延长每两次注射间隔时间
- C. 减少每次注射剂量，缩短间隔时间
- D. 增加每次注射剂量，延长间隔时间
- E. 减少注射剂量，增加注射次数 ✓

18. 患者，女性，30 岁，风心病二尖瓣狭窄合并关闭不全，2 个月前外出旅游时着凉，此后间断低热，乏力、心悸、胸闷等症状较前加重，近日手指出现豌豆大的紫色痛性小结。这种结节最可能是（） [单选题]

*

- A. Janeway 损害

B. 细菌感染

C. 类风湿结节

D. Osler 结节 ✓

E. Roth 斑

19. 患者，女性，23 岁，胸部隐痛 5 日，伴低热，气促。查体：心界明显扩大，心尖搏动位于心浊音界内 2cm，肝位于肋下 5cm，心电图示窦性心动过速，低电压，广泛性 T 波低平。本例最可能的诊断为（）

[单选题] *

A. 感染性心内膜炎

B. 病毒性心肌炎

C. 急性心包炎 ✓

D. 扩张型心肌病

E. 风湿性心肌炎

20. 患者，女性，20 岁，背痛伴后突畸形已 3 年，胸椎 11~12 椎体骨质破坏并压缩成楔形，相应椎间隙变窄，椎旁软组织梭形肿胀，提示（） [单选题] *

A. 脊椎骨折

B. 脊椎结核 ✓

C. 化脓性脊椎炎

D. 脊椎骨软骨炎

E. 强直性脊椎炎

21. 患者，女性，孕 1 产 0，孕 41 周，胎儿估计 3400g，骨盆测量：坐骨结节间径 7cm，出口后矢状径 6.5cm，耻骨弓角度小于 90°，对其处理正确的是（） [单选题] *

A. 行会阴侧切术

- B.产钳术
- C.行剖宫产术 ✓
- D.等待自然分娩
- E.静脉滴注缩宫素

22.患者，男性，66岁，晨起时自觉上下肢麻木，但可自行去厕所，回卧室时因左下肢无力而跌倒。查体：神清，左侧上下肢瘫痪，口眼不歪斜。应首先考虑（）[单选题] *

- A.基底节出血
- B.脑栓塞
- C.脑血栓形成 ✓
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑外伤

23.患者，男性，71岁。有吸烟史43年，患者主诉右胸痛，咳痰，痰中带有血丝，X线胸片显示右肺门增大，为诊断疾病，下列最佳的检查应是（）[单选题] *

- A.肺功能检查
- B.肺部CT
- C.纤维支气管镜检查 ✓
- D.痰找结核菌
- E.支气管造影

24.患者，男性，65岁，呼吸由浅慢逐渐加快，加深，后又逐渐变浅，变慢，以至暂停，数秒后又重复上述呼吸状态。该患者的呼吸方式为（）[单选题] *

- A.潮式呼吸 ✓
- B.间断呼吸

C. 波动性呼吸

D. 叹息样呼吸

E. 深大呼吸

25. 患儿，男，10岁，3天来体温持续升高，达40℃，伴腹痛、腹泻、里急后重，大便每日十余次，量少，为黏液脓血便。此患者最可能的诊断是（）[单选题] *

A. 肝炎

B. 伤寒

C. 结肠炎

D. 斑疹伤寒

E. 细菌性痢疾 ✓

26. 一急性重症肺炎患者，体温39℃，脉搏110次/分，呼吸38次/分，血压120/90mmHg，患者咳嗽，呼吸急促，双肺及喉头痰鸣音，你会先如何处理患者（）[单选题] *

A. 给以冰敷降温

B. 给予心电监护

C. 解除呼吸道梗阻 ✓

D. 加快静脉输液速度

E. 立即给氧

27. 有一患者在心电监测中显示有频发室性期前收缩，下列哪种药物为首选（）[单选题] *

A. 普鲁卡因

B. 胺碘酮

C. 维拉帕米

D. 利多卡因 ✓

E.艾司洛尔

28. 患者，女性,产后 2 周，主诉小腿疼痛、肿胀、皮肤发白，考虑为血栓性静脉炎。关于该患者的护理措施正确的是（） [单选题] *

A. 告知患者不必焦虑，属产后正常生理现象

B. 患肢抬高并制动 ✓

C. 鼓励患者下床活动

D. 帮助患者按摩下肢

E.鼓励患者进行盆底及下肢锻炼

29. 患者，男性，29 岁，3 年前因消化性溃疡做过“胃大部切除术”，近 3 个月来经常头晕、乏力、心悸、体力逐渐下降，临床诊断为缺铁性贫血。患者贫血的最可能原因是（） [单选题] *

A. 铁摄入不足

B. 铁需要量增加

C. 铁吸收不良 ✓

D. 铁消耗过多

E.铁不能利用

30. 男性，30 岁，检查发现气管向左侧移位，右侧胸廓饱满，触觉语颤减弱，叩诊浊音，应考虑最可能的原因是（） [单选题] *

A. 肺气肿

B. 气胸

C. 胸腔积液 ✓

D. 肺炎

E.肺脓肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038136051140007002>