

临床执业医师资格（内科学）考试试题库（一）以及答案

内科学模拟试题

[A1 型题]

以下每一考题以下有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 诊断慢支的标准是

- A. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月
- B. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病二个月连续三年
- C. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病持续三个月，连续四年
- D. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病三个月，连续三年，除外其他心、肺疾患
- E. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月，连续两年，并除外其他心肺疾患

2. 下列哪一个选项是阻塞性肺气肿气肿型的特点

- A. 多发生于青年人
- B. 有紫绀
- C. 咳嗽较轻
- D. 痰量大、粘液脓性
- E. 桶状胸不明显

3. 下列哪一项是引起肝豆状核硬化的原因

- A. 铁沉积
- B. 铜沉积
- C. 酒精作用
- D. 药物作用
- E. 胆汁淤积

4. Rotch 征是指

- A. 心浊音界向两侧增大，呈绝对浊音
- B. 心尖冲动微弱，位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及
- C. 背部左肩胛角下呈浊音，语颤增强和支气管呼吸音
- D. 胸骨右缘第 3-6 肋间出现实音
- E. 心音低而遥远

5. 环磷酰胺的毒性作用是

- A. 骨髓抑制、恶心呕吐、脱发、出血性膀胱炎、肝损害
- B. 胃肠道反应、口腔溃疡、骨髓抑制、巨幼红样变
- C. 骨髓抑制、心脏毒性、胃肠道反应、口腔粘膜炎、脱发
- D. 骨髓抑制、恶心呕吐、粘膜炎、肝功能损害
- E. 发热等过敏反应、高尿酸血症、低血浆蛋白、出血、白细胞少、高血糖、胰腺炎、氯质血症

6. 如骨髓中以多颗粒的早幼粒细胞为主，此类细胞在非红系细胞中 $\geq 30\%$ ，则为

- A. 急性粒细胞白血病未分化型
- B. 急性粒细胞白血病部分分化型

- C. 急性早幼粒细胞白血病
- D. 急性粒一单核细胞白血病
- E. 急性单核细胞白血病

7. Cullen 征是指

- A. 上腹可扪及肿块，有肌紧张及反跳痛
- B. 明显腹胀、肠鸣音稀少而低
- C. 急性胰腺炎下见肋腹皮肤呈灰紫色斑
- D. 急性胰腺炎下见脐周皮肤青紫
- E. 胆总管或壶腹嵌顿性结石时出现黄疸

8. 关于肾上腺皮质病的实验室检查结果中论述正确的是

- A. 尿 17-羟中度增多，约 55—83umol
- B. 尿 17-酮中度增多，69umol 左右
- C. 大剂量地塞米松抑制试验少数可被抑制
- D. 血浆 ACTH 测定降低
- E. CRH 兴奋试验少量有反应

9. 下列哪一项是 2 型糖尿病患者的主要死因

- A. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- B. 糖尿病肾病
- C. 心脑血管病变
- D. 糖尿病视网膜病
- E. 酮症酸中毒

10. Mobius 征

- A. 眼球向前突出，突限度一般不超过 18mm
- B. 上眼睑退缩，睑裂增宽
- C. 双眼向下看时，上眼睑不能随眼球下落
- D. 向上看时，前额皮肤不能皱起
- E. 两眼视近物时，眼球辐辏不良

11. 关于糖尿病酮症酸中毒的描述中正确的是

- A. 多发于老年，常无糖尿病史、常有感染、呕吐、腹泻等病史
- B. 起病急、有饥饿感、多汗、心惊、手抖等交感神经兴奋表现、
- C. 皮肤潮湿多汗、呼吸正常
- D. 脉搏细速，血压下降
- E. 尿糖阳性、尿酮阴性

12. 在我国，引起慢性肺原性心脏病最常见的原因是

- A. 原发性肺动脉高压症
- B. 慢支并发阻塞性肺气肿
- C. 肺间质纤维化
- D. 慢性弥漫性肺间质纤维化
- E. 支气管哮喘

13. 下列心脏疾病中宜采用洋地黄类药物治疗的是
- A. 预激综合征合并心房颤动
 - B. 二度或高度房室传导阻滞
 - C. 病态窦房结综合征
 - D. 单纯舒张性心力衰竭伴流出道梗阻
 - E. 伴有心房颤动而心室率快速的重度收缩性心力衰竭
14. 下列哪一项表现为胃恶性溃疡
- A. 周期性胃痛明显，无上腹包块
 - B. 粪便隐血持续阳性
 - C. 充盈直径 $<2.5\text{cm}$ ，壁光滑，位于胃腔轮廓之外
 - D. 胃液分析胃酸正常或偏低，但无真性缺酸
 - E. 胃镜检查见溃疡圆或椭圆形，底平滑，边光滑，白或灰白苔，溃疡周围粘膜柔软，可见皱襞向溃疡集中
15. 下列哪一项是十二指肠溃疡的主要病因
- A. 幽门螺杆菌感染(H. Pylori 感染)
 - B. 胃酸分泌过多
 - C. 应激和心理因素
 - D. 遗传素质
 - E. 吸烟
16. 在治疗结肠 Crohn 病患者，首选
- A. 考来烯胺
 - B. 阿托品
 - C. 硫唑嘌呤
 - D. 柳氮磺胺吡啶
 - E. 肾上腺糖皮质激素
17. 关于紫癜型过敏性紫癜的临床表现中，描述正确的是
- A. 可有粘膜下水肿、出血
 - B. 血管壁可有灶性坏死及血小板血栓形成
 - C. 脐周围或下腹部呈阵发性绞痛或持续性钝痛
 - D. 蛋白尿、血尿、管型尿
 - E. 关节肿胀、疼痛
18. Plummer-Vinson 征是指
- A. 口角炎、舌炎、舌乳头萎缩
 - B. 皮肤干燥、角化、萎缩、无光泽
 - C. 咽下时有梗阻感
 - D. 指甲条纹隆起，指甲扁平，甚至呈“反甲”
 - E. 贫血伴慢性萎缩性胃炎
19. 下列哪项表现可见于急性再生障碍性贫血

- A. 感染较轻以上呼吸道为主
- B. 中性粒细胞 $>0.5 \times 10^9 / L$
- C. 网织红细胞绝对值 $>15 \times 10^9 / L$
- D. 出血轻，多见于皮肤及粘膜
- E. 血小板计数 $<20 \times 10^9/L$

20. 按累及肺小叶的部位，阻塞性肺气肿的病理分型为

- A. 全小叶型、小叶中央型；气肿型
- B. 全小叶型、小叶中央型、混合型
- C. 支气管炎型、小叶中央型、全小叶型
- D. 全小叶型、支气管类型、混合型
- E. 中央型、气肿型、混合型

21. 下列哪一项在支气管哮喘的诊断中最有意义

- A. 血气分析
- B. 血常规检查
- C. 临床症状和体征
- D. 呼吸功能检查
- E. 胸部 X 线检查

22. 下列哪项应考虑癌性胸水

- A. 胸水清澈、静置不凝固，比重 $<1.016 - 1.018$ ，以淋巴细胞和间皮细胞为主
- B. 胸水是谈血色，红细胞 $>10 \times 10^{10} / L$
- C. 胸水淡黄绿色，比重 >1.018 ，白细胞高于 $500 \times 10^6 / L$ ，pH <7.30 ，Rivalta 试验 阳性
- D. 胸水有臭味，比重 >1.018 ，白细胞为 $10 \times 10^8 / L$ ，PH <7.00 ，Rivalta 试验阳性
- E. 血性胸水，红细胞 $>5.0 \times 10^8 / L$ ，胆固醇含量增高，LDH $>500IU / L$

23. 下列哪一项为亚急性细菌性心内膜炎的特点

- A. 心室扩张，室壁变薄，可见纤维化瘢痕及附壁血栓，常合并各种类型的心律失常
- B. 视网膜见卵圆形出血斑块伴中心呈白色
- C. 不均等的心室间隙肥厚
- D. 心室腔变小，心肌活检见心肌细胞畸形肥大排列紊乱
- E. 常有发热和与发热程度不平行的心动过速及各种心律失常

24. 下列哪一症状是急性胰腺炎患者预后不良的征象

- A. 剧烈腹痛
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 血钙 $<1.75mmol/L$
- D. 血清淀粉酶 $>500V$ (Somogyi 法)
- E. 胁腹皮肤呈灰紫色斑

25. 下列哪一项是弓[起上消化道出血最常见的原因

- A. Mallory-Weiss 综合征
- B. Zollinger —Ellison 综合征

- C. 食管—胃底静脉曲张
- D. 消化性溃疡
- E. 食管癌

26. 下列哪项属于肾功能不全的衰竭期

- A. $GFR > 50\text{ml/min}$, $Cr > 445\mu\text{mol/L}$, $BUN < 9\text{mmol/L}$
- B. $GFR 25 \sim 50\text{ml/min}$, $Cr > 178\mu\text{mol/L}$, $BUN < 9\text{mmol/L}$
- C. $GFR < 25\text{ml/min}$, $Cr > 178\mu\text{mol/L}$, $BUN > 20\text{mmol/L}$
- D. $GFR 25 \sim 50\text{ml/min}$, $Cr > 445\mu\text{mol/L}$, $BUN > 20\text{mmol/L}$
- E. $GFR < 25\text{ml/min}$, $Cr > 445\mu\text{mol/L}$, $BUN > 2\text{mmol/L}$

27. 下列哪种贫血患者可能会出现异嗜癖

- A. 缺铁性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 自身免疫性溶血性贫血
- E. 再生障碍性贫血

28. 对急非淋白血病目前常用标准的化疗诱导缓解方案是

- A. VAP 方案
- B. VP 方案
- C. DA 方案
- D. VADP 方案
- E. VDP 方案

29. 治疗特发性血小板减少性紫癜，应首选

- A. 肾上腺糖皮质激素
- B. 输血及血小板悬液
- C. 静脉滴注大剂量丙种球蛋白
- D. 环磷酰胺
- E. 硫唑嘌呤

30. 如发现室性早搏或室性心动过速，应首选

- A. 采用同步直流电复律
- B. 肌肉或静脉注射阿托品 0.5—1mg
- C. 口服美西律 15mg 、普鲁卡因胺 250—500mg 或妥卡尼 600mg
- D. 静脉注射利多卡因 50—100mg
- E. 应用洋地黄类、维拉帕米

31. 在我国，二尖瓣关闭不全的最常见病因是

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 风心病
- C. 感染性心内膜炎
- D. 二尖瓣环和环下部钙化

E. 冠心病

32. 心包炎的特异性征象是

- A. 心浊音界向两侧增大、呈绝对浊音
- B. 心尖冲动微弱，位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及
- C. 心前区痛
- D. 呼吸困难
- E. 心包摩擦音

33. Beck 三联征是指

- A. 血压突然下降或休克、心包摩擦音、呼吸困难
- B. 心包摩擦音、颈静脉显著怒张，呼吸困难
- C. 血压突然下降或休克、颈静脉显著怒张、心包摩擦音
- D. 心音低弱、遥远、颈静脉显著怒张、呼吸困难
- E. 血压突然下降或休克、颈静脉显著怒张、心音低弱、遥远

34. 急性胃炎的确诊依赖于

- A. 急诊纤维胃镜检查
- B. B 型超声波检查
- C. 腹 X—ray 平片
- D. 血常规检查
- E. 胃粘膜活检

35. 高血压Ⅲ级的眼底表现是

- A. 视网膜动脉变细
- B. 视网膜动脉狭窄、动脉交叉压迫
- C. 眼底出血或棉絮状渗出
- D. 出血或渗出物伴有视神经乳头水肿
- E. 以上都不是

36. 舒张性心力衰竭的心室压力——容量曲线

- A. 向右移位
- B. 向左上移位
- C. 向左下移位
- D. 向右上移位
- E. 向右下移位

37. 下列各种情况中，宜采用放射性 ^{131}I 治疗的是

- A. 白细胞在 $3 \times 10^9 / \text{L}$ 以下或中性粒细胞低于 $1.5 \times 10^9 / \text{L}$ 者
- B. 重症浸润性突眼症
- C. 严重心、肝、肾等功能衰竭或活动性肺结核者
- D. 对抗甲状腺药有过敏等反应而不能继用，或长期治疗无效，或治疗后复发者
- E. 甲状腺危象

38. 糖尿病失明的主要原因是

- A. 视神经病变
- B. 糖代谢异常
- C. 血凝块机化后，纤维组织牵拉引起视网膜脱离
- D. 眼部化脓性感染
- E. 以上均不正确

39. 类风湿性关节炎最早出现的关节症状是

- A. 晨僵
- B. 关节畸形
- C. 关节肿
- D. 关节痛
- E. 关节功能障碍

40. 对于一氧化碳中毒的患者，如有频繁抽搐，应首选

- A. 地西洋 10-20mg 静滴
- B. 静滴苯妥英钠 0.5—1g
- C. 静脉滴注 20 %甘露醇
- D. 静脉滴注肾上腺糖皮质激素
- E. 注射呋塞米

41. 下列哪一项不是 Henoch —Schonlein 紫癜的临床表现

- A. 脐周围或下腹部出现阵发性绞痛或持续性钝痛
- B. 有粘膜下水肿、出血
- C. 关节肿胀、疼痛
- D. 可有恶心、呕吐、腹泻、便血
- E. 有出血性丘疹或小形荨麻疹

42. 关于溃疡性结肠炎的叙述中，不正确的是

- A. 里急后重，常有粘液，脓血样便
- B. 有发热症状，右下腹或疼痛较重
- C. 可有中毒性巨结肠
- D. 粘膜脆性增加，触之易出血
- E. 常见炎性息肉

43. 下列哪一项不是中晚期食管癌的病理形态

- A. 斑块型
- B. 髓质型
- C. 蕈伞型
- D. 溃疡型
- E. 缩窄型

44. 关于肝细胞性黄疸的特征，论述错误的是

- A. 皮肤和巩膜呈浅黄至深金黄色，皮肤有时有瘙痒

- B. 血中非结合和结合胆红素均增高
- C. 超声显像检查示胆内、外胆管扩张，有光团及声影
- D. 血清转氨酶明显增高
- E. 血中肝炎病毒标记物常呈阳性

45. 有关急性水肿性胰腺炎，下列哪一项是错误的

- A. 胰腺肿大，质地结实
- B. 可见轻度黄疸
- C. 腹痛多 3—5 天后缓解
- D. 多数病人可能发生休克
- E. 可发生假性囊肿

46. 当肝性脑病患者出现抽搐时，不应使用下列哪种药物

- A. 安定
- B. 东莨菪碱
- C. 水合氯醛
- D. 扑尔敏
- E. 异丙嗪

47. 下列不属于阿托品化指标的是

- A. 心率增快
- B. 颜面潮红
- C. 瞳孔较前增大
- D. 肺部罗音减少
- E. 口干、皮肤干燥

48. 关于清除进入人体尚未吸收的毒物，下列不正确的是

- A. 患者处于昏迷、惊厥状态，吞服石油蒸馏物、腐蚀剂不应催吐
- B. 食道静脉曲张患者不宜洗胃
- C. 洗胃液每次注入不宜超过 250ml，以免促使毒物进入肠内
- D. 导泻时，常使用油类泻药，以利于各种毒物排出
- E. 毒物溅入眼内，应立即用清水彻底冲洗

49. 关于恶性高血压的特点的叙述，下列错误的是

- A. 由中度、重度高血压患者发展而来
- B. 细、小动脉透明性变性
- C. 眼底血渗出和乳头水肿
- D. 肾功能不全，可有心、脑功能障碍
- E. 如不及时治疗，预后不佳，可死于肾衰、脑卒中或心衰

50. 关于血清心肌酶含量变化及性质的论述中，不正确的是。

- A. 肌酸磷酸肌酶在起病 6 小时内升高，18—24 小时达高峰，3—4 日恢复正常
- B. 谷—草转氨酶在起病 6—12 小时后升高，24-48 小时达高峰，3-6 日降至正常
- C. 乳酸脱氢酶有起病 8—10 小时后升高，2—3 日达到高峰，1—2 周恢复正常

- D. CPK 的同工酶 CPK—MB 和 LDH 的同工酶 LDH1 诊断的特异性最高
E. CPK—MB 起病后 24 小时内增高，3-4 日达高峰，1—2 周恢复正常

51. 下列哪一种风湿性疾病无晨僵及对称性多关节炎症状

- A. 风疹关节炎
B. 风湿性关节炎
C. 系统性红斑狼疮
D. 类风湿性关节炎
E. 病毒性肝炎关节炎

52. 对患有哮喘病的甲亢患者，禁止使用哪种药物

- A. 甲基硫氧嘧啶
B. 阿替洛尔
C. 丙基硫氧嘧啶
D. 普奈洛尔
E. 美托洛尔

53. Auer 小体可见于下列疾病，除了

- A. 急性粒细胞白血病
B. 急性单核细胞白血病
C. 急性淋巴细胞白血病
D. 急性早幼粒细胞白血病
E. 急性粒—单细胞白血病

54. 下列叙述中不正确的是

- A. 异烟肼在细胞内外均有杀菌作用，称全杀菌剂
B. 链霉素很少渗入吞噬细胞，在偏酸环境下方能发挥最大作用
C. 吡嗪酰胺可渗入吞噬细胞，且只在偏酸环境下有杀菌作用
D. 对氨基水杨酸为抑制剂
E. 利福平为全杀菌剂

55. 在原发性肾病综合征中，关于微小病变病的特点，叙述不正确的是

- A. 光镜下肾小球基本正常，可见近曲小管上皮严重脂肪变性
B. 免疫荧光检查阴性
C. 电镜下于系膜区及皮下可见电子致密物
D. 镜下血尿发生率低，不出现肉眼血尿
E. 对激素治疗敏感，并可自发缓解，但却易复发

56. 下列除哪项外，均可诊断糖尿病

- A. 症状+ 随机血糖 $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$ + 空腹血糖 $\geq 7.8 \text{ mmol/L}$
B. 随机血糖 $\geq 7.8 \sim 11.1 \text{ mmol/L}$ + 2h 血糖 $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$
C. 口服葡萄糖后 1h 血糖 $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$
D. 两次 OGTT 2h 血糖 $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$
E. 空腹血糖 $\geq 5.6 \sim 7.8 \text{ mmol/L}$ + 2h 血糖 $\geq 7.8 \sim 11.1 \text{ mmol/L}$

57

- A. 深吸气时，脾脏在肋下不超过 2cm
- B. 深吸气时，脾脏在肋下不超过 3cm
- C. 深吸气时，脾脏在肋下 3cm 至脐水平线
- D. 深吸气时，脾脏超过脐水平线以下
- E. 以上都不正确

58. 语言震颤减弱可见于

- A. 肺组织内有大量空腔接近胸壁
- B. 大叶性肺炎实变期
- C. 肺泡内含气过多，如肺气肿
- D. 肺结核空洞
- E. 肺梗塞

59. 瞳孔缩小可见于

- A. 毛果芸香碱药物反应
- B. 阿托品药物反应
- C. 颈交感神经刺激
- D. 绝对期青光眼
- E. 视神经萎缩

60. Musset 征，即头部与颈动脉搏动一致的点头运动，见于

- A. 颈椎疾患
- B. 三尖瓣关闭不全
- C. 严重主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄

61. 下述哪一种特点是内脏性腹痛的特点

- A. 疼痛定位准确
- B. 可有局部腹肌强直
- C. 程度剧烈而持续
- D. 腹痛可因咳嗽、体位变化而加重
- E. 常伴恶心、呕吐、出汗等植物神经兴奋症状

62. 动力性腹泻是由于

- A. 胃肠粘膜分泌过分的液体
- B. 肠内容物渗透压增高
- C. 肠粘膜的吸收面积减少或吸收障碍
- D. 肠蠕动亢进致肠内食糜停留时间短
- E. 粘膜炎症、溃疡等病变导致血浆、粘液、脓血渗出

63. 抗人球蛋白试验阳性可见于下列哪种疾病

- B. 遗传性球形细胞增多症
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 阵发性寒冷性血红蛋白尿
- E. 异常血红蛋白综合征

64. 摸空症可见于

- A. 脑基底节变性
- B. 低钙血症和碱中毒
- C. 败血症高热期有意识障碍者
- D. 儿童的脑风湿病变
- E. 甲状腺功能亢进

65. 关于手足搐搦的叙述中，下列不正确说法是

- A. 发作时手足肌肉呈紧张性痉挛
- B. 上肢表现为腕部屈曲、手指伸展、指掌关节屈曲、拇指内收靠近掌心并与小指相对，形成“助产士手”
- C. 下肢表现为踝关节与趾关节皆呈屈曲状
- D. 可出现 Trousseau 征阳性
- E. 多见于慢性肝病、早期肝昏迷

66. 关于蜘蛛痣的描述，不正确的是

- A. 发生机制同肝掌相同
- B. 多见于急、慢性肝炎或肝硬化
- C. 多见于下腔静脉分布的区域内
- D. 是皮肤小动脉末端分支性扩张形成
- E. 一般认为与肝脏对体内雌激素的灭能减弱有关

67. 病理性中性粒细胞增多常见于以下疾病，除了

- A. 严重的组织损伤或大量血细胞破坏
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 白血病及恶性肿瘤
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 慢性肾炎尿毒症

68. 关于左房粘液瘤超声，心动图的特点，叙述中不正确的是

- A. 二尖瓣前叶曲线形似二尖瓣狭窄呈城墙样改变，但曲线纤细，回声不强，前后叶呈镜向运动
- B. 胸骨旁左室长轴切面可见一异常回声团往返于左房和二尖瓣口之间
- C. 心尖四腔切面可见一异常回声团往返于左房和二尖瓣口之间
- D. 固定性团块，无蒂
- E. 异常回声团舒张期由左房坠入二尖瓣口，收缩期又返回左房

69. 下列疾病中不出现紫绀的是

- A. 先天性高铁血红蛋白血症
- B. 硫化血红蛋白血症

- D. Fallot 四联症
- E. 右心功能不全

70. 颈静脉怒张可见于下列疾病，除了

- A. 左心功能不全
- B. 右心功能不全
- C. 缩窄性心包炎
- D. 心包积液
- E. 上腔静脉综合征

71. 门静脉高压症候群应除外

- A. 腹水
- B. 痔核形成
- C. 脾大
- D. 食管和胃底静脉曲张
- E. 肝大

72. 粒红比值正常可见于以下疾病，除了

- A. 原发性血小板减少性紫癜
- B. 巨幼细胞性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 多发性骨髓瘤
- E. 红白血病

73. 患者左侧动眼神经麻痹，右侧中枢性面神经、舌下神经瘫及上、下肢中枢性瘫痪，最可能的病灶定位是

- A. 左侧内囊
- B. 左侧桥脑
- C. 右侧丘脑
- D. 左侧中脑
- E. 右侧中脑

74. 下列哪项不是下运动神经元瘫痪的特点

- A. 无病理反射
- B. 肌张力增高
- C. 腱反射减低或消失
- D. 肌萎缩明显
- E. 瘫痪以肌群为主

75. 已被认可的重症肌无力的治疗不包括

- A. 丙戊酸钠
- B. 胸腺切除
- C. 吡啶斯的明

E. 血浆除去法

76. 下列周期性麻痹治疗措施不妥的是

- A. 口服氯化钾片
- B. 口服 10 %氯化钾溶液 3ml / 小时至好转
- C. 用 5 %甘露醇稀释静脉补钾
- D. 用盐水稀释静脉补钾
- E. 发作频繁可用乙酰唑胺

77. 下列不属于感知综合障碍的是

- A. 视物变形症
- B. 空间知觉障碍
- C. 对周围环境真实性的感知障碍
- D. 错觉
- E. 对自身躯体结构方面感知障碍

78. 下列各种思维障碍，除哪项外均多见于精神分裂症

- A. 强制性思维
- B. 象征性思维
- C. 破裂性思维
- D. 语词新作
- E. 病理性赘述

79. 下列关于痴呆，哪项说法是错误的

- A. 是大脑发育成熟，智能发育正常者由于各种因素引起大脑器质性损害
- B. 分为全面性痴呆和部分性痴呆
- C. 全面性痴呆无人格改变，无定向力障碍
- D. 动脉粥样硬化可引起部分性痴呆
- E. 假性痴呆是一种功能性疾病

80. 在精神障碍的产生原因中，促发因素是指

- A. 遗传因素
- B. 躯体因素
- C. 心理社会因素
- D. 素质因素
- E. 脑内生化因素

81. 关于精神分裂症的临床表现，下列不正确的是

- A. 原发性妄想是精神分裂症的特征性症状
- B. 精神分裂症的自知力一般都受损
- C. 可有人格解体
- D. 急性阶段以思维贫乏、情感淡漠，意志缺乏为主
- E. 妄想内容以关系妄想、被害和影响妄想最常见

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038141055073006125>