

2023-24 年湖北省江岸区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整题库（夺冠系列）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 服用左旋多巴时应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开

- A: 2~3 小时
- B: 1.5~2 小时
- C: 0.5~1 小时
- D: 1~1.5 小时

答案：A

2. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 120~160g / L
- B: 60~90g / L
- C: 30~60g / L
- D: 90~120g / L

答案：D

3. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 病毒型
- B: 胃肠型
- C: 神经型
- D: 肺炎型

答案：C

4. 属于抗过敏非处方药的是

- A: 异丙嗪
- B: 氯雷他定
- C: 依巴斯汀
- D: 息斯敏

答案：A

5. 苯巴比妥中毒较深，血药浓度达到一定水平后，需采用血液净化进行解救，一般要求

- A: 浓度超过 80mg / L 时给予血液净化
- B: 浓度超过 60mg / L 时给予血液净化
- C: 浓度超过 40mg / L 时给予血液净化
- D: 浓度超过 20mg / L 时给予血液净化

答案：A

6. 阿米洛利及复方制剂

- A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- B: 可使驾驶员出现定向力障碍
- C: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- D: 可导致驾驶员多尿或多汗

答案：D

7. 因体内肝酶不足，易发生灰婴综合征

- A: 氯霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 庆大霉素
- D: 米诺环素

答案：A

8. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 痛风
- B: 风湿性关节炎
- C: 类风湿关节炎
- D: 假性痛风

答案：A

9. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

- A: 一点法和重复一点法
- B: CTP 评分
- C: 稳态一点法
- D: PK/PD 参数法

答案：B

10. 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为()

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 红细胞增多

答案：A

11. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 早期、足量、联合给药

- B: 早期、足量、重复给药
- C: 早期、适量、联合给药
- D: 早期、足量、单次给药

答案: B

12. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

- A: 青霉素
- B: 头孢噻肟
- C: 氨苄西林
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案: A

13. 现代药物临床治疗更多依赖于循证医学的支持，在循证医学证据分级中，证据和推荐强度的级别最高的是()

- A: 同质随机对照试验的系统评价
- B: 单个大样本随机对照试验
- C: 同质病例对照试验的系统评价
- D: 大样本病案系列

答案: A

14. 可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状哺乳期妇女不宜选用的药物是()

- A: 左炔诺孕酮
- B: 依那普利
- C: 氯霉素
- D: 链霉素

答案：A

15. 适用于阿司匹林哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者预防和维护治疗的药物是

- A: 孟鲁司特钠咀嚼片
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 茶碱片

答案：A

16. 复发

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同

答案：D

17. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 $<7.8\text{mmol / L}$)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 $<5.2\text{mmol / L}$)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 $50\mu\text{mol / L}$ (正常参考范围 45~84 $\mu\text{mol / L}$)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 依折麦布
- B: 非诺贝特
- C: 普罗布考
- D: 阿托伐他汀

答案：D

18. 以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

- A: 丙咪嗪
- B: 苯巴比妥
- C: 硝西泮
- D: 奋乃静

答案：C

19. 在"应用软膏剂和乳膏剂的注意事项"中，不正确的是

- A: 涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效
- B: 不宜涂敷于口腔、眼结膜
- C: 涂敷前将皮肤清洗干净
- D: 一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位

答案：A

20. 口服氯化铵或给予维生素 C，可解救

- A: 氯丙嗪中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 氰化氢中毒
- D: 丙米嗪中毒

答案：B

21. (2016 年真题) 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是 ()。

- A: 甲状腺切除后的患者
- B: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- C: 合并轻度高血压的患者
- D: 合并高胆固醇血症的患者

答案：B

22. 处方常见的外文缩写中“生理盐水”的英文缩写是

- A: Aa
- B: OL
- C: NS
- D: OU

答案：C

23. KDIGO 推荐的 CKD 分期方法主要依据指标是

- A: 肌酐清除率 (CrCl)
- B: 尿微量白蛋白肌酐比值 (ACR)
- C: 尿微量白蛋白排泄率 (AER)
- D: 肾小球滤过率 (GFR)

答案：D

24. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐用于治疗

- A: 老年性骨质疏松症
- B: 妇女绝经后骨质疏松症
- C: 抗癫痫药所致的骨质疏松症
- D: 原发性骨质疏松症

答案：A

25. 属于一级文献的是

- A: 《中文科技资料目录：中草药》
- B: 《中国药学文摘》
- C: 《中国新药》
- D: 《国际药学文摘》

答案：C

26. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 索引的完备程度
- B: 引用参考文献的质量
- C: 检索路径及费用
- D: 出版或更新的频率

答案：B

27. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

- A: 20~30min
- B: 10~20min
- C: 15~30min
- D: 5~10min

答案：C

28. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

- A: 餐中服用
- B: 清晨服用

C: 餐前服用

D: 餐后服用

答案: D

29. 维生素 B₂ 的特定吸收部位在小肠上部，故其最适宜服用的时间是

A: 餐前

B: 餐中

C: 餐后

D: 清晨

答案: C

30. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A: 麻醉药品

B: 利尿剂

C: 蛋白同化激素

D: 肽类激素

答案: D

31. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

A: A 级

B: X 级

C: D 级

D: C 级

答案: C

32. 弥漫性青铜色色素沉着

A: 氟尿嘧啶

B: 柔红霉素

C: 白消安

D: 博来霉素

答案：C

33. 非甾体抗炎药的不良反应,偶可致无菌性脑膜炎

A: 美洛昔康

B: 布洛芬

C: 塞来昔布

D: 保泰松

答案：B

34. 伪膜性肠炎

A: 真菌

B: 红细胞

C: 白细胞增多

D: 上皮细胞

答案：D

35. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是

A: 吡嗪酰胺

B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 链霉素

答案：B

36. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 急性心肌炎
- B: 支气管哮喘
- C: 大叶性肺炎
- D: 急性左心衰竭

答案：D

37. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 1.03~2.07mmol / L
- B: 0.56~1.70mmol / L
- C: 3.1~5.7mmol / L
- D: 2.1~3.1mmol / L

答案：A

38. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

- A: 左旋多巴
- B: 卡马西平
- C: 氟西汀
- D: 多奈哌齐

答案：A

39. 增加肾毒性和耳毒性的配伍用药是

- A: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 肝素钠联用阿司匹林

C: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸

D: 普萘洛尔联用硝酸酯类

答案: C

40. 通过抑制磷酸二酯酶，升高 cAMP 水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

A: 地高辛

B: 洋地黄毒苷

C: 米力农

D: 卡维地洛

答案: C

41. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

A: ACEI

B: AR

C: β 受体拮抗剂

D: 利尿药

答案: A

42. 应用雷托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要机制是

A: 患者伴血容量较低

B: 防止形成尿道结石或肾结石

C: 加快排泄，减小肾毒性

D: 减小用药部位刺激性

答案: B

43. 血脂调节药的合理应用有效降低 LDL-C 和 TG 水平，升高 HDL-C 水平的是 ()

- A: 普罗布考
- B: 伊曲康唑
- C: 他汀类与贝特类联用
- D: 依折麦布

答案：C

44. “-沙星”的药名词干缩写是

- A: #NAME?
- B: eef-
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

45. 有糖尿病的高血压患者服用降压药，建议控制在

- A: <130 / 80mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <140 / 90mmHg
- D: <140 / 80mmHg

答案：A

46. 可中和碘类物质中毒的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 淀粉溶液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案：C

47. 饮茶可减少其吸收的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿莫西林
- C: 硫酸亚铁
- D: 去氨加压素

答案：C

48. 下列情况的首选药物是，高 TC 血症

- A: 贝丁酸类
- B: 弹性酶
- C: 胆酸螯合剂+贝特类
- D: 他汀类

答案：D

49. 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

- A: 美罗培南
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 头孢哌酮

答案：B

50. 儿童病情危重抢救时，多采用

- A: 口服给药
- B: 局部给药
- C: 皮下注射
- D: 静脉给药

答案：D

51. 焦虑症最常见的表现形式为（）

- A: 广泛性焦虑
- B: 社交焦虑障碍
- C: 急性焦虑
- D: 惊恐发作

答案：A

52. 阿昔洛韦的适应证是

- A: 足癣
- B: 流感
- C: 带状疱疹
- D: 乙型病毒性肝炎

答案：C

53. 患者，女，76 岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，

- A: 多奈哌齐
- B: 卡巴拉汀
- C: 加兰他敏
- D: 美金刚

答案：C

54. 对中枢神经有抑制作用的是

- A: 酒
- B: 食醋
- C: 食盐
- D: 脂肪

答案：A

55. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 塞来昔布
- B: 钆贝葡胺
- C: 培高利特
- D: 替加色罗

答案：C

56. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 呋喃唑酮
- B: 依替米星
- C: 克林霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

57. 黏膜保护剂

- A: 埃索美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：D

58. 张先生，30 岁，来药店咨询湿疹治疗药物。经询问后得知：他有多年的湿疹病史，经常购买氢化可的松软膏治疗湿疹。这次湿疹加重，足踝、小腿部、双手都有皮损分布，手部皮肤破裂并有渗出。药师应给予的正确建议是

- A: 建议使用炉甘石洗剂
- B: 建议改用强效外用糖皮质激素哈西奈德
- C: 建议患者就医
- D: 建议口服氢化泼尼松

答案：C

59. 目前推荐治疗失眠的一线药物为（）

- A: 艾司唑仑
- B: 硝西泮
- C: 多塞平
- D: 佐匹克隆

答案：D

60. 非杓型高血压患者的合理给药时间是

- A: 早、晚给药
- B: 一日三餐后给药
- C: 睡前给药
- D: 清晨给药

答案：C

61. 以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦

C: 氨溴索

D: 可待因

答案: A

62. 属于 β 受体激动剂的是

A: 美托洛尔

B: 福莫特罗

C: 异丙托溴铵

D: 乙酰胆碱

答案: B

63. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol/L，餐后血糖 16.5mmol/L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g/120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

A: 罗格列酮给药剂量不合理

B: 消渴丸给药频次不合理

C: 二甲双胍给药频次不合理

D: 磺胺类药过敏史患者不宜服用消渴丸

答案: D

64. 告知“新上市药品的品牌名、商品名以及药动学与药效学信息”属于

A: 新药信息

B: 禁忌证

C: 药物相互作用

D: 药品不良反应

答案：A

65. 适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

- A: 塞来昔布
- B: 硫酸氨基葡萄糖
- C: 阿托品
- D: 可待因

答案：A

66. 患者，男 50 岁，血压 170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是：

- A: β 受体阻滞剂+ARB
- B: A 受体阻滞剂+ACEI
- C: 利尿剂+AR
- D: 利尿剂+CCB

答案：D

67. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

- A: B 级
- B: C 级
- C: A 级
- D: X 级

答案：A

68. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 滴丸剂
- B: 透皮贴剂
- C: 泡腾片剂

D: 膜剂

答案: C

69. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

A: 肝功能异常

B: 腹胀

C: 高血压

D: 高血脂

答案: A

70. 用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

A: 氢氧化铝制剂

B: 水杨酸钠

C: 硫酸钡

D: 利福平

答案: D

71. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

A: 2

B: 0.8~1.5

C: <0.8

D: >1.5

答案：B

72. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 心律失常
- B: 低血糖
- C: 腹胀
- D: ALT 升高

答案：C

73. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

- A: 亚硝酸盐中毒
- B: 麦角胺中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 异烟肼中毒

答案：C

74. 阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

- A: 竞争性拮抗作用
- B: 促进机体的利用
- C: 延缓或降低抗药性
- D: 作用于不同的靶点

答案：D

75. 苯二氮（卓）类药物中毒的特异性治疗药物为

- A: 去甲肾上腺素
- B: 醒脑静
- C: 氟马西尼
- D: 纳洛酮

答案：C

76. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于（）分级。

- A: D 级
- B: A 级
- C: B 级
- D: C 级

答案：C

77. （2018 年真题）患者，女，30 岁，妊娠 7 个月，既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧，发痒、分泌物多，有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状，疗效较好，今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是（）

- A: 利巴韦林滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 磺胺醋酰钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案：B

78. 患者，女 67 岁出现认知功能障碍 5 年，诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是（）

- A: 碳酸氢钠
- B: 氯化铵
- C: CYP2D6 抑制剂
- D: CYP3A4 制剂

答案：A

79. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法使用疗程为（）

- A: 10 日或 14 日
- B: 4~6 周
- C: 6~8 周
- D: 8~12 周

答案：A

80. 首要标准是

- A: 药物治疗的方便性
- B: 药物治疗的有效性
- C: 药物治疗的安全性
- D: 药物治疗的规范性

答案：B

81. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片依那普利的主要不良反应是

- A: 出血
- B: 横纹肌溶解症
- C: 高钾血症
- D: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

答案：C

82. 服药期间宜多喝水的药物

- A: 苯妥英钠
- B: 琥珀酸亚铁
- C: 左旋多巴
- D: 苯溴马隆

答案：D

83. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内 cAMP 含量，缓解慢性心衰症状的是

- A: 地高辛
- B: 氨力农
- C: 多巴酚丁胺
- D: 硝普钠

答案：B

84. 患者，女，19 岁，面部出现多个丘疹和脓疱有脱皮表现，临床诊断为痤疮。外用制剂改善不佳，换用异维 A 酸片。使用异维 A 酸片的用药注意事项和用药指导，不包括()

- A: 监测精神症状
- B: 每 1—3 个月监测血尿酸水平
- C: 治疗期间或治疗后 1 个月内避免献血
- D: 用药前排除妊娠

答案：B

85. 治疗胆囊炎的药物需选用

- A: M 受体激动剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: H₂ 受体阻断剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/045110324131012033>