

2024 年广西壮族自治区那坡县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版【达标题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 治疗心力衰竭时，可抑制心肌重构和心肌纤维化的治疗药物不包括

- A: 血管紧张素转换酶抑制剂
- B: 血管紧张素 II 受体阻断剂
- C: 醛固酮受体阻断剂
- D: 强心苷类药物

答案：D

2. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

- A: 餐中服用
- B: 清晨服用
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用

答案：D

3. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 痛风急性发作
- B: 血压升高
- C: 出现尿蛋白
- D: 嗜睡

答案：A

4. 属于药物信息服务最重要的咨询服务方法步骤是

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对问题进行确定并归类
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对文献进行评价、分析和整理

答案：D

5. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻的是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 索利那新
- D: 度他雄胺

答案：A

6. 下列药物中适宜在睡前服用的是（）

- A: 多潘立酮

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 辛伐他汀

C: 泼尼松

D: 美洛昔康

答案：B

7. (2016 年真题) 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是 ()。

- A: 肌肉注射维生素 B1，维生素 B6 和烟酸各 100mg
- B: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U
- C: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg
- D: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

答案：C

8. 布噻嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 抗组胺药
- C: 镇痛药
- D: 利尿剂

答案：D

9. (2016 年真题) 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是 ()。

- A: 双侧肾动脉狭窄
- B: 心力衰竭
- C: 冠心病
- D: 痛风

答案：B

10. 避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

- A: 氯吡格雷
- B: 阿托伐他汀钙
- C: 胺碘酮

D: 链激酶

答案：C

11. 下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

A: 忽略药品说明书提示用药

B: 病因未明用药

C: 感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素

D: 应用两种或两种以上一药多名的药物

答案：C

12. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，X 线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

A: 肺结核属于传染病，患者咳嗽、打喷嚏和高声讲话时不能直向旁人

B: 由于增加不良反应，不提倡联合用药

C: 应全程督导服药，提高用药的依从性

D: 定期随诊，监测血常规和肝肾功能

答案：B

13. (2015 年真题) 阿卡波糖片的适宜服药时间是 ()。

A: 餐后

B: 餐前

C: 餐中

D: 清晨

答案：C

14. (2017 年真题) 伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是 ()

- A: 替硝唑含漱液
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 氯己定含漱液
- D: 西地碘含片

答案：D

15. 阿司匹林

- A: 嗜酸性粒细胞减少
- B: 血红蛋白量增多
- C: 血小板减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：C

16. 患者，女，53 岁，冠心病史 2 年，目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊，临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mgqdpo 文拉法辛缓释片 150mgadpo，谷维素片 10mg tidpo 治疗，患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是()

- A: 奥美拉唑肠溶片
- B: 阿托伐他汀钙片
- C: 文拉法辛缓释片
- D: 硝酸异山梨酯片

答案：C

17. 具体写明稀释比例和使用时间，是倡导开处方环节的

- A: 实现个体化治疗
- B: 医嘱完整不漏项
- C: 修订医嘱及时沟通

D: 医嘱清楚准确

答案: B

18. (2016 年真题) 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd，患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

A: BUN

B: Hb

C: ALT

D: RBC

答案: C

19. 患者，女，61 岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

A: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱

B: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

C: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

D: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

答案: B

20. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

A: 稳态一点法

B: 一点法和重复一点法

C: PK/PD 参数法

D: CTP 评分

答案: D

21. 药品质量缺陷，包括

A: 药品名称音似

- B: 片剂药品受潮裂片
- C: 须冷藏药品
- D: 药品名称形似

答案：B

22. 下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是()

- A: 银杏叶片
- B: 叶酸
- C: 阿司匹林
- D: 口服避孕药

答案：D

23. 治疗胃食管反流病,莫沙必利的正确服药时间是

- A: 餐后、睡前
- B: 三餐前 30min
- C: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- D: 早餐前 30min

答案：B

24. 下列病原体中,可导致沙眼的是

- A: 沙眼衣原体
- B: 豚解支原体
- C: 变形杆菌
- D: 大肠埃希菌

答案：A

25. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),反复性偏头痛者

- A: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啉、舒马曲坦、佐米曲坦
- B: 推荐应用地西泮(安定)片
- C: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等
- D: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

答案：A

26. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 快速静脉注射
- B: 口服每次 5ml，一日 3 次
- C: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后，再继续静脉滴注余下剂量
- D: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

答案：C

27. 治疗疼痛“1 日 1 次，每次 75mg：最大剂量为 150mg，分两次服用”的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 双氯芬酸钠缓释片
- C: 罗通定
- D: 氨酚待因片

答案：B

28. 患者，女，62 岁，医师处方如下：

- A: 二甲双胍
- B: 氨氯地平
- C: 氯吡格雷

D: 阿卡波糖

答案：B

29. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“A”是指

A: 阿司匹林和 ACEI

B: β 受体阻断剂和血压控制

C: 健康教育和运动

D: 控制饮食和糖尿病

答案：A

30. 以下药物中毒事例中不宜用硫酸镁导泻的是

A: 抗结核药中毒

B: 降糖药中毒

C: 解热镇痛药中毒

D: 镇静药中毒

答案：D

31. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

A: 慢性肾衰竭

B: 粒细胞减少症

C: 溶血性贫血

D: 消化性溃疡

答案：B

32. 餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高的 2 型糖尿病患者首选

A: 二甲双胍

B: 格列喹酮

C: 阿卡波糖

D: 比格列酮

答案: D

33. 属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 伐尼克兰

B: 安非他酮

C: 尼古丁替代药物

D: 可乐定

答案: A

34. 不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

A: 餐前

B: 两餐间

C: 餐后

D: 睡前

答案: C

35. 怕热的药品

A: 可贮存于严密的药箱内

B: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

C: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

D: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

答案: C

36. 高血压合并心力衰竭者慎用下列哪种药物

- A: 哌唑嗪
- B: 氢氯噻嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案：C

37. 脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

- A: 阿司匹林
- B: 普通肝素
- C: 阿替普酶
- D: 甘露醇

答案：B

38. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 奥利司他
- B: 替米沙坦
- C: 别嘌醇
- D: 二甲双胍

答案：D

39. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

- A: 阻塞性肺气肿
- B: 支气管哮喘
- C: 慢性支气管炎
- D: 慢性支气管炎合并肺气肿

答案：B

40. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是()

A: C 级

B: D 级

C: X 级

D: A 级

答案：D

41. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

A: 体位性低血压

B: 不宁腿综合征

C: 神经精神障碍

D: 姿势反射障碍

答案：D

42. 发热在应用解热镇痛药时,老年人的用药时间间隔是

A: 3~5 小时

B: 3~6 小时

C: 4~6 小时

D: 2~5 小时

答案：C

43. 苯二氮(𠂇)卓)类药物中毒的特异性治疗药物为

A: 纳洛酮

B: 醒脑静

C: 去甲肾上腺素

D: 氟马西尼

答案: D

44. (抗癫痫药物的选择) 癫痫全身强直阵挛性发作的一线用药是 ()

A: 加巴喷丁

B: 乙琥胺

C: 扑米酮

D: 卡马西平

答案: D

45. 切忌直接静脉注射，应于临用前稀释，否则不仅会引起剧痛，且可致心脏停搏的药物是

A: 青霉素

B: 两性霉素 B

C: 头孢曲松钠

D: 氯化钾

答案: D

46. 以下药物中，可用于蛇咬伤中毒解救的是

A: 胰蛋白酶?

B: 门冬酰胺酶?

C: 胃蛋白酶?

D: 凝血酶?

答案: A

47. 容易缩短凝血酶原时间的药物是

A: 华法林

B: 普通肝素

C: 利伐沙班

D: 口服避孕药

答案: D

48. PDR 是由美国医学经济公司和 ThomsonHealthcare 公司编辑出版的药品集，每年综合汇编 1 册，主要介绍

A: 美国临床常用的药品

B: 美国市场上的药品

C: 美国市场上的常用处方药

D: 各国市场上的常用处方药

答案: C

49. 非甾体抗炎药的典型不良反应是

A: 胃肠道刺激出血

B: 肝毒性

C: 血液系统毒性

D: 肾毒性

答案: A

50. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

A: 乳酸性酸中毒

B: 肌痛

C: 心力衰竭

D: 低血糖

答案: A

51. 可单独用于轻度、早期高血压的是

- A: 呋塞米
- B: 甘露醇
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿米洛利

答案：C

52. 氨氯地平片的适宜服用时间是

- A: 餐前
- B: 餐中
- C: 餐后
- D: 早晨

答案：D

53. 哺乳期妇女使用，可致男婴乳房增大的药物是（）

- A: 复方炔诺酮
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 依那普利
- D: 胰岛素

答案：A

54. 下尿路感染的最突出表现是（）

- A: 膀胱刺激征
- B: 伴明显腰痛
- C: 发热
- D: 肾区叩击痛

答案：A

55. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 厄贝沙坦
- B: 卡托普利
- C: 比索洛尔
- D: 氨氯地平

答案：A

56. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

- A: 3~5 小时
- B: 2~4 小时
- C: 5~7 小时
- D: 4~6 小时

答案：D

57. （2015 年真题）患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 的药物是（）。

- A: 布洛芬
- B: 塞来昔布
- C: 双氯芬酸
- D: 吲哚美辛

答案：B

58. 亚硝酸盐中毒解救药物

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮

C: 氯磷定

D: 亚甲蓝

答案: D

59. 一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化，归属于

A: 日光

B: 湿度

C: 空气

D: 温度

答案: C

60. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

A: 硫酸镁

B: 卡托普利

C: 甲氧多巴

D: 缬沙坦

答案: A

61. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

A: 男 > 95cm，女性 > 85cm

B: 男性 > 90cm，女性 > 80cm

C: 男性 > 90cm，女性 > 85cm

D: 男性 > 85cm，女性 > 80cm

答案: A

62. (2018 年真题) 患者，男，80 岁，患有高血压、2 型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是 ()

- A: 依那普利
- B: 珍菊降压片 (含氢氯噻嗪)
- C: 非那雄胺
- D: 二甲双胍

答案: B

63. 对半衰期短的药物，为了减少血药浓度波动可采取的方法是 ()

- A: 增加给药剂量
- B: 缩短给药间隔的同时减少单剂量
- C: 延长给药间隔
- D: 减少给药剂量

答案: B

64. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

- A: β 受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI
- B: ACEI、AR
- C: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI
- D: 硝普钠、利尿药、ACEI

答案: A

65. 降钙素属于

- A: 促进骨矿化剂
- B: 激素替代剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 骨吸收抑制剂

答案：D

66. 苯二氮类药物过量或者中毒，特异性解救药物是

- A: 氟奋乃静
- B: 氟马西尼
- C: 新斯的明
- D: 碘解磷定

答案：B

67. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标，该患者最可能患有：

- A: 肾脏疾病
- B: 血液疾病
- C: 肝脏疾病
- D: 心脏疾病

答案：A

68. 处方的法律性是指

- A: 处方由前记、正文与后记三部分组成
- B: 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件
- C: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别担负有相应的责任
- D: 处方是药品消耗及药品经济收入结账、患者用药报销的凭证和原始依据

答案：C

69. 患者，女，54 岁，诊断为类风湿关节炎 2 年。目前服用甲氨蝶呤 (15mg, qw) 和塞来昔布 (200mg, qd)。患者因担心药物不良反应，用药不规律，时断时续。近几日出现腕关节肿胀和疼痛加重，晨僵明显，加用泼尼松 10mg, qd。

- A: 早期治疗. 遵医嘱规律用药
- B: 定期就诊，评估病情，调整治疗方案
- C: 预防骨质疏松
- D: 多晒太阳. 适量补充钙剂、维生

答案：B

70. 阿尔兹海默病患者应该避免使用的药物是 ()

- A: 颠茄
- B: 美金刚
- C: 卡巴拉汀
- D: 多奈哌齐

答案：A

71. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

- A: 阿司匹林
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

72. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

C: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

D: 剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：B

73. 以下叙述中，处方审核结果可判定为“超常处方”的是

A: 使用“遵医嘱”字句

B: 字迹难以辨认

C: 联合用药不适宜

D: 无正当理由超说明书用药

答案：D

74. 可引起血肌酐增高的是

A: 肾衰竭

B: 胃溃疡

C: 急性胰腺炎

D: 严重肝病

答案：A

75. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

A: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症

B: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙

C: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化

D: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用

答案：B

76. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 临床诊断书
- B: 病区领药单
- C: 药品出库单
- D: 病区用药医嘱单

答案：D

77. 中成药舒筋活络酒具有祛风除湿、活血通络、养阴生津的功效，与其合用可加强对中枢神经系统抑制作用的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 地高辛
- C: 氯苯那敏
- D: 复方利血平

答案：C

78. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

- A: 盲目联合用药
- B: 超适应症给药
- C: 撒网式给药
- D: 有禁忌症用药

答案：B

79. 一般情况下，每张处方中开具的西药和中成药的总数目最多为

- A: 2 种
- B: 3 种

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 4 种

D: 5 种

答案：D

80. 膀胱炎占尿路感染的 60%以上，致病菌多为

- A: 金黄色葡萄球菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 白假丝酵母菌
- D: 淋病奈瑟菌

答案：B

81. 淋巴细胞正常参考区间是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.01~0.05
- C: 0~0.01
- D: 0.20~0.40

答案：D

82. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是（）

- A: 环境污染
- B: 长期吸入汞蒸气
- C: 被投毒
- D: 饮食

答案：B

83. 关于烫伤患者的用药指导和患者教育，错误的是

- A: 烫伤后迅速用冷水或冰水湿敷患处
- B: 切忌用塑料布密封患处
- C: 有脑外伤的患者可使用地西泮镇静
- D: 可使用红汞或甲紫药水涂抹患处

答案：D

84. 某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

- A: 头孢噻肟
- B: 阿奇霉素
- C: 林可霉素
- D: 左氧氟沙星

答案：A

85. 异烟肼+链霉素+对氨基水杨酸钠治疗结核病属于

- A: 减少药物不良反应
- B: 提高药物疗效
- C: 延缓细菌耐药性的产生
- D: 治疗多种疾病

答案：C

86. 临床急需 70%乙醇 400ml，问需取 95%乙醇的体积是

- A: 280ml
- B: 290ml
- C: 285ml
- D: 295ml

答案：D

87. 药物治疗结核病的标准方案中，间歇疗法的含义是

- A: 一周用药 2~3 次

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 一周用药 1 次

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/045220130122012033>