北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科题库考点》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男性，24 岁，右示指中、末节掌侧切削伤 6 小时，局部软组织缺损 1cm×2cm，肌腱外露，急诊清创后应采用（　）。A. 直接缝合皮肤

B. 凡士林纱布覆盖包扎

C. 中厚游离皮片移植

D. 邻指带蒂皮瓣

E. 腹股沟轴型皮瓣

2、单项选择题：下述姿势性扁平足的临床表现中哪项是错误的（　）。A. 行走过多，站立过久时足痛

B. 前足横弓塌陷，稍外翻

C. 站立时重力线落于足跟之外侧

D. 足印的腰部增宽

E. 足底部软组织压痛

3、单项选择题：慢性骨髓炎行死骨摘除术的最佳时机是（　）。A. 死骨形成

B. 窦道长期不愈

C. 死骨形成清楚，包壳充分形成

D. 炎症急性发作时

E. 病理骨折已愈合

4、单项选择题：对疑为恶性的骨肿瘤采用切开活检术时，应注意的是（　）。A. 对于肢体肿瘤的活检应采用横行切口

B. 加压包扎伤口，不必仔细止血

C. 为更好地显露肿瘤，手术不必局限于一个间室

D. 确定手术方案时，必须考虑到最终手术时能够将活检部位的组织切除

E. 活检手术为小手术，可由低年资医师完成

5、单项选择题：手法复位牵拉肘的正确方式是（　）。A. 屈肘旋前

B. 伸肘旋前

C. 屈肘旋后

D. 伸肘旋后

E. 以上都不是

6、单项选择题：下面哪项不是股骨颈骨折的典型畸形表现（　）。A. 大转子上移征

B. 伤侧足呈 45～60 外旋畸形

C. 患肢缩短

D.伤侧足呈90外旋畸形

E.股骨大转子顶端在Nelaton线之上

7、单项选择题：第7、8胸椎结核病灶清除术后，恢复工作已一年，近3个月来又出现背痛、乏力、盗汗、低热和双下肢无力症状，查体第7、8胸椎局部有明显叩击痛，双下肢肌力三级，巴彬斯基征（+），血沉增快，最适当的治疗措施是（　）。A.非手术治疗，卧石膏床

B.以非手术治疗为主，必要肘行病灶清除术

C.在抗结核药物保护下尽早行病灶清除术

D.急症病灶清除术

E.后路植骨融合术

8、单项选择题：有关跖腱膜炎患者，下列哪项是错误的（　）。A.常发生在中老年

B.常合并有跟骨骨刺

C.可用跟垫治疗

D.骨刺切除最恰当

E.局封常有效

9、单项选择题：创伤最常见的并发症为（　）。A.休克（低血容量性）

B.急性肾功能衰竭

C.成人呼吸窘迫综合征

D.化脓性感染

E.破伤风

10、单项选择题：骨折不愈合的因素中哪项是错误的（　）。A.年龄过小，过度肥胖

B.骨折部软组织损伤严重

C.骨折部血运差

D.骨折处理超过24小时

E.骨折端间有软组织

11、单项选择题：陶瓷被用作人工股骨头材料是因为（　）。A.价格低

B.耐蚀性好

C.耐磨性好

D.生物相容性好

E.耐疲劳性好

12、单项选择题：一侧坐骨神经在梨状肌下孔处受损，将出现（　）。A.同侧髋关节不能伸

B.同侧膝关节不能伸

C.同侧下肢皮肤感觉完全丧失

D.足不能活动

E.以上均不正确

13、单项选择题：男性青年，外伤导致胫腓骨上1/3处开放性粉碎性骨折。行彻底清创，术中摘除游离骨块后伤肢行长期牵引及固定，但6个月骨折仍然不愈合，最大可能的原因是（　）。A.骨折处血液循环差

B.伤肢固定不确实

C.彻底清创时摘除过多碎骨块

D.功能锻炼不够

E.未及时行切开复位及内固定

14、单项选择题：测量两下肢真实长度时，一般误差不应超过（　）。A.0.1cm

B.0.2cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046110034021010123