

2023-24 年山东省高密市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

- A: 四环素
- B: 呋喃唑酮
- C: 左氧氟沙星
- D: 阿莫西林

答案：C

2. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 清晨服用
- B: 餐中服用
- C: 餐后服用
- D: 餐前服用

答案：D

3. （2017 年真题）治疗肠道蛔虫病可选用（）

- A: 阿苯达唑
- B: 双八面体蒙脱石散
- C: 聚乙醇 4000
- D: 莫沙必利

答案：A

4. 口服或静脉滴注 β 受体拮抗剂用于解救

- A: 异烟肼中毒
- B: 亚硝酸盐中毒
- C: 克仑特罗中毒
- D: 麦角胺中毒

答案：C

5. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，是归属于

- A: 药学信息服务工作
- B: 处方审核工作
- C: 处方点评工作
- D: 参与健康教育工作

答案：C

6. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证；其 ADR 因果关系可评价为

- A: 可能
- B: 很可能
- C: 可能无关
- D: 待评价

答案：D

7. (2016 年真题) 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是 ()。

- A: 吡嗪酰胺

- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案: B

8. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 无适应证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 无正当理由开具高价药
- D: 单张门诊处方超过 5 种药品

答案: B

9. 患者,男,80 岁,临床诊断为前列腺增生,给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是()

- A: 睡前服用,定期监测肝功能
- B: 每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应
- C: 睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压
- D: 睡前服用,注意监测肾功能

答案: C

10. (2019 年真题) 患者,女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃,中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性胃炎
- B: 急性胆囊炎

C: 急性胰腺炎

D: 急性阑尾炎

答案：C

11. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价患者，男，45 岁，因慢性乙型肝炎给予干扰素，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状逐渐好转，再次应用干扰素，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是

A: 很可能

B: 可能无关

C: 可能

D: 肯定

答案：D

12. 可改善体液局部循环，促进药物对病灶的渗透和扩散的蛋白水解酶是

A: 阿司匹林

B: 伪麻黄碱

C: 菠萝蛋白酶

D: 颠茄浸膏片

答案：C

13. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

A: 药品的生产厂商和批号

B: 药物制剂的等效性

C: 药品经济学知识

D: 注射剂的配制和滴注速度等

答案：D

14. 《2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，65 岁及以上老年人推荐维生素 D 摄入量为

- A: 400IU (10 μ g) / d
- B: 8001200IU (20~30 μ g) / d
- C: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d
- D: 600IU (15 μ g) / d

答案：D

15. (抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

- A: 多毛症
- B: 直立性低血压
- C: 免疫失调
- D: 房室传导阻滞

答案：B

16. 5-HT

- A: 丁螺环酮
- B: 艾司唑仑
- C: 阿米替林
- D: 舍曲林

答案：A

17. 解救中毒的肾衰竭者 ()

- A: 不能用强利尿剂
- B: 不能催吐
- C: 不能导泻

D: 禁止洗胃

答案：A

18. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A: 胰酶片

B: 多潘立酮

C: 复合消化酶胶囊

D: 莫沙必利

答案：D

19. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

A: 二甲双胍

B: 氨氯地平

C: 阿卡波糖

D: 氯吡格雷

答案：B

20. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收

B: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

C: 当体温正常 48~72h, 且达到肺炎临床稳定标准后, 可停用抗菌药物

D: 在病原学送检后, 可立即实施经验性抗菌治疗

答案: A

21. 可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A: 抗组胺药

B: 苯妥英钠

C: 维生素 A

D: 氯霉素

答案: C

22. 服药期间不宜喝茶的药物

A: 苯妥英钠

B: 左旋多巴

C: 琥珀酸亚铁

D: 苯溴马隆

答案: C

23. (2015 年真题) 患儿, 女, 4 岁半, 身高 110cm, 体重 15kg, 一天前开始发热 (39.1℃), 咽稍痛, 无咳嗽, 无吐泻, 家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻, 约 2~3h 一次大便, 量少, 黄色粘液便, 呕吐 1 次。体格检查, T38.8℃, P118 次/分, R28 次/分, 咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清, 腹平软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃。实验室检查: WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$), 粪便镜检可见红、白细胞。

A: 消化不良性腹泻

B: 动力性腹泻

C: 分泌性腹泻

D: 感染性腹泻

答案: D

24. 苯溴马隆为促进尿酸排泄的药物，在痛风急性期不宜服用，以防止发生转移性痛风。在治疗期间，不能与下列药物同时使用的是

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 碳酸氢钠

D: 阿司匹林

答案: D

25. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

A: 平喘药

B: 抗抑郁药

C: 调节血脂药

D: 抗过敏药

答案: B

26. 日服 180mg 元素铁是依据铁剂吸收率为

A: 0.3

B: 0.4

C: 10%~30%

D: 10%~20%

答案: A

27. 可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 雌激素、孕激素、雄激素
- C: 叶酸拮抗剂
- D: 苯巴比妥

答案：C

28. 心衰导致药物经肾排泄减少

- A: 肾小球滤过减少
- B: 肾血流量减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾小管分泌减少

答案：B

29. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A: 菠萝蛋白酶
- B: 阿司匹林
- C: 颠茄浸膏片
- D: 伪麻黄碱

答案：D

30. 维持心脏、神经及消化系统正常功能所必需，缺乏可出现脚气病的是

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 A
- C: 维生素 D

D: 维生素 C

答案：A

31. 有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

- A: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见
- B: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果
- C: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据
- D: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等

答案：A

32. 患者静脉滴注两性霉素 850mg，临床药师建议两性霉素 B 应该调节至适当的滴注速度。

- A: 护士
- B: 患者家属
- C: 患者
- D: 医生

答案：A

33. （2015 年真题）患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

- A: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- B: 福莫特罗吸入剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：A

34. (2019 年真题) 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U/支的青霉素钠产品，每支所需的装量是

- A: 2.088mg
- B: 1.33g
- C: 0.48g
- D: 1.33mg

答案：C

35. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 依替米星
- B: 呋喃唑酮
- C: 庆大霉素
- D: 克林霉素

答案：B

36. 服用异烟肼抗结核治疗时，应注意的事项是

- A: 服药期间不宜饮酒
- B: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物
- C: 服药期间不宜饮茶
- D: 用药期间宜吃高蛋白食物

答案：B

37. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，实施右侧髋关节置换术，术后第 10 日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是

- A: 依诺肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 血凝酶

答案：A

38. 痛经伴有精神紧张者可口服

- A: 阿司匹林
- B: 布洛芬
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 谷维素

答案：D

39. 在一定范围内，其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ()

- A: LDL-C
- B: HDL-C
- C: TG
- D: HbA1c

答案：B

40. 伴发 OAB 的前列腺增生症治疗药物索利那新的不良反应是

- A: 加重闭角型青光眼
- B: 体位性低血压
- C: 心动过缓

D: 性功能障碍

答案：A

41. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

A: 食盐

B: 脂肪

C: 食醋

D: 酒

答案：C

42. 对缺铁性贫血者应选用

A: 维生素 K

B: 富马酸亚铁

C: 叶酸+维生素 B

D: 甲磺酸去铁胺

答案：B

43. 葡萄柚汁+非洛地平

A: 抑制乙醛脱氢酶

B: 造成听神经和肾功能不可逆性损害

C: 产生有利的药物相互作用

D: 抑制氧化代谢反应

答案：D

44. 服用抗利尿药时

A: 禁吸烟

B: 忌用热水送服

C: 宜多饮水

D: 宜少饮水

答案：D

45. 属于过敏介质阻释剂的是

A: 氨茶碱

B: 多索茶碱

C: 曲尼司特

D: 孟鲁司特

答案：C

46. 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数(BMI)是()

A: 27.8

B: 18

C: 20

D: 30.2

答案：A

47. 高血压、动脉硬化患者突然发生剧烈头痛，提示可能是

A: 脑血管意外

B: 动脉瘤

C: 脑膜炎

D: 脑肿瘤

答案：A

48. 慢性沙眼患者禁用的药品是

A: 利福平滴眼剂

B: 醋酸可的松滴眼剂

C: 硫酸锌滴眼剂

D: 酞丁安滴眼剂

答案：B

49. 治疗轻症、慢性疾病用药持久，最适宜选用的给药途径是

A: 舌下含服

B: 吸入给药

C: 口服给药

D: 直肠给药

答案：C

50. 药品不良反应的诱因主要是药物因素与患者因素。预防不良反应须采取多项措施

A: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

B: 了解患者及其家族的过敏史

C: 注意定期监测器官功能

D: 注意特殊人群用药

答案：B

51. 有关药学服务的“基本要素”，以下说法最正确的是

A: “与药物有关”的服务

B: 提供药物信息和知识

C: 提供药学专业知

D: 为公众服务

答案：A

52. 以下药物中，不属于 WHO 划定的一线抗结核药物的是()

A: 链霉素(S)

B: 吡嗪酰胺 (Z)

C: 异烟肼 (H)

D: 利福平 (R)

答案: A

53. 下列药物中，适宜在餐前服用的是

A: 双氯芬酸钠片

B: 莫沙必利片

C: 西咪替丁片

D: 伊马替尼片

答案: B

54. (2017 年真题) 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是 ()

A: 大于 60 岁

B: 绝经后 5 年之内

C: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

D: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁

答案: C

55. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

A: 苯海索

B: 恩托卡朋

C: 左旋多巴

D: 司来吉兰

答案: B

56. 药师发药时提示患者“用药期间禁止饮酒或含酒精饮料”，针对的药物是

- A: 卡托普利
- B: 铋制剂
- C: 氯苯那敏
- D: 氟西汀

答案：D

57. 可确诊为甲状腺功能减退症的医学检查指标是

- A: TSH 降低，TT4、FT4 升高
- B: 三酰甘油、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇增高，高密度脂蛋白胆固醇降低
- C: TSH 升高、TT4、FT4 降低
- D: TSH、TT4、FT4 升高

答案：C

58. (2015 年真题) 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是 ()。

- A: 吡嗪酰胺
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：D

59. 属于褪黑素受体激动剂的是

- A: 阿戈美拉汀
- B: 艾司唑仑
- C: 米氮平
- D: 唑吡坦

答案：A

60. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

- A: 超适应证用药
- B: 无适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 过度治疗用药

答案：D

61. (2019 年真题) 患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 格列齐特
- D: 吡格列酮

答案：D

62. 以下抗流感的处方药是

- A: 含阿司匹林的复方制剂
- B: 对乙酰氨基酚片剂
- C: 含伪麻黄碱的复方制剂
- D: 奥司他韦片剂(达菲)

答案：D

63. 下列药物中适宜在睡前服用的是()

- A: 美洛昔康
- B: 多潘立酮
- C: 辛伐他汀
- D: 泼尼松

答案：C

64. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

A: 内容广泛、使用方便

B: 提供的信息丰富、详实

C: 内容全面、细致

D: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

答案：A

65. 属于 5α 还原酶抑制剂的是

A: 黄酮哌酯

B: 氟他胺

C: 依立雄胺

D: 雌三醇

答案：C

66. (2018 年真题) 患者, 女, 67 岁, 有高血压病史, 右手抖动行走缓慢 4 年, 诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗, 症状一度好转后又反复加重, 随后采用加大复方左旋多巴剂量, 并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压近日出现运动症状波动, 伴有异动症。导致该不良反应的药物是 ()

A: 氨氯地平

B: 苧丝肼

C: 左旋多巴

D: 苯海索

答案：C

67. 经口急性汞中毒出现的典型症状是（）

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 腐蚀性口腔炎
- C: 恶心、呕吐、视物模糊
- D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：B

68. 以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 羧甲司坦
- D: 氨溴索

答案：A

69. 口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

- A: 糖耐量异常
- B: 高密度脂蛋白胆固醇降低
- C: 低密度脂蛋白胆固醇升高
- D: 甘油三酯降低

答案：A

70. 患者，77 岁，因感冒发热咳嗽，自服酚麻美敏片、维 C 银翘片，三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是（）

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 维生素
- C: 银翘

D: 氯苯那敏

答案: D

71. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

A: HBeAb

B: HBsAg

C: HBsAb

D: HBeAg

答案: C

72. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 右美沙芬

B: 伪麻黄碱

C: 苯海拉明

D: 愈创木酚甘油醚

答案: D

73. 患儿，男，2岁，患有尿路感染，适宜的治疗药物是

A: 链霉素

B: 阿莫西林

C: 左氧氟沙星

D: 复方磺胺甲噁唑

答案: B

74. (2018年真题) 患者，男，80岁，患有高血压、2型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是()

- A: 依那普利
- B: 二甲双胍
- C: 珍菊降压片（含氢氯噻嗪）
- D: 非那雄胺

答案：C

75. 可引起性功能障碍的药物是

- A: 沙美特罗
- B: 维生素 E
- C: 度洛西汀
- D: 西地那非

答案：C

76. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 青霉素
- B: 头孢菌素
- C: 氟喹诺酮类
- D: 碳青霉烯类

答案：C

77. （2019 年真题）患者，男，60 岁，诊断为高血压伴高尿酸血症，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 螺内酯
- D: 氯沙坦

答案：D

78. (2017 年真题) 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是 ()

- A: 左旋多巴片
- B: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- C: 维 A 酸片
- D: 非洛地平片

答案：A

79. 对肾功能不全患者的给药方案调整，说法正确的是

- A: 可采用减量法给药，即每次剂量减少而用药间隔不变，但该法的血药浓度波动幅度较大
- B: 可采用延长给药间隔法，即每次给药剂量不变而用药间隔延长，但该方法很难达到有效血药浓度
- C: 必须使用具有明显肾毒性药物时，宜进行血药浓度监测，实行个体化给药
- D: 尽可能选用经肝消除的药物，肝毒性大的药物不必减量

答案：C

80. 经口急性铅中毒出现的典型症状是 ()

- A: 恶心、呕吐、口内有金属味
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 腐蚀性口腔炎
- D: 恶心、呕吐、视物模糊

答案：A

81. 有卒中病史的急性冠状动脉综合征患者禁用

- A: 普拉格雷
- B: 阿司匹林
- C: 替格瑞洛
- D: 替罗非班

答案：A

82. 中度药品不良反应是指

- A: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- B: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗
- D: 没有临床症状，无须治疗

答案：A

83. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 控制体重
- B: 应用阿司匹林
- C: 适量运动
- D: 低嘌呤饮食

答案：B

84. 与左旋多巴合用，可提高疗效的是()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 奥美拉唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/046203234105011030>