

2024 年广东省云安区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库【能力提升】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 预混胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：C

2. 适宜餐前给药的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 二甲双胍
- C: 复方铝酸铋
- D: 法莫替丁

答案：C

3. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查 results，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

- A: 控制体重
- B: 避免高脂饮食
- C: 禁烟戒酒
- D: 服用 NSAIDs 止痛

答案：D

4. 服用维生素 A、维生素 D 等应该食用的是

A: 脂肪

B: 酒

C: 食醋

D: 食盐

答案：A

5. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

A: 很可能

B: 待评价

C: 可能无关

D: 可能

答案：D

6. 抗结核联合治疗方案中，可引起球后视神经炎不良反应的药物是()

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 左氧氟沙星

D: 利福平

答案：A

7. 属于雄激素受体阻断剂的是（）

A: 普适泰

B: 度他雄胺

C: 氟他胺

D: 雌三醇

答案：C

8. 一医师为食管癌患者开方，给予顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星、依托泊苷治疗。此处方应评定为

A: 有禁忌证用药

B: 无适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 不合理联合用药

答案：C

9. 下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 苯巴比妥

D: 地塞米松

答案：A

10. 妊娠期妇女用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A: 28 天之内

B: 3 个月之后

C: 21 天之内

D: 18 天之内

答案：D

11. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

- A: 25~50mgqd, 长期维持
- B: 100-150mgqd, 长期维持
- C: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg; 随后 75~100mgqd, 长期维持
- D: 75~100mgbid, 长期维持

答案: C

12. 必须立即用清水冲洗至少 5 分钟是清除 ()

- A: 眼内进入固体腐蚀性颗粒
- B: 眼内污染毒物
- C: 毛发被毒物污染
- D: 皮肤污染酚类毒物

答案: B

13. 对于不符合溶栓适应证且无抗血小板治疗禁忌证的急性脑梗死患者在发病后尽早给予阿司匹林, 推荐剂量为

- A: 300~350mg/d
- B: 50~150mg/d
- C: 150~300mg/d
- D: 200~350mg/d

答案: C

14. 下列有关焦虑症的叙述, 错误的是

- A: 焦虑症有家族聚集性, 女性焦虑症的患病率较高
- B: 惊恐发作是焦虑症最常见的表现形式
- C: 社交焦虑障碍严重者可表现为回避社交, 导致社交隔离
- D: 大多数焦虑症起源于儿童或者青春期

答案: B

15. 患者,男,60岁,因轻度冻疮(无破溃)到药店购药,药师应推荐的药品是()

- A: 利巴韦林软膏
- B: 10%樟脑软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 氢化可的松软膏

答案: B

16. 下列医药卫生技术人员中,不具备处方审核资质的是

- A: 药师
- B: 药士
- C: 执业药师
- D: 主管药师

答案: B

17. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

- A: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- B: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂
- C: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂
- D: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂

答案: D

18. 酒的主要成分为乙醇,饮用后人体先是兴奋,随之对中枢神经出现抑制,并扩张血管,刺激或抑制肝药酶代谢系统;另外,有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上,药与酒的相互作用结果有两个:一是降低药效;二是增加发生不良反应的几率。

- A: 血压升高
- B: 过敏反应
- C: 血糖不降
- D: 低血糖反应

答案：D

19. 下列治疗老年痴呆药物可通过酸化尿液而显著增加其排泄的是

- A: 加兰他敏
- B: 多奈哌齐
- C: 碳酸氢钠
- D: 美金刚

答案：D

20. 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用的机制是

- A: 减少不良反应
- B: 敏感化作用
- C: 拮抗作用
- D: 协同作用

答案：C

21. 疱疹性脑炎的致病原为

- A: HSV-1
- B: HCV
- C: VZV
- D: HSV-2

答案：A

22. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 膀胱灌注
- B: 动脉注射
- C: 腔内注射
- D: 腹腔注射

答案：B

23. 依据生物钟规律，适宜清晨服药的是

- A: 调节血脂药
- B: 抗过敏药
- C: 平喘药
- D: 抗忧郁药

答案：D

24. 选择合适药物的前提是

- A: 药物治疗的方便性
- B: 药物治疗的规范性
- C: 药物治疗的安全性
- D: 药物治疗的有效性

答案：C

25. 烟酸类

- A: 吉非贝齐
- B: 考来烯胺
- C: 辛伐他汀
- D: 阿昔莫司

答案：D

26. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

- A: 肝素
- B: 噻氯匹定
- C: 链激酶
- D: 华法林

答案：B

27. (2021 年真题) 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L, 需要次氯酸钠溶液 (有效氯浓度为 6. 0%) 和纯化水的量分别是 ()

- A: 120mL 和 9880mL
- B: 150mL 和 9850mL
- C: 830mL 和 9170mL
- D: 83mL 和 9917mL

答案：D

28. 属于非麻醉性镇咳药的是

- A: 羟甲唑啉
- B: 沙丁胺醇
- C: 苯丙哌林
- D: 羧甲司坦

答案：C

29. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，归属于

- A: 治疗药物监测
- B: 静脉药物配置
- C: 处方审核
- D: 处方点评

答案：D

30. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

- A: 四级信息源
- B: 三级信息源
- C: 二级信息源
- D: 一级信息源

答案：B

31. （2018 年真题）患者，女，19 岁，面部出现多个丘疹和脓疱有脱皮表现，临床诊断为痤疮。外用制剂改善不佳，换用异维 A 酸片。使用异维 A 酸片的用药注意事项和用药指导，不包括（）

- A: 用药前排除妊娠
- B: 监测精神症状
- C: 每 1—3 个月监测血尿酸水平
- D: 治疗期间或治疗后 1 个月内避免献血

答案：C

32. 从事药学服务的药师必须具备的专业技能是

- A: 沟通技能
- B: 药历书写技能
- C: 药物警戒技能
- D: 调剂技能

答案：D

33. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5%葡萄糖注射液 350ml 中，临床要求给药速度是 60mg/h，输注速度是

A: 15ml/h

B: 42ml/h

C: 36ml/h

D: 60ml/h

答案：B

34. 易吸湿的药品

A: 可贮存于严密的药箱内

B: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

C: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

D: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

答案：D

35. 小儿呼吸道感染可服用琥乙红霉素颗粒，剂量为 30~50mg/(kg·d)，分 3~4 次服用，一位体重为 20kg 的儿童一次剂量应为

A: 215~350mg 或 175~270mg

B: 225~375mg 或 200~300mg

C: 175~250mg 或 125~225mg

D: 200~333mg 或 150~250mg

答案：D

36. 常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 磺胺醋酰

B: 麻黄碱

C: 碳酸氢钠

D: 苯巴比妥

答案：C

37. 服药饮酒可增加发生胃溃疡出血危险的是

- A: 吲哚美辛
- B: 甲氨蝶呤
- C: 普萘洛尔
- D: 格列本脲

答案：A

38. 易受光线影响而变质的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 复方甘草合剂
- C: 阿卡波糖片
- D: 头孢曲松钠

答案：A

39. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

- A: 驳倒的信号
- B: 尚不确定的信号
- C: 部分确认的信号
- D: 确认的信号

答案：B

40. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是归属于查看材料

- A: 药学信息服务工作
- B: 处方点评工作
- C: 参与健康教育工作
- D: 处方审核工作

答案：A

41. 转复并维持窦性心律

- A: 血凝酶
- B: 华法林
- C: 硝苯地平
- D: 多非利特

答案：D

42. 可提示肝细胞性黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- B: $>342 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：C

43. 二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

- A: 撒网式给药
- B: 有禁忌症用药
- C: 盲目联合用药
- D: 超适应症给药

答案：D

44. (用药导致的血常规异常) 抗真菌药

- A: 血红蛋白量增多
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 中性粒细胞减少
- D: 血小板减少

答案：C

45. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 心肌梗死
- B: 肢端肥大症
- C: 肝脏疾病
- D: 肾性肾小球肾炎

答案：D

46. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 支气管哮喘
- C: 慢性支气管炎急性发作
- D: 急性左心衰竭

答案：D

47. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是应有效控制血尿酸浓度、排酸

- A: 急性发作期
- B: 发作间歇期
- C: 痛风性肾病治疗期
- D: 首次发作期

答案：B

48. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是

- A: 妊娠 3~12 周
- B: 妊娠 1~2 周
- C: 妊娠 13~27 周
- D: 妊娠 28~32 周

答案：A

49. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的"盐"1 μg 作为 1IU 抗生素是

- A: 链霉素
- B: 四环素
- C: 土霉素
- D: 红霉素

答案：B

50. 可用于不明毒物中毒、与其形成腐蚀性较小化合物的洗胃液是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 鸡蛋白

答案：A

51. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 卡托普利
- B: 氨氯地平

C: 比索洛尔

D: 厄贝沙坦

答案: D

52. “室温”所指温度范围是

A: 2℃～10℃

B: 10℃～30℃

C: -5℃～10℃

D: 30℃～40℃

答案: B

53. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是 ()

A: 博来霉素

B: 阿霉素

C: 吉非替尼

D: 氟尿嘧啶

答案: D

54. 服用他汀类调节血脂药可能导致

A: 血清总胆固醇升高

B: 血清碱性磷酸酶升高

C: 血清白蛋白升高

D: 血白细胞计数降低

答案: B

55. 原发性失眠首选 ()

A: 佐匹克隆

B: 水合氯醛

C: 苯巴比妥

D: 劳拉西泮

答案: A

56. 可引起驾驶员口渴、头晕的药物是

A: 阿米洛利

B: 双嘧达莫

C: 东莨菪碱

D: 抗过敏药

答案: A

57. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

A: 一般无须调整剂量

B: 尽可能避免使用

C: 须谨慎使用，必要时减量给药

D: 需增加给药剂量

答案: A

58. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

A: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

B: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

C: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

D: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

答案: C

59. 在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞(DC)的正常比例范围是

A: 0.50~0.70

B: 0.03~0.08

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 0.20~0.40

D: 0.01~0.05

答案：A

60. 随机对照临床试验结果属于循证医学证据级别的

A: 1 级证据

B: 3 级证据

C: 4 级证据

D: 2 级证据

答案：A

61. (2021 年真题) 头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合, 可导致
()

A: 微浑浊或沉淀

B: 溶液变色

C: 产生胶状不溶物

D: 产生气体

答案：A

62. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准未经严格论证或评估的专家意见在循证医学价中的证据级别属于 ()

A: 3 级

B: 5 级

C: 2 级

D: 1 级

答案：B

63. (消化性溃疡病的治疗)，除中和胃酸外，尚具有黏膜保护作用

- A: 硫糖铝
- B: 溴丙胺太林
- C: 奥美拉唑
- D: 硫酸镁

答案：A

64. 用于疼痛治疗、耐受性最好的非甾体抗炎药是

- A: 布洛芬
- B: 塞来昔布
- C: 贝诺酯
- D: 阿司匹林

答案：A

65. 真菌引起阴道炎（）

- A: 庆大霉素
- B: 咪康唑
- C: 甲硝唑
- D: 聚甲酚磺醛

答案：B

66. 因可抑制前列腺内双氢睾酮水平而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 前列康
- C: 黄酮哌酯
- D: 特拉唑嗪

答案：A

67. 在三级信息源中，世界上最著名的大型药物参考工具书是

- A: 药物事实与比较
- B: 美国药典药物信息
- C: 马丁代尔药物大典
- D: 中国药典

答案：C

68. 血红蛋白(HGB)正常参考区间是

- A: 180~220g/L
- B: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- C: 170~200g/L
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times$

答案：C

69. 收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

- A: 重组人促红细胞生成素
- B: 糖皮质激素
- C: 咖啡因
- D: 伪麻黄碱

答案：D

70. #NAME?

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

71. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

- A: 泪液减少
- B: 眼睑沉重、痉挛
- C: 复视
- D: 视物时症状加重

答案：D

72. 处方中外文缩写 OS 代表()

- A: 双眼
- B: 左耳
- C: 右耳
- D: 左眼

答案：D

73. 服用药物对粪外观的影响,利福平

- A: 变红或黑色
- B: 黄色
- C: 橘红至红色
- D: 红至黑色

答案：C

74. 患者，女性，62 岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

- A: 300～500mg/d
- B: 300mg/d
- C: 75～150mg/d
- D: 200～300mg/d

答案：C

75. 心力衰竭的常用药方案是

- A: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+ACEI
- B: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+B 受体阻断剂
- C: 醛固酮受体阻断剂+ α 受体阻断剂+钙通道阻滞剂
- D: 醛固酮受体阻断剂+ β 受体阻断剂+强心苷类

答案：A

76. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“B”是指

- A: 健康教育和运动
- B: 阿司匹林和 ACEI
- C: 控制饮食和糖尿病
- D: β 受体阻断剂和血压控制

答案：D

77. 对于铁剂的使用，错误的是

- A: 口服铁剂是治疗缺铁性贫血的首选方法？
- B: 钙剂可促进铁剂吸收？
- C: 口服铁剂宜选用 2 价铁？
- D: 为了补足储存铁，铁剂治疗应该在 Hb 正常后至少再补充铁剂 4~6 个月？

答案：B

78. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

- A: 铅中毒
- B: 乙醇中毒
- C: 催眠药中毒
- D: 汞中毒

答案：B

79. 杨某，女，19 岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温 39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC 12×10^9 / L。该患者对青霉素过敏。

A: 哮喘

B: 社区获得性肺炎

C: 支气管炎

D: 肺结核

答案：B

80. （2017 年真题）患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

A: 维生素 B6 缺乏

B: 维生素 A 缺乏

C: 维生素 B12 缺乏

D: 维生素 B2 缺乏

答案：C

81. 不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

A: 睡前

B: 餐前

C: 两餐间

D: 餐后

答案：D

82. 卡比马唑的维持剂量是一日

- A: 5~15mg
- B: 15~60mg
- C: 30~60mg
- D: 25~80mg

答案：A

83. 下列为二级信息源的药学文献的是

- A: 中国药学文摘
- B: 药物信息手册
- C: 中国国家处方集
- D: 药学杂志

答案：A

84. 连续规律用药 2 日以上方能充分发挥作用的药品是

- A: β 受体拮抗剂
- B: 非甾体抗炎药
- C: 短效 β
- D: 吸入型糖皮质激素

答案：D

85. 药物不良反应胶体果胶铋（）

- A: 溢乳现象
- B: 性功能障碍
- C: 黑便
- D: 睡眠障碍

答案：C

86. 下列金属解毒剂中，对铅中毒疗效最好的是

- A: 二巯丁二钠
- B: 二巯丙醇
- C: 硫代硫酸钠
- D: 依地酸钙钠

答案：D

87. 某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

- A: 环丙沙星
- B: 呋喃妥因
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 头孢曲松

答案：A

88. 应用华法林抗凝治疗时，INR 安全有效范围为血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

- A: 2.0~3.0
- B: 2.0~2.5
- C: >3.0
- D: <2.0

答案：A

89. 患者，女，48 岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

- A: 高浓度、快速滴注，时间控制在 1 小时以内
- B: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在 2 小时以上
- C: 低浓度、快速滴注

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 低浓度、缓慢滴注，时间控制在 6 小时以上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/046221011101011030>