2022-2023年安徽省铜陵市全科医学（中级）专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30题)

1.患者，男，25岁，农民。面色苍白、疲乏无力一年。血象:RBC2．0×10^{12}／L，Hb60g／L，WBC7．6×100／L，中性粒细胞0．50，淋巴细胞0．26，嗜酸性粒细胞0．14，SF10μg／L，血片中成熟红细胞中央淡染区扩大。拟诊为缺铁性贫血。

此患者给予硫酸亚铁0．3g／次，3次／日，口服，治疗1个月效果不佳，其原因为

A.诊断不正确 B.病因未去除 C.所给铁剂剂量不够 D.未合并应用维生素C E.未使用注射铁剂

2.关于色素痣的描述，下列哪项是错误的

A.由含黑色素颗粒的痣细胞组成

B.由含黑色素的多少可呈黑色、褐色和黄色

C.可分为皮内痣和交界痣

D.可恶变形成皮肤癌

E.怀疑有恶变应及时切除并行病理检查

3.目前对肾盂鹿角状结石的最佳治疗方法是

A.ESWL B.经皮肾镜碎石术 C.琰灏几十经皮肾镜碎石术 D.经肾盂切开取石术 E.患肾切除术

4.患者，女性，58 岁。少尿 1 周入院。血压 180/120mmHg，嗜睡，贫血，颜面及双下肢水肿。血尿素氮 42mmol/L，肌酐 1380umol/L，血钾 6.2 mmol/L，血钙 2.0mmol/L，二氧化碳结合力 12mmol/L。在纠正酸中毒的过程中突然手足搐搦，意识清楚，病理征阴性。其手足搐搦的原因可能是

A.由高血压引起 B.尿毒症脑病 C.由高钾血症引起 D.因补碱引起 E.脑出血

5.病情进一步发展，出现黄疸，应首先考虑为

A.肝癌破裂出血 B.胆囊结石进入胆总管并堵塞远端 C.坏死性急性胰腺炎 D.胆囊坏疽穿孔致胆汁性腹膜炎 E.胆囊癌侵犯肝总管

6.男，21 岁，半年来腰痛、腰僵，活动受限。查骶髂关节叩击痛(+)。为明确诊断，首选哪项检查

A.A.ESR(血沉)、CRP(C-反应蛋白)

B.血尿酸

C.HLA-B27(组织相容抗原)

D.骨盆正位 X 线平片

E.B 超

7.关于无症状性心衰，下列哪项正确

A.左室已有功能下降，LVEF < 50%，有神经内分泌激活

B.左室已有功能下降，LVEF > 50%，有神经内分泌激活

C.左室已有功能下降，LVEF < 50%，无神经内分泌激活

D.左室已有功能下降，LVEF > 50%，无神经内分泌激活

E.此为一短暂的代偿过程

8.X 线检查对骨折的意义主要是

A.了解受伤机制 B.明确诊断 C.判断骨折预后 D.了解伤情 E.了解骨质密度

9.慢性特发性血小板减少性紫癜血小板破坏的主要场所是（ ）

A.血循环中 B.肝脏 C.脾脏 D.肺脏 E.骨髓

10.在急诊室，有一位 55 岁女性，3 年前因患急性坏疽性阑尾炎，行阑尾切除术，6 小时前开始感阵发性腹痛，腹胀，排气，排便减少，伴恶心，呕吐。最可能出现下列哪项体征

A.全腹肌紧张，压痛，反跳痛

B.巩膜及全身皮肤黄染

C.腹部听诊可闻及肠音亢进或高调肠音，伴气过水声

D.腹部可触及包块，移动性浊音阳性

E.右上腹压痛，轻度肌紧张，墨菲征(+)

11.女，32 岁，突然寒战、高热，伴腰痛、尿频、尿急、尿痛 3 天就诊。查体：肾区有叩击痛，化验：尿蛋白(+)，镜检：白细胞满视野，白细胞管型 0～2 个/HP，最可能的诊断是

A.A.急性肾小球肾炎 B.慢性肾小球肾炎急性发作 C.急性肾盂肾炎 D.慢性肾盂肾炎隐匿型 E.急性膀胱炎

12.女，30 岁，家中火灾烧伤，咳嗽，咳出炭末痰，呼吸困难，面、颈、口鼻深Ⅱ度烧伤声音嘶哑，患者的烧伤严重性分度为

A.轻度烧伤 B.中度烧伤 C.重度烧伤 D.深度烧伤 E.特重度烧伤

13.下列哪个不是消化性溃疡的发病机制

A.免疫调节异常 B.胃酸、胃蛋白酶的消化作用 C.反流的胆汁、胰酶的侵袭作用 D.精神因素 E.Hp 感染

14.中心型肺癌的 X 线胸片常见

A.肺内孤立结节影 B.肺门肿块影 C.胸膜增厚 D.肿块贴近胸膜 E.肺段不张影

15.癌常常发生于乳腺的哪个部位

A.外上象限 B.乳腺内上侧 C.乳腺钋下象限 D.乳腺尾叶 E.乳腺内下象限

16.治疗霍乱首选为

A.抗菌药物 B.禁食 C.血管活性药 D.补液 E.抗毒素治疗

17.老年女性，突发右上腹疼痛，向肩部放射，伴发热、寒战。查体 T：39℃，巩膜黄染，心肺未见异常，右上腹肌紧张，压痛，反跳痛。最可能的诊断是

A.急性胰腺炎 B.肝癌破裂 C.胆总管结石 D.胆道蛔虫症 E.胃肠穿孔

18.假定上述患者在社区医院就诊，诊断为急性心肌梗死，除下列哪项处理外均为正确措施

A.A.立即吸氧

B.立即应用吗啡镇痛

C.立即口服阿司匹林

D.立即含服硝酸甘油

E.不必上述处理，争取第一时间转送至上级医院

19.下列哪种疾病可引起局部水肿

A.肝硬化 B.丝虫病 C.右心衰竭 D.营养不良 E.肾病综合征

20.男，78 岁。l 天前突然失语伴右上肢活动无力进行性加重，但意识清楚，脑脊液检查无异常。最可能的诊断是

A.短暂性脑缺血发作 B.脑血栓形成 C.脑栓塞 D.脑出血 E.

蛛网膜下腔出血

21.一患者心电图图形如图 3-4，最可能的诊断为




图 3-4

A.一度房室传导阻滞 B.二度 I 型房室传导阻滞 C.二度Ⅱ型房室传导阻滞 D.高度房室传导阻滞 E.三度房室传导阻滞

22.女，23 岁，间断四肢抽搐发作伴意识丧失 2 年，1 小时前复发，神志不清，先后抽搐 3 次，既往有癫痫、不规则服药史

病人的癫痫处于何种情况

A.A.癫痫持续状态 B.全身性强直-阵挛发作 C.单纯部分发作 D.复杂部分发作 E.癫痫发作后昏睡期

23.甲型肝炎患者，血清学检查表现为

A.抗-HEV 阻性 B.HBsAg 阳性 C.抗-HCV 阳性 D.抗-HAVIgG 阳性 E.抗-HAV1gM 阳性

24.患者，女性，64 岁。因刺激性咳嗽 4 个月，血丝痰 3 个月，一直服中药效果欠佳，近 1

周出现右胸持续性隐痛，进行性加剧，咳痰渐多，伴发热，体温 37.4 ~ 38.5℃，转呼吸科诊治，经检查证实为右肺鳞癌，胸膜转移，右侧恶性胸腔积液，右肺阻塞性肺炎。下列治疗方案应选择

A.抽胸水后尽快手术治疗，术后放疗 + 化疗

B.抽胸水后尽快手术治疗，术后仅做放疗

C.抽胸水后尽快手术治疗，术后化疗 3 ~ 6 次

D.胸水引流术治疗 + 化学性胸膜固定术治疗 + 肺癌化疗

E.胸水引流术治疗 + 化学性胸膜固定术治疗 + 肺癌术前化疗 + 术后免疫辅助治疗

25.女，47 岁。右乳癌术后 2 个月，上腹胀痛为持续性，B 超示肝多发占位性病变，大量腹水，甲胎蛋白(一)，巩膜黄染，上腹压痛，肝脾触及不满意。最可能的诊断足

A.原发性肝癌 B.肝多发囊肿 C.肝血管瘤 D.肝脓肿 E.肝转移癌

26.属于抗原虫药的是( )。

A.抗阿米巴及滴虫药 B.抗线虫病药 C.抗血吸虫病药 D.抗血绦虫病药

27.治疗消化性溃疡疗效最好的抑酸药是

A.丙谷胺 B.奥美拉唑 C.派毗氮平 D.法莫替丁 E.米索前列醇

28.(假设信息)若痰检抗酸杆菌阴性，尽管症状、体征明显，下列除哪项之外，你都应该怀疑

A.A.干酪性肺炎 B.肺炎球菌性肺炎 C.肺炎支原体肺炎 D.金黄色葡萄球菌肺炎 E.肺脓肿

29.测定血清铁(SI)、血清铁蛋白(SF)、总铁结合力(TIBC)及转铁蛋白饱和度(TS)可了解机体铁代谢情况，缺铁性贫血时

A. SI↓,SF↑,TIBC↓,TS↑
B. SI↑,SF↓,TIBC↑,TS↓
C. SI↓,SF↓,TIBC↓,TS↑
D. SI↑,SF↑,TIBC↑,TS↑
E. SI↓,SF↓,TIBC↑,TS↓

A.A B.B C.C D.D E.E

30.男，14 岁，无糖尿病家族史，口干、乏力、消瘦 1 个月，验空腹血糖 15.6mmol/L，尿糖(++++)，尿酮体(++)，尿蛋白(-)

本病考虑诊断为

A.A.1 型糖尿病合并酮症

B.2 型糖尿病合并酮症

C.肾性糖尿病合并酮症

D.继发性糖尿病合并酮症

E.线粒体基因突变糖尿病合并酮症

二、专业知识(10 题)

31.确诊慢性胃炎的主要依据是

A.年龄 B.X 线钡餐检查 C.大便潜血试验 D.HP 检查 E.胃镜及胃黏膜活检

32.对于患者目前出现的水肿和心力衰竭，下列哪项措施可暂不考虑

A.抗生素控制感染 B.氨茶碱解痉 C.西地兰强心 D.酚妥拉明静脉滴注 E.氢氯噻嗪利尿

33.下列哪项不是急性乳腺炎的早期临床表现

A.局部胀痛 B.形成肿块 C.可有压痛 D.体温升高 E.波动性肿块

34.最可能的诊断是

A.慢性肾炎 B.尿路结石 C.尿路感染 D.隐匿型肾炎 E.膀胱炎

35.男性，42 岁，左下腹痛 l 个月，便血，里急后重，下列哪项检查较简便，有诊断意义

A.便培养+药敏 B.血 CEA C.直肠指诊 D.钡灌肠 E.腹部 CT

36.男性，50 岁，患慢性支气管炎多年，近 2 年出现走路时气急，曾胸部透视发现肺纹理增强紊乱，两肺透光度增加，膈肌位于第 ll 后肋，1 天前在用力时突感呼吸困难加重，右胸刺痛，最可能的诊断是

A.肺气肿 B.自发性气胸 C.肺栓塞 D.肺大疱 E.慢性支气管炎合并急性感染

37.AMl 病人半夜突然出现呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，第一心音减弱，舒张期奔马律，心尖可闻及 2 级收缩期杂音，该患者诊断为

A.右心衰竭 B.室壁瘤 C.急性左心衰竭 D.支气管肺炎 E.心肌梗死后综合征

38.该患者脑 CT 图像应为

A.起病后即可见高密度异常影

B.起病 24 ~ 48 小时后可见异常高密度影

C.起病 24 ~ 48 小时后可见异常低密度影

D.可见脑室扩大

E.起病后即可见低密度异常影

39.(71 ~ 74 题共用题干) 男性，30 岁，l0 年来阵发性心悸，每次心悸突然发作，持续半小时至 3 小时不等，此次发作持续半小时而来就诊。检查 : 血压 90 / 60mmHg，心率 200 次 / 分，心律绝对规则，无杂音，肺

(一) 估计此次心律失常最可能的是

A.2 : 1 心房扑动 B.阵发性室性心动过速 C.窦性心动过速 D.阵发性室上性心动过速 E.心房纤颤

40.(81～82 题共用备选答案)

81. 男性，62 岁，急性心肌梗死后第 2 天，胸闷、心悸、咳嗽，BP140 / 90㎜Hg，心率 96 次 / 分，双肺底中小水泡音，选择哪一种治疗最好

A.硝普钠 B.β 受体阻滞剂 C.西地兰 D.地西泮 E.间羟胺

三、共用题干单选题(5 题)

41.应确诊病原进一步检查，下列哪项检查不必要

A.抗-HAV-IgM B.乙肝五项 C.抗-HEV-IgM D.腹部 CT E.G-6-PD 酶活性

42.患者，男性，23 岁。因急性吐泻半小时来院急诊。午餐曾进食海鲜饭。晚上出现呕吐腹泻。大便初为黄色稀水便，量多，进而变为水样便、米泔样便，无里急后重。体检：T 36.7℃，P100 次/分，BP 90/60mmHg，R 20 次/分，脉搏细速，皮肤干燥，双肺未闻及啰音，心律齐，腹平软，肝脾未触及，粪便悬滴镜检可见到运动力强、呈穿梭状运动的细菌，革兰染色阴性。最可能的诊断是

A.肠炎 B.细菌性痢疾 C.伤寒 D.食物中毒 E.霍乱

43.最可能的诊断是

A.感染中毒性休克 B.急性机械性肠梗阻 C.急性中毒，心肌损害 D.中毒性巨结肠 E.急性肺栓塞

44.确诊上述病例最可靠的方法是

A.MRIB 型超声波 B.胃镜＋活检 C.X 线钡餐 D.CT 扫描

45.该疾病最需与哪种疾病鉴别

A.肝炎 B.肠炎 C.胃炎 D.肠癌 E.霍乱

参考答案

1.B 从病例资料反映该缺铁性贫血患者经口服补铁治疗无效，其原因为病因未去除。

2.C 色素痣可分为皮内痣、交界痣和混合痣。

3.C 肾盂鹿角状结石是最难治疗的泌尿系结石，目前随着新技术的出现，琰灏亿结合经皮肾镜碎石治疗已经取代了以往的经肾窦切开取石手术。具体方法是先行经皮肾镜碎石、取石治疗，对经皮肾镜不能粉碎和不能取出的结石再行体外震波碎石治疗。现在用于经皮肾镜碎石的器械有钬激光碎石、弹道碎石和超声波碎石等。

4.D

纠正酸中毒后，血 Ca^{2+} 与蛋白结合增加，血清游离 Ca^{2+} 减少，可发生手足搐搦。过快纠酸时，尤其是原先已有低钙血症时更易出现。此患者酸中毒，存在低钙血症，此次于纠正酸中毒过程中突然出现手足搐搦，考虑与补碱纠正酸中毒有关，选择答案 D。

5.B 结石进入胆总管导致胆道梗阻，出现梗阻性黄疸。

6.D

D。根据临床表现及查体，考虑为强直性脊柱炎，骨盆正位 X 线平片检查可明确诊断。故选 D。

7.A

本题考点：无症状心衰的诊断。无症状心力衰竭，体力活动不受限制，日常生活不引起心功能不全的表现 ,这是由于心脏功能代偿调节的结果，在调节机制中，有交感神经一肾上腺系统的活动，使心率增快，收缩加强，心排出量恢复，使 LVEF < 50%。

8.D

9.C 慢性特发性血小板减少性紫疲血清存在血小板抗体 (PAIgG)，在脾脏中使血小板破坏增多。

10.C 根据患者阑尾炎手术史及“痛、吐、胀、闭”临床表现，高度怀疑肠梗阻，故腹部听诊可能闻及高亢肠鸣音伴气：吐水声。

11.C 若女性尿急、尿频、尿痛严重，再加上尿白细胞增多，便可怀疑为尿路感染，如尿细菌定量培养≥10^5 / ml，致病菌为大肠杆菌、克雷伯杆菌、变形杆菌、凝固酶阴性葡萄球菌等则拟诊为尿路感染。患者急性起病，有明显寒战、高热等全身症状，急性肾盂肾炎可能性最大。膀胱炎一般无明显的全身感染症状。

12.C 重度烧伤是指烧伤总面积 30％～49％；或Ⅲ度烧伤 10％～l9％；或烧伤面积虽不达上述百分比，但已发生休克等并发症、呼吸道烧伤或有较严重的复合伤。

13.A

14.B

B。中心型肺癌的胸片直接 X 线特征是肺门肿块影。故选 B。

15.A

16.D

补充液体与电解质，防止循环衰竭、尿毒症及酸中毒，是治疗霍乱首要解决的矛盾和原则。

17.C 胆结石患者常见症状有持续性上腹痛，可放射到肩背部，伴恶心、呕吐，面色苍白，大汗淋漓，弯腰打滚，发作后还有发热，黄疸等症状;常有右上膜胀闷不舒之感，伴嗳气、恶心等消化不良症状，当进食油腻食物后更加明显。发作时出现阵发性上腹部绞痛、寒战发热和黄疸三者并存（夏科三联征），是结石阻塞继发胆道感染的典型表现。

18.E

对心肌梗死患者，强调及早发现，及早住院，并加强住院前的就地处理。

19.B 丝虫病，表现为下肢皮肤粗糙、增厚，皮下组织增厚，水肿机制为淋巴回流受阻。

20.B 脑血栓的临床表现和诊断要点：①50 岁以上多见；②有 TIA 病史或高血压、糖尿病等危险因素；③发病急骤，但还可缓慢加重；④常于安静状态或休息时出现偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲、失语或其他脑局灶损害症状；⑤大多无明显头痛和呕吐；⑥一般无意识障碍；⑦脑脊液检查基本正常。

21.B

图中 P-R 间期逐渐延长，第 2、7 个 P 波后的 QBS 波群脱落。包含受阻 P 波的 RR 间期＜2 个 PP 间期，QBS 波群时限正常，符合二度 I 型房宣传导阻滞的特点。

22.B

B。根据患者既往有癫痫病史，有不规则用药的诱因，典型的发作症状，可诊断。

23.E

24.D 该患者肺癌合并胸膜转移，右侧恶性胸腔积液，属Ⅳ期，已经失去手术治疗机会，治疗方案中所有含手术的方案均为不合理的方案，故应该选 D。

25.E 根据：①乳癌术后；②肝多发占位；③AFP 阴性。故选 E

26.A

27.B

奥美拉唑属质子泵抑制剂(PPI)，作

用于壁细胞胃酸分泌的终末步骤中的关键酶 H^+-K^+-ATP 酶，使其不可逆地失去活性，导致壁细胞内的 H^+ 不能转移至胃腔中而抑制胃酸分泌，待新的 H^+-K^+-ATP 酶生成时，壁细胞才恢复泌酸功能。

28.C

肺炎支原体肺炎通常起病缓慢，症状较轻，胸部体格检查与肺部病变程度常不相称，可无明显体征。X 线显示肺部多种形态的浸润影。

29.E

缺铁性贫血时。SI↓，SF↓，TIBC↑，TS↓。

30.A

A。根据患者为青年男性，有口干、乏力、消瘦症状，化验血糖明显高于正常，酮体阳性。可诊断 A。

31.E 胃镜检查并同时取活组织做组织病理学检查是慢性胃炎最可靠的

诊断方法。

32.C 呼吸衰竭的治疗原则为纠正缺氧，改善通气，纠正水、电解质和酸碱失衡及病因治疗等综合疗法。慢性呼吸衰竭诱发右心衰竭时，可小量、短期、间歇应用利尿剂。强心剂的使用应慎重，因疗效不佳，易发生副作用。

33.E

急性乳腺炎最初感乳房肿胀疼痛，患处出现有压痛的硬块，表面皮肤红热，若炎症继续发展，炎块软化形成脓肿，触诊可有波动感。

34.D

35.C 患者左下腹痛 1 个月，便血，里急后重，考虑为直肠病变，检查较简便、有诊断意义的是直肠指诊，尤其对直肠肿瘤有意义。

36.B 继发性自发性气胸多见于有基础肺部病变者，如 COPD、肺结核、肺癌等。发病前部分患者可能有持重物、剧烈体力活动等诱因，起病急骤，患者突感一侧胸痛，继之胸闷和呼吸困难。

37.CAMl 患者由于心脏病变引起心排血量显著、急骤降低导致组织器官灌注不足和急性肺淤血，称为急性心衰，临床表现为突发呼吸困难，大汗、烦躁，咳粉红色泡沫痰等，听诊第一心音减弱，同时有舒张早期第三心音而构成奔马律，肺动脉瓣第二心音亢进。

38.A

39.D 可采用排除法。2 :1 心房扑动心室率通常在 150 次 / 分左右 ; 窦性心动过速常见于正常人活动或情绪激动时，较少引起血压下降 ; 阵发性室性心动过速发作时间短于 30 秒；心房纤颤心室率绝对不规则。

40.A

41.B

42.E

43.D 溃疡型结肠炎可由于钡剂灌肠、低钾或应用抗胆碱能药物或麻醉剂而诱发中毒性巨结肠，也可能自发发生。

44.B

确诊最好的方法是胃镜＋活检。

45.B 患者有发热、腹痛、腹泻、里急后重、排脓血样大便等症状，大便镜检可见大量脓细胞或白细胞(＞15 个/高倍视野)及红细胞，考虑为急性细菌性痢疾。大便培养出痢疾杆菌为确诊依据，故第二问答案为大便培养。急性菌痢主要应与阿米巴痢疾、细菌性食物中毒、其他病原菌引起的肠道感染相鉴别，故第三问应选择 B。2022-2023 年安徽省铜陵市全科医学（中级）专业知识

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(30 题)

1.患者，男，25 岁，农民。面色苍白、疲乏无力一年。血象:RBC2．0×10^{12}／L，Hb60g／L，WBC7．6×100／L，中性粒细胞 0．50，淋巴细胞 0．26，嗜酸性粒细胞 0．14，SF10μg／L，血片中成熟红细胞中央淡染区扩大。拟诊为缺铁性贫血。

此患者给予硫酸亚铁 0．3g／次，3 次／日，口服，治疗 1 个月效果不佳，其原因为

A.诊断不正确 B.病因未去除 C.所给铁剂剂量不够 D.未合并应用维生

素 C E.未使用注射铁剂

2.关于色素痣的描述，下列哪项是错误的

A.由含黑色素颗粒的痣细胞组成

B.由含黑色素的多少可呈黑色、褐色和黄色

C.可分为皮内痣和交界痣

D.可恶变形成皮肤癌

E.怀疑有恶变应及时切除并行病理检查

3.目前对肾盂鹿角状结石的最佳治疗方法是

A.ESWL B.经皮肾镜碎石术 C.琰灏几十经皮肾镜碎石术 D.经肾盂切开取石术 E.患肾切除术

4.患者，女性，58 岁。少尿 1 周入院。血压 180/120mmHg，嗜睡，贫血，颜面及双下肢水肿。血尿素氮 42mmol/L，肌酐 1380umol/L，血钾 6.2 mmol/L，血钙 2.0mmol/L，二氧化碳结合力 12mmol/L。在纠正酸中毒的过程中突然手足搐搦，意识清楚，病理征阴性。其手足搐搦的原因可能是

A.由高血压引起 B.尿毒症脑病 C.由高钾血症引起 D.因补碱引起 E.脑出血

5.病情进一步发展，出现黄疸，应首先考虑为

A.肝癌破裂出血 B.胆囊结石进入胆总管并堵塞远端 C.坏死性急性胰腺炎 D.胆囊坏疽穿孔致胆汁性腹膜炎 E.胆囊癌侵犯肝总管

6.男，21 岁，半年来腰痛、腰僵，活动受限。查骶髂关节叩击痛(+)。为明确诊断，首选哪项检查

A.A.ESR(血沉)、CRP(C-反应蛋白)

B.血尿酸

C.HLA-B27(组织相容抗原)

D.骨盆正位 X 线平片

E.B 超

7.关于无症状性心衰，下列哪项正确

A.左室已有功能下降，LVEF < 50%，有神经内分泌激活

B.左室已有功能下降，LVEF > 50%，有神经内分泌激活

C.左室已有功能下降，LVEF < 50%，无神经内分泌激活

D.左室已有功能下降，LVEF > 50%，无神经内分泌激活

E.此为一短暂的代偿过程

8.X 线检查对骨折的意义主要是

A.了解受伤机制 B.明确诊断 C.判断骨折预后 D.了解伤情 E.了解骨质密度

9.慢性特发性血小板减少性紫癜血小板破坏的主要场所是（ ）

A.血循环中 B.肝脏 C.脾脏 D.肺脏 E.骨髓

10.在急诊室，有一位 55 岁女性，3 年前因患急性坏疽性阑尾炎，行阑尾切除术，6 小时前开始感阵发性腹痛，腹胀，排气，排便减少，伴恶心，呕吐。最可能出现下列哪项体征

A.全腹肌紧张，压痛，反跳痛

B.巩膜及全身皮肤黄染

C.腹部听诊可闻及肠音亢进或高调肠音，伴气过水声

D.腹部可触及包块，移动性浊音阳性

E.右上腹压痛，轻度肌紧张，墨菲征(+)

11.女，32 岁，突然寒战、高热，伴腰痛、尿频、尿急、尿痛 3 天就诊。查体：肾区有叩击痛，化验：尿蛋白(+)，镜检：白细胞满视野，白细胞管型 0～2 个/HP，最可能的诊断是

A.A.急性肾小球肾炎 B.慢性肾小球肾炎急性发作 C.急性肾盂肾炎 D.慢性肾盂肾炎隐匿型 E.急性膀胱炎

12.女，30 岁，家中火灾烧伤，咳嗽，咳出炭末痰，呼吸困难，面、颈、口鼻深Ⅱ度烧伤声音嘶哑，患者的烧伤严重性分度为

A.轻度烧伤 B.中度烧伤 C.重度烧伤 D.深度烧伤 E.特重度烧伤

13.下列哪个不是消化性溃疡的发病机制

A.免疫调节异常 B.胃酸、胃蛋白酶的消化作用 C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/047015142044006100