

N2 级护理人员理论考核测试题+答案

一、单选题（共 104 题，每题 1 分，共 104 分）

1. 电极板上涂满()，以保证电极板与皮肤良好接触，防止空气间隙使接触电阻增高而烧伤皮肤。

- A、消毒液
- B、导电胶
- C、双氧水
- D、生理盐水

正确答案：B

2. 每次治疗完毕，舱内的紫外线空气消毒时间是()

- A、1.5 小时
- B、10 分
- C、1 小时
- D、20 分钟
- E、30 分钟

正确答案：E

3. 尿道假性通道形成的预防措施有，严格掌握夹管开放的时间，开放次数为() 小时 1 次，每天不超过()次

- A、3-5, 7
- B、4-6, 8
- C、4-6, 6
- D、5-6, 5

正确答案：C

4. 功能性便秘应避免

- A、食物过于精细
- B、增加饮水量
- C、依赖泻药
- D、高纤维膳食
- E、有充分体力活动

正确答案：C

5. 低钙在临床上较易发现，可静脉滴注或静脉注射()或氯化钙纠正

- A、5%葡萄糖酸钙
- B、10%葡萄糖酸钙
- C、磷酸钙

D、碳酸钙

正确答案：B

6. 处理放射治疗鼻出血时, 下列哪项是错误的

A、因放射治疗引起的鼻出血不必做合血准备, 输液即可

B、病人取坐位或卧位, 为稳定情绪可用镇静药

C、出血不多可用麻黄碱滴鼻或填入棉花块

D、出血较多者可做鼻腔、后鼻孔填塞

E、难以控制的鼻出血可做颈外动脉结扎

正确答案：A

7. 骨牵引病人为防止针孔感染, 护理上应注意()

A、定期更换牵引钢针

B、每日2次乙醇滴针孔处

C、移动钢针调正位置

D、全身应用抗生素

E、除去针孔血痂

正确答案：B

8. 失衡综合征症状严重者, 应停止透析, 给予镇静剂以及静脉输入()

A、20%甘露醇

B、盐水

C、碳酸氢钠

D、葡萄糖注射液

正确答案：A

9. 齐某, 男, 82岁。因“重症肺炎”入院治疗。病人诉剧烈胸痛且烦躁不安, 血气分析示 PaO₂ 52mmHg。此时, 护士给予的护理措施中不妥的是()

A、给予吗啡镇痛、镇静

B、嘱病人饮水, 入量不足者给予静脉补液

C、饮食补充足够热量、蛋白质和维生素

D、给予吸氧

E、卧床休息

正确答案：A

10. 伤寒患者灌肠时, 灌肠筒内液面不得高于肛门(), 液体量不得超过500ml

A、31cm

B、40cm

C、30cm

D、32cm

正确答案：C

11. 肝硬化病人消化系统特征性的症状是()

A、反酸

B、食欲下降

C、反复呕吐

D、厌油腻食物

E、节律性腹痛

正确答案：D

12. 鉴别糖尿病酮症酸中毒和高渗性非酮症糖尿病昏迷的主要症状为()

A、血压偏低

B、多饮多尿症状明

C、食欲减退

D、神志改变

E、局限性抽搐

正确答案：E

13. 胸腔闭式引流是胸外科应用较广的技术，是治疗()、外伤性血胸、气胸、自发性气胸的有效方法。

A、皮肤发红

B、破溃

C、脓胸

D、破损

正确答案：C

14. 吸痰管插入的长度为患者有咳嗽或恶心反应即可，有气管插管者，则超过气管插管()cm，避免插入过深损伤黏膜

A、1-2

B、2-3

C、1-3

D、3-4

正确答案：A

15. 吸痰法可能出现的并发症包括：低氧血症、呼吸道黏膜损伤、感染、()等

A、呼吸困难

- B、心率加快
- C、呼吸浅慢
- D、心律失常、阻塞性肺不张、气道痉挛

正确答案：D

16. 体外冲击波碎石最适宜于多大的结石

- A、 $<3\text{cm}$
- B、 $\geq 2.5\text{cm}$
- C、 $<2.5\text{cm}$
- D、 $>3\text{cm}$
- E、 $>2.5\text{cm}$

正确答案：C

17. 长期留置导尿管的患者，应采取间断放尿的方法，以减少导尿管对膀胱的刺激。气囊内注入液体要适量，以()ml 为宜，防止牵拉变形进入尿道

- A、5-20
- B、5-15
- C、10-15
- D、10-20

正确答案：B

18. 高血压急症病人首选的抗高血压药是()

- A、氢氯噻嗪
- B、利血平
- C、阿替洛尔
- D、硝酸甘油
- E、硝普钠

正确答案：E

19. 下列输液所致的发热反应的处理措施，哪一项是错误的()

- A、高热者给予物理降温
- B、出现反应，立即停止输液
- C、及时应用抗过敏药物
- D、寒战者给予保温处理
- E、通知医生及时处理

正确答案：C

20. 吸痰前后给予高浓度氧，进行机械通气的患者可给予 100%纯氧 5 分钟，

以提高()

- A、血氧浓度
- B、氧气
- C、血压
- D、呼吸

正确答案：A

21. 空气栓塞时应采取的卧位是()

- A、左侧卧位，头高足低位
- B、端坐位
- C、右侧卧位，头低足高位
- D、半卧位
- E、左侧卧位，头低足高位

正确答案：E

22. 下列哪种症状不是骨折特有的表现()

- A、畸形
- B、疼痛与压痛
- C、功能障碍
- D、反常活动
- E、精神障碍

正确答案：E

23. 要素膳的特点不包括

- A、营养全面
- B、无残渣
- C、使用方便
- D、由肉类、蔬菜加工而成
- E、易于消化

正确答案：D

24. 伍某. 女, 40 岁。既往有“胆囊炎、胆道结石”病史 3 年, 饱餐后突发上腹部疼痛半天入院, 诊断为急性胰腺炎, 该病人禁食一般为()

- A、不超过 12 小时
- B、1-3 天
- C、4-5 天
- D、6-7 天
- E、7 天以上

正确答案：B

25. 对于心血管功能不稳定者，透析时血流量不宜过大，宜维持在()

- A、180ml /min
- B、156ml /min
- C、160ml /min
- D、150ml /min

正确答案：A

26. 钱某, 女, 53 岁。体检时发现右肺部阴影, 行纤维支气管镜检查, 病理报告示“肺腺癌”。关于该类型肺癌, 下列描述错误的是()

- A、发生在段支气管以下
- B、早期常无明显症状
- C、早期侵犯淋巴管
- D、腺癌多为周围型
- E、血行转移发生晚

正确答案：E

27. 透析中发生头痛，大多原因不明，以年轻女性居多。头痛常发生于透析开始后()，头痛持续数小时，可伴有颈部和肩背部疼痛。

- A、2-3 小时
- B、1-3 小时
- C、3-5 小时
- D、5-6 小时

正确答案：A

28. 高血钾最常见的病因是

- A、急性肠梗阻
- B、急性肾衰竭多尿期
- C、长期应用皮质激素
- D、长期应用利尿药
- E、挤压伤(严重)

正确答案：E

29. 患者出现静脉炎时常规给予硫酸镁沿血管方向湿敷，持续时间()小时

- A、6-7
- B、6-8
- C、7-8

D、5-4

正确答案：C

30. 急性心肌梗死最突出的症状是()

A、心律失常

B、休克

C、胃肠道症状

D、心前区痛

E、充血性心力衰竭

正确答案：D

31. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄的心电图表现,叙述正确的是()

A、P波消失,代之以大小、形态不一的f波

B、P波提前出现,形态与窦性P波不同

C、P波变窄,P波宽度 <0.12 秒

D、P波消失,代之以锯齿状F波

E、二尖瓣型P波,P波宽度 >0.12 秒,伴切迹

正确答案：E

32. 导尿管滑脱时应仔细检查气囊是否完整,以免异物残留于膀胱,形成()

A、尿道感染

B、膀胱炎

C、炎症

D、结石核心

正确答案：D

33. 透析结束回血时,血流量应小于()

A、400ml /min

B、100ml /min

C、200ml /min

D、300ml /min

正确答案：B

34. 预防继发性脊髓神经损伤患者有颈椎损伤时,翻身必须(),勿扭曲或者旋转患者的头部,固定头部的操作者,沿纵轴向上略加牵引,使头、颈随躯干一起缓慢移动。

A、由三人操作

B、由双人操作

C、由四人操作

D、由三至四人操作

正确答案：A

35. 阮某, 女, 55 岁。2 天来尿频、尿急、尿痛, 伴血尿, 诊断为尿路感染, 予以口服抗生素。经过一段时间规范治疗后, 菌尿转阴, 停药。护士应告知病人来院做第一次尿菌复查是在是在停药后的()

A、5 天

B、3 天

C、30 天

D、7 天

E、14 天

正确答案：E

36. 上消化道大出血伴休克时的首要护理措施为()

A、去枕平卧头偏一侧

B、按医嘱应用止血药

C、准备急救用品和药物

D、建立静脉输液途径

E、迅速配血备用

正确答案：D

37. 急性肺水肿患者应协助取()

A、端坐位

B、半卧位

C、左侧卧位

D、平卧位

正确答案：A

38. 张某, 男, 20 岁。急性肾小球肾炎病人, 经积极治疗后好转出院。护士需告知她在一定时间内仍应避免重体力活动, 该时间段是()

A、<3 个月

B、6-12 个月

C、1-2 年

D、1 个月

E、3-6 个月

正确答案：C

39. 血尿是指尿离心沉淀后镜检每高倍视野有多少个红细胞()

- A、1~2 个
- B、2 个
- C、3 个以上
- D、5 个
- E、10 个以上

正确答案：C

40. 手约束法是为了避免搔抓皮肤、防止引流管被拔出，使用五指不分开的手套将患者的双手固定的方法，主要用于()的患儿

- A、意识模糊
- B、自控能力与理解能力不够
- C、昏睡
- D、昏迷

正确答案：B

41. 吸氧时气道粘液干燥的预防措施是根据患者缺氧情况调节氧流量，小儿缺氧()L/min

- A、1-3
- B、4-6
- C、1~2
- D、2-3

正确答案：C

42. 郑某, 女, 82 岁。患有慢性支气管炎和支气管扩张症多年. 天凉后病情反复, 出现咳嗽、咳痰和咯血, 咯血量每天 500~ 600ml。此时病人适宜的饮食方案是()

- A、少量温凉流食
- B、禁水
- C、禁食
- D、少量温热软食
- E、温热流食

正确答案：C

43. 以下属于先天性心血管病的是()

- A、冠心病
- B、心血管神经症
- C、风湿性心脏病
- D、原发性高血压

E、法洛四联症

正确答案：E

44. 齐某, 男, 55 岁。因“肝炎后肝硬化、食管曲张静脉破裂出血”入院。给予加压素止血治疗。为了减轻静脉滴注加压素时可能出现的血压升高等不良反应, 可使用()

A、普萘洛尔

B、硝酸甘油

C、硝普钠

D、卡托普利

E、硝苯吡啶

正确答案：B

45. 预防管道脱落翻身时宜(), 将后路引流管置于患者背侧; 前路引流管及导尿管置于患者腹侧。

A、平稳

B、缓慢

C、紧凑

D、迅速

正确答案：B

46. 氧气雾化吸入法是利用()气流, 使药液形成雾状, 随吸气进入呼吸道的方法

A、持续低流量

B、持续高流量

C、高速氧气

D、低流量

正确答案：C

47. 患者发生过敏性休克后, 应立即皮下或肌肉注射()

A、0.1%异丙肾上腺素 0.5-1mg

B、0.01%肾上腺素 0.5-1mg

C、0.1%盐酸肾上腺素 0.5-1mg

D、0.01%肾上腺素 1.5mg

正确答案：C

48. 肠结核最好发于()

A、十二指肠

B、空肠

- C、乙状结肠
- D、升结肠
- E、回盲部

正确答案：E

49. 章某, 男, 55 岁。确诊“肝炎后肝硬化”8 年, 身体评估: 胸前蜘蛛痣(+), 肝掌(+). 病人出现蜘蛛痣、肝掌的机制是()

- A、门静脉高压
- B、侧支循环建立
- C、肝合成清蛋白减少
- D、体内醛固酮增多
- E、体内雌激素增多

正确答案：E

50. 股静脉在股动脉内侧约()处, 在进行股静脉采血时, 用消毒液消毒食指和中指, 于股三角区扪及股动脉, 并用手指加以固定

- A、0.6
- B、1
- C、1.5
- D、0.5

正确答案：D

51. 现场急救电击伤最首要的措施是

- A、切断电源
- B、胸外心脏按压
- C、包扎创面
- D、预防感染
- E、注射 TAT

正确答案：A

52. PICC 导管异位时在 X 线或 B 超机的引导下调整先将导管退回到正常血管中()A. 以 10ml 的注射器边推注生理盐水边送管, 送 5cm 时查看一下导管走行

- A、送管后以 10ml 的注射器推注生理盐水查看导管走行
- B、以 5ml 的注射器边推注生理盐水边送管, 送 10cm 时查看一下导管走行
- C、以 10ml 的注射器边推注生理盐水边送管, 送 10cm 时查看一下导管走行

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047162120023010003>