# 北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：影像科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|---|---|
| | |

1、单项选择题：皮肤粘膜淋巴结综合征最早出现的症状是(　)A．发热

B．皮肤粘膜病损

C．淋巴结肿大

D．心肌梗死

E．以上均是

2、单项选择题：泌尿道结石的 X 线表现，以下错误的是（　）。A.泌尿道结石大多数为不透 X 线或阳性结石

B.典型肾结石为鹿角形或珊瑚状

C.腹部侧位上肾结石靠后和脊柱重叠

D.输尿管结石为长圆形，其长轴和输尿管长轴一致

E.较小的膀胱结石须行膀胱造影诊断

3、单项选择题：以下哪项体征不符合法鲁三联症（　）。A.肺动脉瓣狭窄

B.室间隔缺损

C.肺动脉瓣环及瓣上狭窄

D.右室向心性肥厚

E.主动脉骑跨于室间隔

4、单项选择题：透视检查时，为减少病人和医师所受的辐射量，下述哪项措施不恰当（　）。A.充分暗适应

B.高千伏（80kV 或以上）低毫安（2mA 或以下）透视

C.尽量缩小光圈

D.间断开闭脚匣

E.缩短焦一皮距离

5、单项选择题：四肢长管状骨摄片时至少应包括（　）。A.邻近一个关节

B.邻近两个关节

C.不必包括关节

D.不必摄侧位片

E.对侧长骨

6、单项选择题：检测动脉导管未闭患者主动脉向肺动脉的分流血流，下述哪一种方法是错误的（　）。A.彩色多普勒血流显像

B.彩色多普勒血流显像加可通过左心的超声造影

C. 二维超声显像

D. 频谱多普勒的连续波多普勒

E. 以上都不是

7、单项选择题：下列哪项与腰椎正位标准片所见不符（　）。A. 第 1～第 5 腰椎，腰骶关节两侧骶髂关节对称显示

B. 第 3 腰椎位于照片正中，棘突序列位于椎体正中

C. 除 L3 各缘呈切线显示外，其余椎体均呈双边显示

D. 除腰椎结核外，腰椎正位片可不包括两侧腰大肌

E. 腰椎正位片包括两侧腰大肌

8、单项选择题：对盆腔炎性肿块鉴别诊断的描述，下列哪一项不正确（　）。A. 主要应与宫外孕、子宫内膜异位症鉴别

B. 卵巢内膜异位囊肿随月经周期变化

C. 宫外孕破裂时，常表现有急腹症

D. 与多囊卵巢难鉴别

E. 要注意与正常充液肠袢鉴别

9、单项选择题：男，23 岁，超声查体发现肾窦边缘肾锥体的乳头部，回声明显增强，后方声影不明显。最可能的诊断是（　）。A. 肾钙质沉淀症

B. 肾多发结石

C. 肾盏结石

D. 海绵肾

E. 钙乳症肾囊肿

10、单项选择题：卵巢子宫内膜异位囊肿描述不正确的是（　）。A. 又称卵巢巧克力囊肿

B. 50%以上累及双侧卵巢

C. 多有痛经，呈继发性渐进性，有逐渐加剧倾向

D. 声像图为圆形或不规则无回声区，壁厚欠光滑中等大小，其内为不均匀回声

E. 不随月经周期变化

11、单项选择题：以下哪项是描述典型胃平滑肌瘤的（　）。A. 多数位于浆膜层

B. 瘤体形态不规则

C. 瘤体极少位于粘膜下

D. 绝大多数瘤内见坏死及出血

E. 瘤体多为边缘光整的类圆形均匀低回声

12、单项选择题：婴幼儿的胸片上见沿两肺纹理分布的小三角形或斑点状致密影和泡性小透光区，首先应诊断为（　）。A. 化脓性肺炎

B. 支原体肺炎

C. 支气管肺炎

D. 病毒性肺炎

E. 过敏性肺炎

13、单项选择题：产生声影的可能性最小的是（　）。A. 骨质界面

B. 胆结石

C. 含气的肺

D. 手术钢夹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048034027015006063