

2024 年海南省乐东黎族自治县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库大全（必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是（）。

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 那格列奈
- D: 二甲双胍

答案：B

2. 高血压伴精神抑郁者不宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 尼莫地平
- C: 普萘洛尔
- D: 利血平

答案：D

3. 氢氯噻嗪的利尿作用机制是

- A: 抑制髓袢升支粗段的 Na
- B: 抑制远曲小管近端的 Na
- C: 抑制肾小管碳酸酐酶
- D: 对抗醛固酮的 K

答案：B

4. 青霉素 ()

- A: 对 G
- B: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- C: 特别对铜绿假单胞菌有效
- D: 对 G

答案：D

5. (2016 年真题) 痛风缓解期 (关节炎症控制后 1~2 周)，为控制血尿酸水平，应选用的药品是

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 布洛芬
- D: 泼尼松龙

答案：B

6. 作用机制是抗代谢的是

- A: 吉非替尼
- B: 紫杉醇
- C: 枸橼酸他莫昔芬
- D: 巯嘌呤

答案：D

7. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦
- C: 金刚烷胺
- D: 碘苷

答案：A

8. 下列钙通道阻滞剂中可用于治疗心律失常的是

- A: 硝苯地平
- B: 维拉帕米
- C: 拉西地平
- D: 左旋氨氯地平

答案：B

9. (2018 年真题) 患者, 女, 28 岁, 因 “多汗、心慌、消瘦、易怒半月余” 就诊, 实验室检查显示 FT4 和 FT3 均升高, TSH 降低, 甲状腺 I 度肿大, 心率 92 次/分, 诊断为 “甲状腺功能亢进症” 简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg, 一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg, 日 3 次。患者 1 月后复查, FT3 和 FT4 恢复正常, 但出现膝关节疼痛。

- A: 普萘洛尔致关节痛的不良反应
- B: 甲亢高代谢状态使血钙水平降低
- C: 甲亢高代谢状态致血钾水平降低
- D: 甲巯咪唑致关节痛的不良反应

答案：D

10. 作用机制为直接抑制破骨细胞的活性, 从而抑制骨盐溶解, 阻止钙由骨释出, 而骨骼对钙的摄取仍在进行, 因而可降低血钙; 可抑制肾小管对钙和磷的重吸收, 血钙也随之下降; 对肿瘤骨转移、骨质疏松所致骨痛有明显治疗效果, 该药物是

- A: 骨化三醇
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 降钙素
- D: 雷洛昔芬

答案：C

11. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 胰岛素
- B: 依替膦酸二钠
- C: 甲状腺素
- D: 糖皮质激素

答案：A

12. 在体内不易蓄积,适用于老年和肾功能不全患者的胰岛素促泌剂类降糖药是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 艾塞那肽

答案：B

13. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- B: 选择适宜的病期、疗程和监测
- C: 注意预防铁负荷过重
- D: 尽量选择三价铁

答案：D

14. 患者男,8 岁,静脉滴注美洛西林后立即出现胸气短、呼吸困难喉头水肿,考虑为青霉素类抗生素的过敏反应按照其发生机制,该患者发生的过敏反应在分型上属于 ()

- A: III型变态反应

- B: II 型变态反应
- C: I 型变态反应
- D: IV 型变态反应

答案：C

15. 属于第三代喹诺酮类药物的是

- A: 萘啶酸
- B: 吡哌酸
- C: 诺氟沙星
- D: 莫西沙星

答案：C

16. 不宜用于单纯性尿路感染初治病例的氨基糖苷类抗菌药物是

- A: 阿米卡星
- B: 利福平
- C: 万古霉素
- D: 盐酸克林霉素

答案：A

17. （2019 年真题）为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 二甲双胍
- B: 螺内酯
- C: 美司钠
- D: 氯化钾

答案：C

18. 利伐沙班的药理作用是

- A: 抑制血小板聚集
- B: 抑制游离凝血酶
- C: 抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶
- D: 阻止了 Xa 对凝血酶原的作用

答案：D

19. 呋塞米发挥利尿作用的部位在

- A: 近曲小管
- B: 髓袢升支粗段
- C: 髓袢升支厚壁段和远曲小管初段
- D: 肾小球

答案：B

20. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

- A: 多潘立酮
- B: 莫沙必利
- C: 西沙必利
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

21. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

- A: 西妥昔单抗
- B: 利妥昔单抗
- C: 曲妥珠单抗
- D: 贝伐单抗

答案：B

22. 下述保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 复方甘草酸苷
- C: 门冬氨酸钾镁
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

23. (2018 年真题) 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

- A: 骨髓抑制
- B: 痤疮样皮疹
- C: 血压升高
- D: 心肌损伤

答案：B

24. 易导致血糖异常的药品是

- A: 加替沙星
- B: 庆大霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 多西环素

答案：A

25. 抗血栓形成、保护动脉内皮的调血脂药是

- A: 普伐他汀
- B: 氟伐他汀
- C: 藻酸双酯钠
- D: 阿伐他汀

答案：C

26. 哺乳期妇女应用沙丁胺醇时，早产儿会出现

- A: 支气管痉挛
- B: 头痛
- C: 暂时性低血糖
- D: 耐药性

答案：C

27. 双膦酸盐类药物的作用机制不包括

- A: 抑制骨吸收性
- B: 增加小肠和肾小管对钙的重吸收
- C: 与骨基质理化结合，干扰骨吸收
- D: 直接改变破骨细胞的形态学

答案：B

28. 氯霉素抗菌谱广，而典型严重的不良反应是

- A: 二重感染
- B: 胃肠道反应
- C: 对造血系统的毒性
- D: 对肝脏严重损害

答案：C

29. 下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

- A: 维生素类
- B: 抗病毒药物
- C: 糖皮质激素
- D: 抗生素

答案：C

30. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

- A: 沙美特罗
- B: 多索茶碱
- C: 沙丁胺醇
- D: 布地奈德

答案：A

31. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 地高辛
- C: 卡托普利
- D: 哌唑嗪

答案：C

32. 以下激素的关系错误的是

- A: 促皮质素促进糖皮质激素的分泌
- B: 促皮质素释放激素促进促皮质素的分泌
- C: 糖皮质激素促进促皮质素释放激素的分泌
- D: 糖皮质激素抑制促皮质素的分泌

答案：C

33. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 度他雄胺
- B: 非那雄胺
- C: 普适泰
- D: 依立雄胺

答案：C

34. 每 1mg 硫酸鱼精蛋白可中和肝素约

- A: 100U
- B: 1000U
- C: 1U
- D: 10U

答案：A

35. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 来曲唑
- C: 顺铂
- D: 紫杉醇

答案：A

36. 下列说法中错误的是

- A: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- B: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者
- C: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑
- D: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

答案：B

37. 服用二甲双胍期间应注意()

- A: 初始治疗可大剂量给药
- B: 无需控制饮食
- C: 肝功能不全患者无需调整剂量
- D: 服药期间不可饮酒

答案：D

38. 需要 1 周才起效的是

- A: 氟西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 文拉法辛
- D: 吡拉西坦

答案：C

39. 可引起下肢水肿的抗高血压药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 普萘洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 硝苯地平

答案：D

40. (2019 年真题) 因易导致新生儿溶血，妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是 ()

- A: 甲硝唑
- B: 庆大霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 苄星青霉素

答案：C

41. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是 ()

- A: 人表皮生长因子受体-2
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

C: 表皮生长因子受体

D: 血管内皮生长因子

答案：A

42. 阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

A: 帕洛诺司琼

B: 甲氧氯普胺

C: 氯丙嗪

D: 劳拉西泮

答案：C

43. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断药的是()

A: 阿利克仑

B: 坎地沙坦

C: 地尔硫

D: 左旋氨氯地平

答案：B

44. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是()。

A: CYP286

B: CYP2D6

C: CYP2E1

D: CYP2C19

答案：D

45. 静脉注射可出现舌头麻木()

- A: 四环素
- B: 氯霉素
- C: 多西环素
- D: 链霉素

答案：C

46. 可选择性抑制 MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 司来吉兰
- C: 苯海索
- D: 恩他卡朋

答案：B

47. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

- A: 哌拉西林
- B: 庆大霉素
- C: 氯霉素
- D: 林可霉素

答案：A

48. 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

- A: 奎宁
- B: 青蒿素
- C: 伯氨喹
- D: 乙胺嘧啶

答案：D

49. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：B

50. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

- A: 5 μg / kg
- B: 4 μg / kg
- C: 25 μg
- D: 6 μg / kg

答案：C

51. 下列药动学/药效学 (PK/PD) 参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

- A: 血浆药物半衰期 ($t_{1/2}$)
- B: 血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值 ($C_{\text{max}}/\text{MIC}$)
- C: 血浆药物峰浓度与达峰时间比值 ($C_{\text{max}}/T_{\text{max}}$)
- D: 血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值 ($\text{AUC}/T_{\text{max}}$)

答案：B

52. 肥胖型 2 型糖尿病患者首选的降血糖药 ()

- A: 胰岛素皮下注射
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 可促进周围组织细胞 (肌肉等) 对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

D: 抑制葡萄糖苷酶

答案：C

53. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

A: 应用化疗药后 24h 内发生

B: 应用化疗药后的 24~48h 内发生

C: 应用化疗药后的 72h 后发生

D: 应用化疗药后的 48~72h 内发生

答案：A

54. 关于美罗培南使用的叙述，正确的是

A: 一天一次给药

B: 所致肾功能损害和恶心、呕吐等胃肠道反应较亚胺培南少

C: 肝功能不全患者应用需调整剂量

D: 癫痫等中枢神经系统不良反应发生率与亚胺培南相似

答案：B

55. 氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

A: 黏液屏障

B: 血睾屏障

C: 血脑屏障

D: 胎盘屏障

答案：D

56. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

A: 氯化钠

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钾

D: 氯化钙

答案：C

57. 下列不属于胃肠解痉药的是

A: 颠茄

B: 阿托品

C: 山莨菪碱

D: 多潘立酮

答案：D

58. 强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

A: 房颤

B: 房性期前收缩

C: 室性期前收缩

D: 二联律

答案：C

59. 抑酸剂西咪替丁可引起的典型不良反应是

A: 定向力障碍

B: 血糖升高

C: 低镁血症

D: 血尿酸升高

答案：A

60. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 热带念珠菌
- B: 克柔念珠菌
- C: 新型隐球菌
- D: 白色念珠菌

答案：B

61. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

答案：D

62. 治疗重型幼年型糖尿病的是

- A: 二甲双胍
- B: A 和 B 均无效
- C: 磺酰脲类
- D: 胰岛素

答案：D

63. 早产儿、新生儿出血宜选用()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 叶酸

B: 尿酸酶

C: 肝素

D: 维生素 K

答案：D

64. 适用于肠道菌群失调引起腹泻的药物是

A: 酪酸菌

B: 乳酶生

C: 乳酸菌

D: 双歧三联活菌胶囊

答案：D

65. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A: 氯喹

B: 喹碘方

C: 替硝唑

D: 依米丁

答案：A

66. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

A: 氯化钠

B: 氯化钾

C: 枸橼酸钾

D: 氯化钙

答案：D

67. (2016 年真题) 鱼精蛋白可用于救治

A: 肝素过量导致的出血

B: 华法林过量导致的出血

C: 吗啡过量导致的呼吸抵制

D: 异烟肼中毒导致的神经毒性

答案: A

68. 皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是()

A: 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯

B: 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦

C: 18 岁以下儿童禁用林旦

D: 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯

答案: C

69. 为强心苷中极性最低，且口服可完全吸收的药物是()

A: 毛花苷丙

B: 去乙酰毛花苷丙

C: 洋地黄毒苷

D: 地高辛

答案: C

70. 适宜餐前整片(粒)吞服，不可咀嚼或压碎的抑酸剂是()。

A: 泮托拉唑

B: 乳酸菌素

C: 雷尼替丁

D: 前列地尔

答案: A

71. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A: 阿莫西林

B: 四环素类

C: 噻嗪类利尿剂

D: 氧化镁

答案: C

72. 关于万古霉素，描述错误的是

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 属于杀菌剂

C: 肾功能不全者无需调整剂量

D: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

答案: C

73. 可用于急、慢性肾功能不全患者的肠外营养支持的氨基酸是()

A: 复方氨基酸注射液(9AA)

B: 复方氨基酸注射液(3AA)

C: 复方氨基酸注射液(18AA)

D: 精氨酸注射液

答案: A

74. 头孢曲松

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B: 肾毒性较大

C: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案: A

75. 抑制二氢叶酸还原酶的药物是()

A: 磺胺嘧啶

B: 庆大霉素

C: 克拉霉素

D: 甲氧苄啶

答案: D

76. 下列哪种头孢菌素为口服剂型

A: 头孢吡肟

B: 头孢哌酮

C: 头孢克洛

D: 头孢替安

答案: C

77. (2019 年真题) 推荐与吸入性糖皮质激素联合使用，尤其适合于中、重度持续哮喘患者长期治疗的药物是 ()

A: 白三烯受体阻断剂

B: 长效 β_2 受体激动剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: M 胆碱受体阻断剂

答案: B

78. 直接影响 DNA 结构和功能的药物是 ()

A: 多柔比星

B: 顺铂

C: 高三尖杉酯碱

D: 氟尿嘧啶

答案: B

79. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 吲哚美辛
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 塞来昔布
- D: 阿司匹林

答案：D

80. 属于电解质补充药,可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是()

- A: 异甘草酸镁
- B: 双环醇
- C: 多烯磷脂酰胆
- D: 门冬氨酸钾镁

答案：D

81. (2021 年真题) 属于烷化剂, 能破坏 DNA 的抗肿瘤药物是 ()

- A: 长春新碱
- B: 来曲唑
- C: 厄洛替尼
- D: 环磷酰胺

答案：D

82. 给药后易产生抗体, 5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降, 1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 阿替普酶
- B: 瑞替普酶
- C: 尿激酶
- D: 链激酶

答案：D

83. 可用于习惯性流产的药品是()

- A: 他莫昔芬
- B: 依普黄酮
- C: 戊酸雌二醇
- D: 地屈孕酮

答案: D

84. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢氨苄
- D: 头孢拉定

答案: A

85. (2015 年真题) 治疗侵袭性念珠菌病首选 ()。

- A: 灰黄霉素
- B: 氟康唑
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案: B

86. 糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

- A: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- C: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- D: 提高中枢神经系统的兴奋性

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/048034141044007022>