

住院医师规范化培训《神经外科》（题库）预测试卷二

[单选题]1. 与脊柱裂、脊膜膨出相比，颅裂具有哪（江南博哥）种特点？（）

- A. 发生率少于脊柱裂、脊膜膨出
- B. 两者多合并发生
- C. 不会同时发生
- D. 治疗难度较大
- E. 预后较差

[单选题]2. 脑脓肿完全形成包膜一般需要（）。

- A. 8~16 周
- B. 2~4 周
- C. 4~8 周
- D. 1~2 周
- E. 16~32 周

[单选题]3. 脑囊虫病是通过哪种途径感染的？（）

- A. 外在自身感染
- B. 内在自身感染
- C. 外来感染
- D. 呼吸感染
- E. 内在自身感染，外在自身感染及外来感染

[单选题]4. 帕金森病的症状不包括下列哪项？（）

- A. 震颤
- B. 抽搐
- C. 僵直
- D. 运动缓慢
- E. 姿态不稳

[单选题]5. 癫痫中应用 PET（正电子发射计算机体层显像）检查的重要目的是（）。

- A. 鉴别癫痫发作与假性癫痫
- B. 癫痫发作形式分类
- C. 治疗癫痫
- D. 指导药物的选择应用
- E. 癫痫病灶定位

[单选题]6. 抢救枕骨大孔疝（脑室系统扩大者）最有效的急救措施是（）。

- A. 20%甘露醇 250ml 快速静滴
- B. 尽快行去骨瓣减压术
- C. 快速颅钻钻孔穿刺脑室额角行脑脊液外引流术
- D. 快速静滴地塞米松 20mg
- E. 气管切开保持呼吸道通畅

[单选题]7. 已出现两慢一高的严重颅内血肿患者，当开颅手术时过快地释放颅内血肿，可导致()。

- A. 血压升高
- B. 血压骤降
- C. 呼吸骤停
- D. 心跳骤停
- E. 体温骤降

[单选题]8. 惊厥性全身性癫痫持续状态静脉注射苯妥英钠时，每 1~2 分钟注射速度最多不应大于()。

- A. 10mg
- B. 20mg
- C. 50mg
- D. 70mg
- E. 200mg

[单选题]9. 颅中窝骨折可出现()。

- A. 鼻流血
- B. 双眼睑皮下青紫，逐渐加重，出现“熊猫眼”征
- C. 乳突下淤血斑，出现 Battle 征
- D. 脑脊液耳漏
- E. 颞部头皮肿胀淤血

[单选题]10. 有关硬膜下血肿，下列哪项描述不恰当？()

- A. 急性硬膜下血肿是脑挫裂伤皮质小动脉破裂出血引起
- B. 亚急性硬膜下血肿的时间是指伤后 3 天~1 周
- C. 慢性硬膜下血肿常见出血血管是桥静脉
- D. 慢性硬膜下血肿癫痫发生率可达 40%
- E. 慢性硬膜下血肿首选钻孔引流术

[单选题]11. 慢性硬膜下血肿最常见的出血来源为()。

- A. 导静脉
- B. 桥静脉
- C. 静脉窦
- D. 板障静脉
- E. 硬脑膜中动脉

[单选题]12. 患者，男性，40 岁。2 年前出现右胸背部疼痛，1 年半前右下肢无力，左下肢痛温觉迟钝，近 6 个月双下肢无力，上楼困难，排尿困难和便秘 3 个月，不能行走 1 个月。查体：双上肢正常。双下肢肌力 2 级。肌张力增高，膝反射亢进，双侧巴宾斯基征(+)， $T_7 \sim T_8$ 以下痛觉、温度觉、音叉震动觉减退。最可能的诊断是()。

- A. 脊髓炎

- B. 脊髓蛛网膜炎
- C. 脊髓空洞症
- D. 髓外硬膜内肿瘤
- E. 脊髓内肿瘤

[单选题]13. 下面哪一项肯定不是颅咽管瘤鉴别诊断疾病？()

- A. 垂体腺瘤
- B. 鞍结节脑膜瘤
- C. 鞍部异位松果体瘤
- D. 鞍部上皮样囊肿
- E. 三叉神经鞘瘤

[单选题]14. 患者，女，38岁。洗衣时突发右侧肢体活动不灵。查体：意识清，失语，二尖瓣区可闻双期杂音，心房纤颤，右侧偏瘫，上肢重于下肢，右偏身痛觉减退。最可能的诊断是()。

- A. 脑血栓形成
- B. 脑栓塞
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性脑缺血发作

[单选题]15. 脑动静脉畸形最常见的症状是()。

- A. 癫痫
- B. 头晕
- C. 偏瘫
- D. 出血
- E. 精神障碍

[单选题]16. 下列关于寰枕部畸形的说法中，不正确的是()。

- A. 即枕骨大孔区畸形，指枕骨底部及第一、二颈椎先天发育异常
- B. 分为扁平颅底、颅底陷入、寰枕融合、颈椎分节不全、寰枢脱位和小脑扁桃体下疝畸形
- C. 各畸形可单独或几种同时发生
- D. 出生后在颅底部形成的各种畸形
- E. 部分畸形为后天因素发病

[单选题]17. 诊断扁平颅底主要测量()。

- A. 钱氏线
- B. Fishgold 线
- C. Bull 角
- D. Boogard 角
- E. 基底角

[单选题]18. 目前临床疗效研究证据的最好来源是()。

- A. Cochrane 图书馆
- B. 评价与传播中心数据库
- C. 循证医学评价数据库
- D. 循证医学杂志
- E. 临床证据

[单选题]19. Systematic review 代表()。

- A. 传统综述
- B. 病例综述
- C. 系统评价
- D. 病例对照研究
- E. 研究证据

[单选题]20. 循证医学的关键是()。

- A. 丰富的临床经验
- B. 研究证据及其质量评价
- C. 文献检索方法
- D. 专家意见分析
- E. 收集资料全面

[单选题]21. 根据《医疗事故处理条例》的规定，在医疗纠纷发生后，患者可以要求封存，但不得复印的病历资料是()。

- A. 会诊记录
- B. 门诊病历
- C. 手术及麻醉记录单
- D. 病理报告单
- E. 化验单

[单选题]22. 卫生法的执法范围不包括()。

- A. 行政许可
- B. 行政处罚
- C. 刑事处罚
- D. 行政强制
- E. 行政复议

[单选题]23. 某孕妇在家里分娩一死胎，为向生育管理部门申请新的生育指标，其家属要求卫生院出具死亡证明文件，乡卫生院拒绝出具，理由是()。

- A. 产妇本人没有提出申请
- B. 产妇户口不在卫生院所在地
- C. 需向卫生部门报告
- D. 未经医护人员亲自接产
- E. 未接公安部门通知

[单选题]24. 下列说法符合人类辅助生殖技术伦理要求的是()。

- A. 社会名人负有捐赠其精/卵子的法律义务
- B. 医疗机构不得保留人工受孕妇女的病历资料
- C. 医疗机构不得向未婚大龄妇女提供助孕技术
- D. 实施人工授精时，精子库必须保证提供新鲜精液
- E. 我国大陆已婚女性，若其丈夫同意可提供无偿代孕服务

[单选题]25. 医学伦理学的研究对象是()。

- A. 医学道德难题
- B. 医德基本理论
- C. 医学道德现象
- D. 医德基本实践
- E. 医德基本规范

[单选题]26. 《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》中规定的伦理审查内容不包括()。

- A. 研究者的资格、经验是否符合试验要求
- B. 研究方案是否符合科学性和伦理原则的要求
- C. 对受试者的资料是否采取了保密措施
- D. 研究设计是否遵守随机对照原则
- E. 受试者是否因参加研究而获得合理补偿

[单选题]27. 《医疗事故处理条例》规定，医患双方不能确定患者死因或对死因有异议时，应在患者死亡后多长时间进行尸检？具备尸体冻存条件的，可以延长至几日？()

- A. 24 小时、7 日
- B. 48 小时、7 日
- C. 48 小时、5 日
- D. 48 小时、3 日
- E. 72 小时、4 日

[单选题]28. 伴有突眼的毒性甲状腺肿的患者，术后突眼的情况可能()。

- A. 退回到接近正常
- B. 保持不变
- C. 发展缓慢
- D. 迅速发展至角膜溃疡或失明
- E. 上述的任何一种

[单选题]29. 治疗甲状腺未分化癌采用()。

- A. 激素治疗
- B. 甲状腺局部切除
- C. 患侧甲状腺及峡部全切加对侧次全切除术
- D. 放射治疗
- E. 双侧甲状腺全切除术+放射性碘治疗

[单选题]30. 下列关于乳腺癌的叙述，哪项不恰当？()

- A. 锁骨下淋巴结转移属远处转移
- B. 原位癌患者可以不行腋窝淋巴结清扫
- C. 雌、孕激素受体阳性的病例内分泌治疗效果好
- D. 乳腺癌保乳术后应接受放疗
- E. Paget 病恶性程度较低

[单选题]31. 有关血栓闭塞性脉管炎的说法，下列恰当的是()。

- A. 患者多数为男性，好发于青壮
- B. 主要侵袭四肢，尤其是下肢的中、小动、静脉，以动脉为主
- C. 是一种累及血管的炎症和慢性闭塞性疾病
- D. 又称 Buerger 病
- E. 以上都对

[单选题]32. 下肢静脉曲张患者深静脉功能试验阳性应采取()。

- A. 弹性绷带包扎
- B. 局部注射硬化溶液
- C. 大隐静脉高位结扎术
- D. 大隐静脉高位结扎加静脉整段，分段剥脱切除术
- E. 以上都不对

[单选题]33. 术中鉴别直疝与斜疝主要依靠()。

- A. 精索与疝囊的关系
- B. 疝囊颈与腹壁下动脉的关系
- C. 疝块与内环的关系
- D. 疝块是否进入阴囊
- E. 是否产生嵌顿

[单选题]34. 空腔脏器损伤时，下列哪项是错误的？()

- A. 可有腹膜炎
- B. 腹腔穿刺抽出物可为胃肠内容物或胆汁
- C. 可有膈下游离气体
- D. 小肠损伤机会最多
- E. 十二指肠球部损伤时，腹膜炎可不明显

[单选题]35. 患者男，25 岁，2 小时前被刀扎伤左季肋部，感左上腹疼痛，入院后查血压 16.0/9.0kPa，脉搏 86 次/min，腹腔穿刺未抽出不凝血，腹部 B 超示脾周少量积液，此时应采用哪种治疗措施？()

- A. 非手术治疗，观察血压脉搏变化
- B. 立即剖腹探查
- C. 行脾切除术
- D. 脾动脉结扎术
- E. 脾修补术

[单选题]36. 患儿男，8岁，突发剑突下阵发性剧烈绞痛5小时。每次腹痛发作时辗转哭闹，伴恶心、呕吐，间歇期一切如常。体检：体温正常，无黄疸，腹部无肿物，血象正常。该患者最可能的诊断是()。

- A. 先天性胆管扩张症
- B. 胆道蛔虫病
- C. 肠套叠
- D. 肝外胆管结石
- E. 急性胃炎

[单选题]37. 患者，男，64岁。突发上腹痛3小时，持续性，由上腹扩展到全腹，伴恶心、呕吐。查体：P110次/min，BP138/98mmHg。呼吸浅快，腹胀，腹肌紧张，压缩和反跳痛阳性。肝浊音界消失，肠鸣音消失。下列术前处理措施中最重要的是()。

- A. 补液
- B. 胃肠减压
- C. 应用抗生素
- D. 半卧位
- E. 吸氧

[单选题]38. 患者男，51岁，上腹部隐痛不适1年，近2个月来加剧；入院查体腹平坦，上腹有轻压痛，未触及肿物，大便潜血试验(+)，上消化道造影检查显示胃窦部小弯侧黏膜纹理紊乱，胃壁僵硬，未见明显充盈缺损。该患者首先应考虑()。

- A. 慢性胃窦炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃黏膜脱垂
- E. 萎缩性胃炎

[单选题]39. 胃、十二指肠溃疡出血的主要症状、体征是()。

- A. 上腹部可有明显压痛
- B. 上腹部疼痛加剧
- C. 肠鸣音减少或消失
- D. 移动性浊音阳性
- E. 黑便或呕血

[单选题]40. 患者女，50岁，右下腹隐痛1个月余。查体：右下腹可扪及一可移动性肿块，钡灌肠示盲肠肠腔内充盈缺损，Hb85g/L，大便隐血试验(++)。最可能的诊断为()。

- A. 结肠癌
- B. 结肠巨大息肉
- C. 克罗恩病

D. 回盲部结核（增殖型）

E. 阑尾囊肿

[单选题]41. 下列哪项是诊断急性阑尾炎最有意义的体征？（）

A. 右下腹固定压痛

B. 闭孔内肌试验

C. 腰大肌试验

D. 结肠充气试验

E. 肛门指检

[单选题]42. 患者大便变细，便意频繁，首先应行下列哪项检查？（）

A. 直肠指检

B. 粪便培养加药物敏感试验

C. X 线钡剂灌肠检查

D. 纤维结肠镜检查

E. 乙状结肠镜检查

[单选题]43. 继发性腹膜炎有休克表现，应首选哪种治疗方法？（）

A. 积极抗休克，如休克不能纠正，不考虑手术

B. 积极抗休克，如休克纠正，则用非手术治疗

C. 积极抗休克的同时进行手术

D. 立即手术

E. 积极抗休克，如休克不能纠正，应延缓手术

[单选题]44. 下列哪项是原发性肝癌肝内播散的最主要途径？（）

A. 经肝动脉

B. 经肝静脉

C. 经淋巴管

D. 经门静脉

E. 直接侵犯

[单选题]45. 患者男，48 岁，门静脉高压大出血，急诊行脾切除、贲门周围血管离断术，术后 2 天再次呕血，三腔管压迫和药物治疗后出血停止，停药后又有呕血，且患者有嗜睡，轻度黄疸。为控制出血，进一步处理应该是（）。

A. 内镜下硬化剂注射或套扎治疗

B. 脾肾静脉分流术

C. 限制性门-腔分流术

D. 肠系膜上静脉-下腔静脉分流术

E. 血管造影加栓塞术

[单选题]46. 下列哪项是门静脉高压症食管下段胃底曲张静脉破裂的诱因？（）

A. 进食坚硬粗糙食物

B. 胃酸反流

C. 剧烈咳嗽、呕吐

D. 用力排便

E. 以上均是

[单选题]47. 胆囊穿孔多见于胆囊颈部，其原因是()。

A. 局部血供差

B. 该部位张力低

C. 该部位肌肉运动差

D. 该部位黏膜抵抗力弱

E. 该部位结石易嵌顿

[单选题]48. 急性胰腺炎在我国最常见的诱因是()。

A. 胆道梗阻，胆汁反流

B. 饮食因素

C. 精神因素

D. 感染

E. 创伤

[单选题]49. 并发大出血的胃、十二指肠溃疡所在部位一般见于()。

A. 幽门或十二指肠球部前壁

B. 胃小弯或十二指肠球部后壁

C. 胃大弯或十二指肠球部外侧壁

D. 胃底部或十二指肠球部后壁

E. 贲门部或十二指肠球部前壁

[单选题]50. 心肺脑复苏时最常用最有效的药物是()。

A. 利多卡因

B. 肾上腺素

C. 胺碘酮

D. 阿托品

E. 碳酸氢钠

[单选题]51. 解除呼吸道梗阻的方法包括()。

A. 口咽通气道

B. 提颏

C. 气管内插管

D. 上抬下颌

E. 以上全是

[单选题]52. 股动脉穿刺的最佳穿刺点是()。

A. 腹股沟韧带上方 1~2cm 处

B. 腹股沟韧带下方 1~2cm 处

C. 腹股沟韧带中外 1/3 处

D. 腹股沟韧带上方 4~5cm 处

E. 腹股沟韧带中内 1/3 处

[单选题]53. 手术区皮肤的消毒范围，应包括切口周围()。

- A. 10cm
- B. 15cm
- C. 20cm
- D. 25cm
- E. 30cm

[单选题]54. 临床发现乳头溢液而未可触及肿物时应选择以上哪种检查？()

- A. 乳腺钼靶
- B. 乳腺B超
- C. 乳腺红外热图
- D. 乳腺针吸细胞学检查
- E. 乳头溢液涂片

[单选题]55. 小腿中下段火器伤初期处理时不正确的措施是()。

- A. 要做全身检查
- B. 使用破伤风抗毒素血清
- C. 清创后缝合伤口
- D. 输血补液
- E. 给予有效的抗生素

[单选题]56. 下列关于体表肿物切除的术前准备，哪一项是正确的？()

- A. 术前沟通，让患者了解手术目的
- B. 签署知情同意书
- C. 测量生命体征，评估全身状况
- D. 手术器械准备
- E. 以上都需要

[单选题]57. 肘关节骨折脱位可能并发()。

- A. 损伤性骨化
- B. 缺血性骨坏死
- C. 缺血性肌挛缩
- D. 动静脉损伤
- E. 周围神经损伤

[单选题]58. 患者女，45岁，左胫腓骨下1/3开放性骨折，行清创缝合石膏固定治疗，3个月后局部仍有压痛，X线显示骨折线尚存在，有少量外骨痂，骨折对位良好，下列哪项是导致骨折延迟愈合或不愈合的主要因素()。

- A. 年龄大
- B. 开放性骨折
- C. 骨折部血液供应差
- D. 软组织损伤
- E. 石膏固定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048075103053006033>