



山东省卫生事业单位招聘考试（医学基础知识）历年真题试卷汇编 3  
(总分 200, 做题时间 90 分钟)

1. 单项选择题

1.

胸骨角两侧平对( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 第 5 肋
- B 第 4 肋
- C 第 3 肋
- D 第 2 肋
- E 第 1 肋

2.

休克时正确的补液原则是( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 补液“宁多勿少”
- B “需多少，补多少”
- C 补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D “失多少，补多少”
- E 如血压正常不必补液

3.

DIC 产生的贫血属( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 溶血性贫血
- B 缺铁性贫血
- C 中毒性贫血
- D 失血性贫血
- E 再生障碍性贫血

4.

一般在服毒后几小时内洗胃抢救最有效?( )

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 48 小时
- B 24 小时内
- C 12 小时内
- D 8 小时内
- E 4~6 小时内

5.

肉瘤是由( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 神经组织来源的恶性肿瘤
- B 间叶组织来源的良性肿瘤
- C 间叶组织来源的恶性肿瘤
- D 上皮组织来源的良性肿瘤
- E 上皮组织来源的恶性肿瘤

6.

诊断消化性溃疡最可靠的方法是（ ）。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 根据临床症状
- B 测胃酸
- C 钡餐
- D 胃镜
- E 大便隐血试验

7.

降压反射的生理意义主要是（ ）。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 降低动脉血压
- B 升高动脉血压
- C 增强心血管活动
- D 减弱心血管活动
- E 维持动脉血压相对恒定

8.

阿托品的禁忌证是（ ）。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 感染性休克
- B 胃肠绞痛
- C 前列腺肥大
- D 胆绞痛
- E 心动过缓

9.

门静脉由（ ）。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成
- B 肠系膜下静脉和脾静脉汇合而成
- C 脾静脉和胃左静脉汇合而成
- D 脾静脉和胃右静脉汇合而成

E 肠系膜上静脉和胃左静脉汇合而成

10.

有关基础代谢的描述，错误的是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 与正常平均值相差 $\pm$ (10%~15%)属于正常

B 临床用相对值表示

C 反映人体最低的能量代谢水平

D 儿童高于成人

E 在基础状态下测定

11.

抗利尿激素的作用主要是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 保钠、排钾、保水

B 促进近曲小管对水的重吸收

C 提高内髓部集合管对尿素的通透性

D 增强髓袢升支粗段对 NaCl 的主动重吸收

E 促进远曲小管、集合管对水的重吸收

12.

毛果芸香碱临床上常用于治疗( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 心动过缓

B 青光眼

C 重症肌无力

D 尿潴留

E 腹气胀

13.

吸气性呼吸困难时，下列哪项叙述不正确?( )

SSS\_SINGLE\_SEL

A 吸气费力

B 呼气时伴有哮鸣音

C 常伴有干咳

D 高调吸气性喉鸣

E 重者出现吸气时“三凹征”

14.

清创术下列操作哪项是错误的?( )

SSS\_SINGLE\_SEL

A 伤口周围油污应用松节油擦去

- B 伤口周围皮肤用碘酒、酒精消毒
- C 切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织
- D 深部伤口不宜再扩大
- E 用无菌生理盐水或双氧水冲洗伤口

15.

女性骨盆的特点是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 骨盆上口近似心形
- B 骨盆下口较狭小
- C 骨盆腔呈漏斗形
- D 耻骨下角为  $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$
- E 以上描述均不对

16.

下列反射中,属于条件反射的是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 排尿反射
- B 食物刺激口腔黏膜引起唾液分泌
- C 膝跳反射
- D 望梅止渴
- E 减压反射

17.

头痛进行性加重并有颅内压增高见于( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 颈椎病
- B 脑震荡
- C 脑肿瘤
- D 神经官能症
- E 以上均不对

18.

柏油样大便表示上消化道出血量超过( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 30ml
- B 60ml
- C 100ml
- D 300ml
- E 500ml

19.

不属于肝门的结构是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 肝固有动脉
- B 肝静脉
- C 肝门静脉
- D 肝左管
- E 肝右管

20.

胆固醇在体内不能转变生成的是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 维生素 D<sub>3</sub>
- B 胆汁酸
- C 胆色素
- D 雌二醇
- E 睾丸酮

21.

组织兴奋后处于绝对不应期时，其兴奋性为( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 无限大
- B 大于正常
- C 等于正常
- D 小于正常
- E 零

22.

下列关于隐匿性肾小球肾炎的叙述，错误的是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 可无蛋白尿
- B 可无血尿
- C 无高血压
- D 无水肿
- E 肾病理肾小球无异常

23.

急性持续性腹痛阵发性加剧伴休克，最可能的疾病是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 急性阑尾炎
- B 绞窄性肠梗阻

C 泌尿系结石，肾绞痛

D 外伤性肝破裂

E 急性单纯性肠梗阻

24.

肾细胞癌最常见的病理组织学类型是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 乳头状癌

B 透明细胞癌

C 嫌色细胞癌

D 集合管癌

E 未分化癌

25.

声波传入内耳最主要的途径是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 颅骨→颞骨中耳蜗内淋巴

B 外耳道→鼓膜→听骨链→卵圆窗膜→耳蜗

C 外耳道→鼓膜→听骨链→圆窗膜→耳蜗

D 外耳道→鼓膜→鼓室空气→圆窗膜→耳蜗

E 外耳道→鼓膜→颞骨中耳蜗内淋巴

26.

体内运转一碳单位的载体是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 叶酸

B 生物素

C

维生素 B

D 四氢叶酸<sup>12</sup>

E S-腺苷蛋氨酸

27.

引起原发性颗粒性固缩肾的最主要病变是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

A 部分肾小球纤维化

B 肾间质纤维组织增生

C 肾间质淋巴细胞浸润

D 入球小动脉玻璃样变性

E 部分肾小球代偿性肥大

28.

利多卡因用于局部浸润麻醉或神经阻滞时，成人一次限量为( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 100mg
- B 200mg
- C 300mg
- D 400mg
- E 500mg

29.

下列选项中，能有效刺激促红细胞生成素血浆含量增加的是 ( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 缺O<sub>2</sub>
- B CO<sub>2</sub>潴留
- C 雌激素
- D 肾疾患
- E 再生障碍性贫血

30.

脂褐素大量增加最常见于 ( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 细胞萎缩
- B 细胞坏死
- C 细胞凋亡
- D 细胞水样变性
- E 细胞玻璃样变性

31.

最早经兔脑传代制成的减毒活疫苗是 ( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 脊髓灰质炎活疫苗
- B 麻疹疫苗
- C 流感疫苗
- D 狂犬病疫苗
- E 卡介苗

32.

患者进行器官移植时可能提供最佳 HLA 配型的人群是 ( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 患者父母

- B 患者妻子
- C 患者子女
- D 患者同胞兄弟姐妹
- E 患者的表兄弟姐妹

33.

血液白细胞中数量最多的是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 单核细胞
- B 中性粒细胞
- C 嗜碱性粒细胞
- D 嗜酸性粒细胞
- E T 淋巴细胞

34.

下列器官对缺氧的耐受性由强到弱依次为( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 脑、肝、肾
- B 肾、肝、脑
- C 肝、脑、肾
- D 肝、肾、脑
- E 肾、脑、肝

35.

血管壁玻璃样变性多见于( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 大动脉
- B 中动脉
- C 细动脉
- D 大静脉
- E 小静脉

36.

心肌梗死时的附壁血栓属于( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 透明血栓
- B 白色血栓
- C 混合性血栓
- D 红色血栓
- E 延续性血栓

37.



慢性浅表性胃炎的主要病变特点是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 胃黏膜变薄
- B 胃黏膜水肿
- C 可见黏膜下血管
- D 淋巴细胞、浆细胞浸润胃黏膜浅层
- E 胃黏膜糜烂

38.

氯化钾静滴浓度不得超过( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 0.1%
- B 0.3%
- C 0.6%
- D 0.9%
- E 1.2%

39.

最适于进行输卵管结扎术的时间是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 月经来潮前 3~4 天
- B 足月产后 4 天
- C 难产后 72 天
- D 人流后 3 天
- E 月经后 3~4 天

40.

羊水过少是指妊娠晚期羊水量少于( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 500ml
- B 400ml
- C 300ml
- D 200ml
- E 100ml

41.

早期妊娠的确诊依据是( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 停经史
- B 早孕反应
- C 尿妊娠试验

- D 黑加征
- E B 型超声检查

42.

试验研究中，对照组与实验组发病率之比为( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 有效率
- B 治愈率
- C 生存率
- D 保护率
- E 效果指数

43.

下列治疗消化性溃疡的药物中，抑酸最强、疗效最佳的是 ( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 西咪替丁
- B 阿托品
- C 硫糖铝
- D 奥美拉唑
- E 胶体次枸橼酸铋

44.

我国法定传染病中，甲类传染病包括 ( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 天花和鼠疫
- B 狂犬病和天花
- C 霍乱和副霍乱
- D 鼠疫和霍乱
- E 艾滋病和霍乱

45.

急性胰腺炎假性囊肿形成的时间一般是病后 ( )。

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 3~4 小时
- B 24 小时
- C 3~4 天
- D 3~4 周
- E 3~4 个月

46.

根据记忆的内容，记忆可分为四种，以下哪项不是 ?( )

SSS\_SINGLE\_SEL

- A 感觉记忆
- B 情绪记忆
- C 逻辑记忆
- D 形象记忆
- E 运动记忆

47.

检查发现患者胸廓的前后径等于横径，肋间隙增宽，应考虑( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 扁平胸
- B 鸡胸
- C 正常胸廓
- D 漏斗胸
- E 桶状胸

48.

胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 穿刺损伤肺组织
- B 抽液过多、过快，胸内压突然下降
- C 胸膜过敏反应
- D 穿刺损伤肺血管
- E 空气栓塞

49.

骨盆骨折最危险的并发症是( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 骨盆腔出血
- B 膀胱破裂
- C 尿道断裂
- D 骶丛神经损伤
- E 直肠损伤

50.

区别腹部肿块来自腹腔或腹壁，最简易的检查方法是( )。

	SSS_SINGLE_SEL
--	----------------

- A 超声检查
- B 钡餐检查
- C 腹部体格检查
- D 腹部 X 线检查
- E 胃肠镜检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/055034340141011131>