

2024 贵州省施秉县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库附参考答案（能力提升）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 第二类精神药品每张处方不超过几日常用量

- A: 4 日
- B: 5 日
- C: 7 日
- D: 3 日

答案：C

2. 口服可治疗肝豆状核变性病的是

- A: 二巯丙醇
- B: 二巯丁二钠
- C: 依地酸钙钠
- D: 青霉胺

答案：D

3. 适用于各种类型的心绞痛

- A: 普萘洛尔
- B: 硝酸酯类
- C: 地高辛
- D: 利多卡因

答案：B

4. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对

- A: 规范操作、坚持核对
- B: 配备足够的人力
- C: 环境整齐、安静
- D: 及时沟通

答案：A

5. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

- A: 用药安全是药物治疗的前提
- B: 有效性是选择药物的首要标准
- C: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本
- D: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性

答案：C

6. 李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

- A: ACEI
- B: β 受体拮抗剂
- C: AR
- D: 利尿药

答案：A

7. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 酒
- B: 烟
- C: 浓茶
- D: 食醋

答案：C

8. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是（）

- A: 被投毒
- B: 环境污染
- C: 长期吸入汞蒸气
- D: 饮食

答案：C

9. 关于血清天门冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- B: 天门冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能
- C: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）与谷丙转氨酶（GPT）是同一概念
- D: 天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中

答案：D

10. 患者，女，52 岁，患有 2 型糖尿病，餐前血糖正常，餐后升高，一直服用阿卡波糖控制。近期反映常出现低血糖表现，应建议患者随身携带

- A: 麦芽糖
- B: 巧克力
- C: 葡萄糖水
- D: 果糖

答案：C

11. （2018 年真题）患者，男，60 岁，因上臂出现湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 特比萘芬乳膏

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 氢化可的松软膏

C: 10%樟脑软膏

D: 利巴韦林软膏

答案: B

12. (2017 年真题) 抗结核联合治疗方案中, 可引起球后视神经炎不良反应的药物是 ()

A: 利福平

B: 左氧氟沙星

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案: C

13. 具有心脏毒性的药物是

A: 西沙必利

B: 莫沙必利

C: 奥美拉唑

D: 碳酸氢钠

答案: A

14. 患者, 男, 62 岁, 临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾, 产生的药物相互作用属于 ()

A: 增加靶器官药物浓度, 药品不良反应减少

B: 敏感化作用, 药品不良反应增加

C: 拮抗作用, 药品不良反应增加

D: 降低抗药性, 疗效增加

答案: D

15. 氨基糖苷类抗生素排泄减慢

- A: 肾小球滤过减少
- B: 肾血流量减少
- C: 肾小管分泌减少
- D: 肾小管重吸收增加

答案：A

16. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 硝酸甘油
- B: 维生素 E
- C: 呋噻米
- D: 阿司匹林

答案：D

17. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 早期、适量、联合给药
- B: 早期、足量、单次给药
- C: 早期、足量、联合给药
- D: 早期、足量、重复给药

答案：D

18. 下列药物属于肝药酶诱导剂的是

- A: 氟康唑
- B: 胺碘酮
- C: 卡马西平
- D: 环丙沙星

答案：C

19. 对于胆囊息肉的叙述错误的是

- A: 当胆囊息肉直径超过 8mm 时，建议看外科
- B: 多数为胆固醇结晶，少数为胆囊腺瘤
- C: 有发展为胆囊癌的风险
- D: B 超检查发现胆囊息肉很罕见，通常患者无症状

答案：D

20. 下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是()。

- A: 高三酰甘油血症主要为 TG 升高，而 TC 正常或轻度增加
- B: 混合型高脂血症 TC 和 TG 均增高
- C: 低高密度脂蛋白血症 TC 水平明显增高，TG 正常或偏高
- D: 高胆固醇血症 TC 增高，TG 正常

答案：C

21. 依据"处方"的含义及其重要意义，属于处方的医疗文书是

- A: 临床诊断书
- B: 病区领药单
- C: 病区用药医嘱单
- D: 药品出库单

答案：C

22. 不属于治疗痔疮的外用非处方药的是

- A: 普济痔疮栓?
- B: 复方片仔癀软膏?
- C: 麝香痔疮栓?
- D: 肛泰膏(栓)?

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

23. 对从事药学服务的药师而言，必须具备的专业知识能力要求是

- A: 扎实的药学专业知识
- B: 扎实的人文知识
- C: 扎实的管理专业知识
- D: 扎实的外语专业知识

答案：A

24. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 比索洛尔
- B: 卡托普利
- C: 厄贝沙坦
- D: 氨氯地平

答案：C

25. 主要侵犯生殖器、肛门等部位及新生儿的是（单纯疱疹病毒的分型）

- A: HSV-IV 型
- B: HSV-III 型
- C: HSV- I 型
- D: HSV- II 型

答案：D

26. 患者，男性，58 岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 直立性低血压

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 鼻咽炎和尿路感染
- C: 口干、便秘、尿潴留
- D: 卧位和坐位时高血压

答案：C

27. 阿昔洛韦可导致

- A: 阻塞肾小管、肾小球
- B: 肾小管坏死
- C: 肾间质纤维化
- D: 前列腺素合成障碍

答案：A

28. 洗胃液 1：5000~1：10000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 乐果中毒
- B: 巴比妥类中毒
- C: 1605 中毒
- D: 3911 中毒

答案：B

29. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

- A: β 受体阻断剂+ARB
- B: 利尿剂+AR
- C: α 受体阻断剂+ACEI
- D: 利尿剂+D-CCB

答案：D

30. (2017 年真题) 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为 ()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 中性粒细胞增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 红细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案：A

31. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

- A: D 级
- B: A 级
- C: X 级
- D: C 级

答案：A

32. 真性红细胞增多症

- A: 淋巴细胞增多
- B: 白细胞增多
- C: 白细胞减少
- D: 红细胞沉降率减慢

答案：D

33. 可沉淀大部分有机物及无机物的洗胃液是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 鸡蛋白

答案：B

34. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

- A: 三级证据
- B: 二级证据
- C: 一级证据
- D: 四级证据

答案：C

35. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者的药品是

- A: 孟鲁司特
- B: 噻托溴铵
- C: 氨茶碱
- D: 异丙托溴铵

答案：A

36. 根据体重计算婴幼儿的剂量时注

- A: 选用剂量的上限
- B: 不可调整
- C: 可适当调整
- D: 应减少用量

答案：A

37. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓后 3h?
- B: 溶栓后 24h?
- C: 溶栓后 12h?
- D: 溶栓后 1h?

答案：B

38. 以下治疗荨麻疹的抗过敏药中，属于过敏活性物质阻释剂的药物是

- A: 酮替芬
- B: 苯海拉明
- C: 赛庚啶
- D: 异丙嗪

答案：A

39. 导致心脑血管事件的是

- A: 己烯雌酚
- B: 罗非昔布
- C: 加替沙星
- D: 阿托伐他汀

答案：B

40. 药物不良反应报告的描述项目

- A: 患者用药记录
- B: 采取措施干预不良反应的时间
- C: 患者疾病发病时间
- D: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

答案：D

41. 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 依那普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 氨氯地平

答案：C

42. 缓泻药连续使用的时间一般不应超过

- A: 3 日
- B: 5 日
- C: 7 日
- D: 10 日

答案：C

43. 治疗急性腹泻可选用()

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 阿苯达唑
- C: 莫沙必利
- D: 聚乙醇 4000

答案：A

44. 用于晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

- A: 动脉注药
- B: 肌肉注射
- C: 腔内注射
- D: 静脉注射

答案：A

45. 6 岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

- A: 庆大霉素
- B: 四环素
- C: 氯雷他定
- D: 依巴斯汀

答案：D

46. (2018 年真题) 患者, 女, 45 岁, 6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁, 在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗, 症状控制较好, 近 3 个月服用西咪替丁, 患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱, 该患者各地求医, 服用各种药物, 具体药物品种不详。围绕该病例, 医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 遵从联合治疗原则
- B: 长期规律用药
- C: 定期监测肝功能
- D: 有条件的应测定药物血液浓度

答案: A

47. 患者, 男, 43 岁, 患有家族性痛风, 既往有磺胺类药物过敏史患者在服药 7 天后, 疼痛症状完全缓解。为了保证患者能够规律治疗, 药师在回访后推荐患者在此次痛风急性发作 2 周后应开始服用的药物是

- A: 别嘌醇
- B: 丙磺舒
- C: 碳酸氢钠
- D: 对乙酰氨基酚

答案: A

48. 茶碱类支气管平滑肌松弛剂治疗慢阻肺疾病的主要不良反应是

- A: 口渴
- B: 失眠
- C: 尿频
- D: 水肿

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

49. 患者，女，30 岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

- A: 口服给药
- B: 静脉注射
- C: 吸入给药
- D: 直肠给药

答案：B

50. 以下哪项不是药物流产的适应证（）

- A: 多次人工流产术史
- B: B 超确诊为宫内妊娠
- C: 本人自愿、年龄 >40 岁的健康女性
- D: 妊娠 ≤49 日

答案：C

51. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A: 维生素 B6
- B: 奥美拉唑
- C: 昂丹司琼
- D: 雷尼替丁

答案：C

52. 肾功能不全患者宜选用的药物是

- A: 肝毒性小、经肾代谢的药物
- B: 经肝肠循环消除的药物
- C: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- D: 经肝肾双途径消除的药物

答案：C

53. 适用于绝经过渡期()

- A: 单纯孕激素补充治疗
- B: 单纯雌激素补充治疗
- C: 雌孕激素序贯用药
- D: 雌孕激素连续联合用药

答案：A

54. 处方中“餐前给药”的外文缩写是

- A: qn
- B: Ac
- C: pc
- D: po

答案：B

55. 妊娠期尿路感染

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同
- B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^{10}$ scfu/ml
- C: 宜选用毒性小的抗菌药物
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

答案：C

56. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高， 38°C 左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 过敏性肺炎
- B: 免疫损伤肺炎
- C: 细菌性肺炎
- D: 放射性肺炎

答案：C

57. 不宜与小活络丹、香连片、贝母枇杷糖浆合用的药品是

- A: 地高辛
- B: 可待因
- C: 氯苯那敏
- D: 氨茶碱

答案：D

58. (2016 年真题) 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是 ()。

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 非布索坦
- D: 苯溴马隆

答案：B

59. 合剂的规范书写是

- A: Dil
- B: Liq
- C: Dos
- D: Mist

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

60. 药物警戒对用药安全具有重要作用。下列确认的用药不良事件中，属于发现药品使用环节问题的是

- A: “阿糖胞苷儿科事件”
- B: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”
- C: “万络(罗非昔布)事件”
- D: “亮菌甲素事件”

答案: A

61. 根据循证医学证据分级，同质 RCT 的系统评价结果属于

- A: II b 类证据
- B: II a 类证据
- C: I b 类证据
- D: I a 类证据

答案: D

62. 急性铅中毒出现

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 恶心、呕吐、视力模糊
- C: 恶心、呕吐、口内有金属味
- D: 腐蚀性口腔炎

答案: C

63. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 3.1~5.7mmol / L
- B: 0.56~1.70mmol / L
- C: 2.1~3.1mmol / L
- D: 1.03~2.07mmol / L

答案: D

64. 不能用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 雄激素
- B: 雄激素受体阻断剂
- C: 5-a 还原酶抑制剂
- D: α_1 受体阻断剂

答案：A

65. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的方便性
- B: 药物治疗的有效性
- C: 药物治疗的安全性
- D: 药物治疗的规范性

答案：B

66. 有较强刺激性，服药时不可嚼碎的泻药是

- A: 比沙可啶
- B: 双歧杆菌
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 硫酸镁

答案：A

67. 属于脂溶性维生素，用于治疗佝偻病和夜盲症的药品是

- A: 维生素 A 片
- B: 维生素 C 片
- C: 维生素 AD 复方制剂
- D: 复合维生素 B 片

答案：C

68. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 阿司匹林
- B: 阿卡波糖
- C: 贝那普利
- D: 二甲双胍

答案：D

69. 马兜铃酸可导致

- A: 肾小管坏死
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 阻塞肾小管、肾小球
- D: 肾间质纤维化

答案：D

70. 下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

- A: 感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素
- B: 忽略药品说明书提示用药
- C: 应用两种或两种以上一药多名的药物
- D: 病因未明用药

答案：A

71. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肝素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 华法林
- C: 氯吡格雷
- D: 利伐沙班

答案：C

72. 阿司匹林

- A: 血小板减少
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 血红蛋白量增多
- D: 中性粒细胞减少

答案：A

73. 下列不属于尿液检查项的是

- A: BL
- B: LEU
- C: ALT
- D: PRO

答案：C

74. 拮抗作用的配伍用药是

- A: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性
- B: 应用地高辛与氢氯噻嗪
- C: 纳洛酮用于解救吗啡中毒
- D: 阿托品联用吗啡镇痛

答案：C

75. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 μ mol/L (正常值: 男性 180~440 μ mol/L)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 腹胀
- B: ALT 升高
- C: 心律失常
- D: 低血糖

答案: A

76. 以下抗生素中，最适宜小儿使用的是

- A: 链霉素
- B: 青霉素
- C: 米诺环素
- D: 氯霉素

答案: B

77. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 空腹血糖
- B: 餐后 2 小时血糖
- C: 糖化血红蛋白
- D: 尿胆红素

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

78. 可作为紧急避孕药，性生活后 72h 内必须服用的药物是

A: 短效复方口服避孕药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 口服左炔诺孕酮(1.5mg)

C: 口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮 0.35mg)

D: 甲羟孕酮 150mg 肌内注射

答案：B

79. 肝功能评价的方法是

A: HAS-BLED 评分

B: FEV1 占预计值%

C: CTP 分级

D: CHA₂DS₂-VASc 评分

答案：C

80. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500 $\mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

A: 秋水仙碱

B: 丙磺舒

C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案：A

81. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A: 镇痛

B: 防止冠状动脉血栓形成

C: 解热

D: 抗炎

答案：B

82. 用于解救对乙酰氨基酚中毒的特殊解毒剂是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 氟马西尼

C: 亚甲蓝

D: 纳洛酮

答案：A

83. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状就诊，医生处方 1% 盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

A: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净

B: 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数

C: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

D: 滴鼻后，要静卧 3~5 分钟

答案：B

84. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

A: 37.4℃~38.0℃

B: 39.1℃~41.0℃

C: 37.0℃~38.3℃

D: 38.1℃~39.0℃

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/055123031114012033>