

2023-24 年广东省恩平市《执业药师之西药专业二》考试必背 200 题大全及答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 同用可抵消降钙素对高钙血症疗效的是

- A: 钙剂
- B: 维生素 D
- C: 铁剂
- D: 双膦酸盐类骨吸收抑制剂

答案：B

2. 以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

- A: 室性心动过速、心室颤动
- B: 慢性收缩性心力衰竭
- C: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- D: 梗阻性肥厚型心脏病

答案：B

3. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

- A: 乙胺丁醇
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：A

4. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

- A: 磺胺米隆
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

5. 下列抗结核药物中也可以用于治疗麻风病的是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：C

6. 在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

- A: 罗格列酮
- B: 达格列净
- C: 吡格列酮
- D: 二甲双胍

答案：D

7. (2016 年真题) 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是

- A: CYP2B6
- B: CYP2C19
- C: CYP2D6
- D: CYP2E1

答案：B

8. 大环内酯类的主要清除途径是

- A: 主要经肝脏清除
- B: 经肝、肾双途径清除
- C: 主要经肾脏排泄
- D: 主要经呼吸道排泄

答案：A

9. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 蔗糖铁
- B: 叶酸
- C: 硫酸亚铁
- D: 琥珀酸亚铁

答案：A

10. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是()

- A: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- B: 肾功能不全者可以使用
- C: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24 小时尿量及尿颜色
- D: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂

答案：B

11. 现有调脂药中降低 LDL 作用最强的一类药是

- A: 胆汁酸结合树脂
- B: 他汀类药物
- C: 抗氧化剂
- D: 胆固醇吸收抑制剂

答案：B

12. 有关氨茶碱平喘作用的叙述错误的是

- A: 激活腺苷酸环化酶
- B: 拮抗腺苷受体
- C: 激活磷酸二酯酶
- D: 促进肾上腺素释放

答案：C

13. 有关质子泵抑制剂说法错误的是

- A: 局部止血作用
- B: 可以中和胃酸
- C: 抑制胃酸分泌作用
- D: 主要是抑制 H^+, K^+-ATP 酶

答案：B

14. 特布他林的平喘作用维持时间是

- A: 3~5 分钟
- B: 10~12 小时
- C: 10~20 分钟
- D: 4~6 小时

答案：D

15. 卡泊芬净属于()

- A: 多烯类抗真菌药
- B: 棘白菌素类抗真菌药
- C: 唑类抗真菌药
- D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：B

16. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是

- A: 吉西他滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春瑞滨
- D: 巯嘌呤

答案：A

17. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 呋塞米
- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒
- D: 秋水仙碱

答案：C

18. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为()

- A: 万古霉素
- B: 氨曲南
- C: 哌拉西林
- D: 阿莫西林

答案：A

19. 甲氧苄啶联用华法林使

- A: 肾毒性增加
- B: 半衰期缩短
- C: 抗凝作用增强

D: 白细胞减少风险增加

答案：C

20. 属于第四代喹诺酮类药物的是

A: 吡哌酸

B: 莫西沙星

C: 诺氟沙星

D: 萘啶酸

答案：B

21. 下述药物不属于消毒防腐药的是()

A: 酚甘油

B: 硼酸溶剂

C: 过氧化氢溶剂

D: 盐酸麻黄碱溶剂

答案：D

22. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

A: 甲氧氯普胺

B: 多潘立酮

C: 莫沙必利

D: 西沙必利

答案：B

23. 中枢性或肾性尿崩症可选用

A: 螺内酯

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案: C

24. (2019 年真题) 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

A: 甲硝唑

B: 呋喃妥因

C: 庆大霉素

D: 苄星青霉素

答案: A

25. 治疗银屑病药主要作用不包括

A: 作用于皮肤表皮细胞

B: 恢复其正常分化状态

C: 改善表皮细胞增殖速率

D: 促进细胞有丝分裂

答案: D

26. 肝素过量可选用的拮抗药是 ()

A: 葡萄糖酸钙

B: 鱼精蛋白

C: 维生素 K

D: 氨基己酸

答案: B

27. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是

A: 氨甲苯酸

B: 硫酸鱼精蛋白

C: 维生素 K1

D: 维生素 B12

答案：C

28. 止泻药()

A: 硫酸镁

B: 乳果糖

C: 甘油

D: 地芬诺酯

答案：D

29. 维生素 A 的适应症不包括

A: 甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

B: 干眼病

C: 夜盲症

D: 角膜软化

答案：A

30. 阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

A: 帕洛诺司琼

B: 劳拉西泮

C: 氯丙嗪

D: 甲氧氯普胺

答案：C

31. 静脉注射速度不宜超过 50mg/min 的是

A: 氯化钾

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钙

D: 氯化钠

答案：C

32. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

A: 硫酸镁

B: 乳果糖

C: 聚乙二醇 4000

D: 甘油

答案：B

33. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A: 多西他赛

B: 表柔比星

C: 泼尼松

D: 卡莫司汀

答案：B

34. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

A: 咪康唑

B: 克霉唑

C: 制霉菌素

D: 灰黄霉素

答案：C

35. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 吸入性糖皮质激素

B: 白三烯受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 短效 B₂ 受体激动剂

答案: D

36. 属于硝基呋喃类的是

A: 夫西地酸

B: 呋喃妥因

C: 磺胺甲

D: 甲硝唑

答案: B

37. 静脉注射人工合成的 ACTH，在循环中的半衰期是

A: 7~12 分钟

B: 8 小时

C: 10~25 分钟

D: 4 小时

答案: C

38. 下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

A: 噻嗪类利尿剂

B: 留钾利尿剂

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 袢利尿剂

答案: D

39. 可使维生素 B₆ 在体内的活性降低的是

A: 异烟肼

B: 丙磺舒

C: 雌激素

D: 糖皮质激素

答案：C

40. 关于莫西沙星作用特点的说法,错误的是()

A: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗

B: 莫西沙星抗菌谱广,对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性

C: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物

D: 莫西沙星组织分布广泛,但不能透过血脑屏障

答案：D

41. 甲状腺素的合成需要()

A: 环氧化酶

B: 过氧化物酶

C: 碳酸酐酶

D: 蛋白水解酶

答案：B

42. 磺酰脲类促胰岛素分泌药存在“继发失效”的问题,应用磺酰脲类降糖药治疗 5 年,患者发生继发性失效的发生率是

A: 30%~40%

B: 1%~5%

C: 5%~15%

D: 50%~60%

答案：A

43. 氨基糖苷类抗菌药无效的是

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 厌氧菌
- C: 结核杆菌
- D: 需氧革兰阴性菌

答案：B

44. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 哺乳期慎用
- B: 滴眼后不应压迫泪囊
- C: 可诱发闭角型青光眼
- D: 可给予拟胆碱类药物解毒

答案：B

45. 典型不良反应除消化道反应，还有耳毒性和肾毒性的药物是

- A: 多柔比星
- B: 环磷酰胺
- C: 长春碱类
- D: 顺铂

答案：D

46. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- B: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物
- C: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成
- D: 抗肿瘤作用比紫杉醇强

答案：A

47. 与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

A: K 受体

B: δ 受体

C: $\mu 2$ 受体

D: $\mu 1$ 受体

答案：D

48. 患者,男,34 岁晨起出现上腹部剧烈疼痛考虑为胃肠道平滑肌痉挛李适宜该患者使用的治疗药物是 B

A: 多潘立酮

B: 溴吡斯的明

C: 酚妥拉明

D: 山莨菪碱

答案：D

49. 长期、单一应用 β

A: 耐药性

B: 头痛

C: 支气管痉挛

D: 暂时性低血糖

答案：A

50. 青霉素在体内的主要消除方式是

A: 肾小管分泌排泄

B: 被血浆酶破坏

C: 肝脏代谢

D: 肾小球滤过

答案：A

51. 新生儿服用可发生低凝血酶原血症及出血的药物是

A: 地西泮

B: 唑吡坦

C: 苯巴比妥

D: 卡马西平

答案：C

52. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是 ()

A: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

B: 应长期合用质子泵抑制剂

C: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

D: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

答案：A

53. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

A: 曲马多

B: 吗啡

C: 秋水仙碱

D: 布洛芬

答案：A

54. 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

A: 复方碳酸钙

B: 奥美拉唑

C: 胶体果胶铋

D: 替普瑞酮

答案：B

55. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

A: 青霉素+阿米卡星

B: 青霉素+氯霉素

C: 青霉素+红霉素

D: 青霉素+四环素

答案：A

56. 下列选项中，除抑制延髓咳嗽中枢外，还可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，并具有罂粟样平滑肌解痉作用的药物是（）。

A: 喷托维林

B: 可待因

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案：C

57. 干扰核酸生物合成的药物是（）

A: 氟尿嘧啶

B: 多柔比星

C: 顺铂

D: 高三尖杉酯碱

答案：A

58. 有明显耳毒性的药物是（）

- A: 青霉素
- B: 链霉素
- C: 四环素
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

59. 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 赖诺普利
- D: 吧达帕胺

答案：A

60. 唯一可用于治疗深部和皮下真菌感染的多烯类药物是

- A: 制霉菌素
- B: 灰黄霉素
- C: 氟康唑
- D: 两性霉素

答案：D

61. 耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

- A: 四环素
- B: 1%碘甘油
- C: 曲伏前列素
- D: 9%硼酸冰片滴耳液

答案：D

62. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 阿糖腺苷
- B: 干扰素
- C: 阿昔洛韦
- D: 奥司他韦

答案：C

63. 奈韦拉平的作用靶点是

- A: 脱氧核糖核酸聚合酶
- B: HIV-1 反转录酶
- C: 神经氨酸酶
- D: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

答案：B

64. 下列不属于中效利尿药的是

- A: 氢氟噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋噻帕胺

答案：B

65. (2018 年真题) 仅用于绝经后妇女, 不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是 ()

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 骨化三醇
- D: 雷洛昔芬

答案：D

66. 下列药物组合有协同作用的是

- A: 青霉素+螺旋霉素
- B: 青霉素+氯霉素
- C: 青霉素+四环素
- D: 青霉素+庆大霉素

答案：D

67. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- B: 增加锥体外系不良反应的风险
- C: 增加肾毒性
- D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：D

68. 用于治疗肺外结核病的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 布洛芬
- C: 阿糖腺苷
- D: 对氨基水杨酸钠

答案：D

69. 丙硫氧嘧啶起效慢的主要原因是

- A: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
- B: 肝内代谢转化快
- C: 口服后吸收不完全
- D: 肾脏排泄速度快

答案：A

70. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌均有强大抗菌活性的药物是()

- A: 克拉维酸
- B: 亚胺培南
- C: 氨曲南
- D: 阿莫西林

答案：B

71. 皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是()

- A: 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯
- B: 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯
- C: 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦
- D: 18 岁以下儿童禁用林旦

答案：D

72. 抗真菌药与糖皮质激素合用于皮肤病，感染症状消失后，应

- A: 立即停药，不得再用
- B: 再持续 1~2 周
- C: 再持续使用 1 个月
- D: 再持续使用 48h

答案：B

73. (2016 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 那格列奈
- C: 艾塞那肽
- D: 二甲双胍

答案：A

74. (2018 年真题) 可用于降低眼压的药物是 ()

- A: 左氧氟沙星
- B: 卡替洛尔
- C: 利福平
- D: 阿托品

答案: B

75. 临床上最常用的内分泌治疗药物是

- A: 氨氯米特
- B: 他莫昔芬
- C: 雌激素
- D: 雄激素

答案: B

76. 阿斯综合征患者禁用

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 氨己烯酸

答案: B

77. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 拉西地平
- C: 普伐他汀
- D: 依诺肝素

答案: D

78. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()

- A: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- B: 血管内皮生长因子
- C: 表皮生长因子受体
- D: 人表皮生长因子受体-2

答案: D

79. 影响毛细血管通透性的促凝血药是

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 卡巴克络
- D: 血凝酶

答案: C

80. 复方氨基酸注射液(6AA)与等量 10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 滴速 20~30 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 不超过 15 滴 / 分
- D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案: B

81. 主要增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素敏感性的药物是

- A: 氢氧化镁
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍

D: 胰岛素

答案: C

82. 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是()

A: 与 DNA 发生共价结合,使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂

B: 干扰微管蛋白的合成

C: 直接抑制拓扑异构酶,并与拓扑异构酶形成复合物

D: 抑制二氢叶酸还原酶,使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸

答案: B

83. 对急需抗凝处理的患者,以下哪种方案最优()

A: 肝素

B: 华法林

C: 华法林+低分子量肝素

D: 低分子量肝素

答案: C

84. 主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

A: 普萘洛尔

B: 利卡多因

C: 维拉帕米

D: 奎尼丁

答案: D

85. 关于丙硫氧嘧啶的描述,正确的是

A: 作用较甲巯咪唑弱

B: 可抑制外周组织的 T

C: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高

D: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌

答案：A

86. 治疗高脂血症达到中等强度（每日剂量可降低 LDL30%~50%），所需药物剂量最小的是

A: 匹伐他汀

B: 氟伐他汀

C: 洛伐他汀

D: 辛伐他汀

答案：A

87. 因为能增强 β -肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

A: 二甲双胍

B: 尼麦角林

C: 倍他司汀

D: 丁苯酞

答案：B

88. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

A: 头孢菌素

B: 四环素类

C: 磷霉素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 青霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/055214103131012033>