

2024 年广西壮族自治区邕宁区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库【名校卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

- A: 2 型糖尿病
- B: 高血压
- C: 1 型糖尿病
- D: 高血脂

答案：A

2. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

- A: 38.1℃～39.0℃
- B: 37.4℃～38.0℃
- C: 39.1℃～41.0℃
- D: 37.0℃～38.3℃

答案：C

3. 女性，32 岁，3 年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 7×10^9

- A: 输血

B: 维生素 B

C: 硫酸亚铁口服

D: 右旋糖酐铁肌注

答案：C

4. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 复方维生素 AD+钙剂

B: 复合维生素 B+钙剂

C: 维生素 D+钙剂

D: 维生素 D+钙剂+泼尼松

答案：C

5. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

A: 嗜酸性粒细胞

B: 中性粒细胞

C: 嗜碱性粒细胞

D: 淋巴细胞

答案：A

6. 应用患儿年龄、体重或体表面积等计算用药剂量，显示儿童用药应该

A: 避免食物的影响

B: 严格掌握用药剂量

C: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

D: 密切监护

答案：B

7. 静脉滴注时间应控制在 2h 以上的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 万古霉素
- C: 青霉素
- D: 培氟沙星

答案：B

8. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药
- B: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药
- C: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药
- D: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案：B

9. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

- A: 毛果芸香碱
- B: 碘解磷定
- C: 阿托品
- D: 亚甲蓝

答案：C

10. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 克拉霉素
- C: 甲硝唑
- D: 胶体果胶铋

答案：A

11. 属于祛痰药的是

- A: 羟甲唑啉
- B: 羧甲司坦
- C: 苯丙哌林
- D: 沙丁胺醇

答案：B

12. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 应给予少量、多次、清淡饮食？
- B: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止？
- C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星？
- D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液？

答案：C

13. 在治疗痔疮的药物中，作为硬化剂或萎缩剂的是

- A: 地奥司明
- B: 草木犀流浸液片
- C: 九华膏
- D: 苯酚甘油-水溶液

答案：D

14. 吸附力强、可阻止毒物吸收的是

- A: 淀粉溶液
- B: 药用炭混悬液
- C: 1%硫酸镁溶液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：B

15. (2016 年真题) 应在餐前服用的药物是 ()。

- A: 吡罗昔康片
- B: 氨茶碱片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 呋塞米片

答案：C

16. 非选择性 β -受体阻断剂的禁忌证是

- A: 充血性心力衰竭
- B: 哮喘
- C: 高血钾
- D: 体位性低血压

答案：B

17. 患者，女，20 岁，1 天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。查体：T36.5℃，P70 次/分，R18 次/分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体 I 度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良 Centor 评分：患者，20 岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良 Centor 评分为 0 分。药师对该患者的建议，错误的是

- A: 可服用布洛芬混悬液止痛
- B: 告知患者不要强行发声
- C: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d
- D: 避免环境温度突然变化

答案：C

18. 处方中"餐后给药"的外文缩写是

- A: pc
- B: po
- C: ac
- D: qn

答案：A

19. (2018 年真题) 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是 ()

- A: 每日早晚空腹口服
- B: 每晚睡前口服
- C: 每日早晚与食物同服
- D: 每日清晨空腹口服

答案：C

20. 甲状旁腺制剂

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 骨形成刺激剂
- C: 激素替代剂
- D: 促进骨矿化剂

答案：B

21. 白细胞分类中，单核细胞参考范围为

- A: 50%~70%
- B: 20%~40%
- C: 1%~5%
- D: 3%~8%

答案：D

22. 苯二氮类药物过量或者中毒，特异性解救药物是

- A: 碘解磷定
- B: 氟马西尼
- C: 氟奋乃静
- D: 新斯的明

答案：B

23. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 呋喃唑酮
- B: 庆大霉素
- C: 克林霉素
- D: 依替米星

答案：A

24. (2016 年真题) 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是 ()
。

- A: 酮康唑软膏
- B: 复方苯甲酸软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 联苯苄唑软膏

答案：C

25. 患者，女，69 岁，近一个月出现入睡困难，白天有头昏、疲倦等不适感，尝试非药物治疗无改善，推荐的药物治疗方案是 ()

- A: 氯硝西泮 2mgpoqn
- B: 唑吡坦 5mgpoqn
- C: 地西泮 5mgpoqn
- D: 苯巴比妥 100mgpoqn

答案：B

26. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 卧位和坐位时高血压
- B: 口干、便秘、尿潴留
- C: 直立性低血压

D: 鼻咽炎和尿路感染

答案：D

27. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 舍曲林

B: 丁螺环酮

C: 阿米替林

D: 艾司唑仑

答案：A

28. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 3 岁以下儿童不应使用非处方抗感冒药

B: 治疗成人感冒症状有效的药物仅限于非处方解热镇痛药和减轻鼻充血药

C: 抗生素对导致感冒和流感的病毒都有作用

D: 感冒药连续服用不得超过 7 天

答案：C

29. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

A: 卡托普利

B: 铋制剂

C: 氟西汀

D: 氯苯那敏

答案：D

30. 医师咨询"培氟沙星合用糖皮质激素抗感染"，属于

- A: 药物相互作用
- B: 给药途径
- C: 禁忌证
- D: 新药信息

答案：A

31. 溶栓治疗

- A: 阿替普酶
- B: 巴曲酶
- C: 低分子肝素
- D: 阿司匹林

答案：A

32. 重度贫血，Hb 为（）

- A: 60~90g/L
- B: 小于 60g/L
- C: 60~120g/L
- D: 90~120g/L

答案：B

33. 下列药物中，适用于急迫性尿失禁的药物为

- A: 非那雄胺
- B: 奥昔布宁
- C: 米多君
- D: 哌唑嗪

答案：B

34. 下列具有肝药酶抑制作用的药物中，所诱导的酶系类型最多的是

- A: 胺碘酮
- B: 咪康唑
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：A

35. 吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

- A: 1%硫酸镁溶液
- B: 鸡蛋白
- C: 牛奶-水混合液
- D: 药用炭混悬液

答案：D

36. 一般情况下，每张处方中开具的西药和中成药的总数目最多为

- A: 3 种
- B: 4 种
- C: 5 种
- D: 2 种

答案：C

37. 不宜置口中久含，以免影响其剂型设计目的

- A: 粉剂
- B: 包衣片
- C: 糖浆剂
- D: 胶囊剂

答案：B

38. 制定新药新知识培训制度，归属

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 知识培训
- C: 科学发展
- D: 管理规范到位

答案：B

39. 易产生过敏反应，如出现全身反应需要给予抗组胺药和激素进行处理的是

- A: 顺铂
- B: 紫杉醇
- C: 氨氯地平
- D: 多柔比星

答案：B

40. 糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

- A: 格列吡嗪
- B: 格列美脲
- C: 格列齐特
- D: 格列喹酮

答案：D

41. 下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是

- A: 酞丁安
- B: 硫酸锌
- C: 红霉素
- D: 磺胺醋酰钠

答案：A

42. 骨性关节炎伴轻-中度疼痛患者通常首选的药物是

- A: 氨基葡萄糖
- B: 透明质酸钠
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 布洛芬

答案：C

43. 吴先生因晚期肝癌口服吗啡缓释片姑息治疗，因疼痛加剧，自行嚼碎 3 片后疼痛有所缓解，但家人随即发现患者出现呼吸抑制、浅昏迷状态，紧急就医，医师发现患者已出现针尖样瞳孔。针对该患者，除立即进行气道保护、给予氧气外，应同时注射

- A: 醋酸甲羟孕酮
- B: 美沙酮
- C: 纳洛酮
- D: 氟哌啶醇

答案：C

44. 牙齿黄染及牙釉质发育不全

- A: 阿奇霉素
- B: 氯霉素
- C: 米诺环素
- D: 庆大霉素

答案：C

45. (2016 年真题) 患者，女，24 岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁 12 μ g/L，首选的治疗方案是 ()

。

A: 口服铁剂及维生素 C

B: 静脉滴注铁剂

C: 雄性激素治疗

D: 注射维生素 B12

答案：B

46. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是 ()

A: 左甲状腺素钠片

B: 东莨菪碱片

C: 阿米洛利片

D: 氟桂利嗪胶囊

答案：A

47. 描述是否充分、详细、准确是评价

A: 讨论

B: 摘要

C: 前言

D: 结果

答案：D

48. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 受精后 3 周至 2 个月

B: 受精后 2 周至 3 个月

C: 受精后 3 周至 3 个月

D: 受精后 1 周至 3 个月

答案: C

49. 服用时不宜嚼碎的是

A: 胃黏膜保护剂

B: 抗酸药

C: 解痉、镇痛药

D: 质子泵抑制剂

答案: D

50. 瘦肉精（克仑特罗）中毒时，可采用的解毒药是

A: 氟马西尼

B: 乙酰半胱氨酸

C: 普萘洛尔

D: 乙酰胺

答案: C

51. 一般由葡萄糖与脂肪提供机体 NPC 的比例是

A: NPC7: 3

B: 100kcal: 1gN

C: NPC5: 5

D: 150kcal: 1gN

答案: A

52. 可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 乳果糖

B: 阿法骨化醇

C: 对乙酰氨基酚

D: 铁剂

答案: A

53. 通过阻断 β 受体而发挥抗高血压作用的药物是 ()

A: 卡托普利

B: 普萘洛尔

C: 哌唑嗪

D: 硝苯地平

答案: B

54. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

A: 3 天

B: 5 天

C: 1 周

D: 2 周

答案: D

55. 抑制磷脂酶 A2，减少单核细胞和中性白细胞释放前列腺素和白三烯

A: 丙磺舒

B: 秋水仙碱

C: 阿司匹林

D: 别嘌醇

答案: B

56. (2018 年真题) 患儿, 14 岁, 体重 50kg, 体温 38.7℃, 使用布洛芬退热。单次给药剂量是 ()

- A: 10~15mg
- B: 500~1000mg
- C: 200~400mg
- D: 300~600mg

答案：C

57. 临床可作为氨基糖苷类药物的替代品的是

- A: 氨基糖
- B: 头孢哌酮
- C: 亚胺培南
- D: 克拉维酸

答案：A

58. 老年糖尿病患者不建议使用

- A: 噻唑烷二酮类
- B: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 双胍类
- D: 长效磺脲类

答案：D

59. 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是()

- A: INR
- B: RBC
- C: APTT
- D: ALT

答案：C

60. 随着社会的发展，生活的节奏越来越快，科技给我们带来便利的同时，也给我们的生活和工作增添了不少压力，焦虑、抑郁、失眠等病症的发生率随之上升。

- A: 曲唑酮
- B: 帕罗西汀
- C: 劳拉西泮
- D: 度洛西汀

答案：A

61. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5% 葡萄糖注射液 250ml 中。临床要求给药速度是 60mg / h，输注速度应是

- A: 30ml / h
- B: 20ml / h
- C: 60ml / h
- D: 10ml / h

答案：A

62. 患者，女，55 岁，因家庭变故，情绪低落，晨起后较严重，近三个月有自杀倾向就诊，诊断为抑郁症，患者既往有高血压、冠心病史 5 年，目前服用卡托普利片、硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙片。本次就诊，医师处方文拉法辛缓释片 150mg qd po，谷维素片 10mg tid po 治疗，患者用药后出现血压升高，可能导致该患者血压升高的药物是

- A: 谷维素片
- B: 文拉法辛缓释片
- C: 卡托普利片
- D: 硝酸异山梨酯

答案：B

63. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是 ()

- A: 软膏剂
- B: 直肠栓剂
- C: 滴眼剂
- D: 含漱剂

答案: B

64. 处方中外文缩写“OU”代表

- A: 左耳
- B: 右耳
- C: 双眼
- D: 左眼

答案: C

65. 患者，女，60 岁，现病史：近日因摔倒而致左腕骨骨折。骨科处理；因背痛加重接受口服止痛治疗。骨密度已 L1~L4 椎体 T 值-2. 7SD，BMD749(mg / cm²)；股骨颈 T 值-2. 2SD，BMD602(mg / cm²)。医生诊断为：绝经后骨质疏松症。

- A: 钙制剂
- B: 甲状旁腺素
- C: 双膦酸盐
- D: 氟制剂

答案: C

66. 药师日常承接的用药咨询以何种方式居多

- A: 质问方式
- B: 指令方式
- C: 主动方式

D: 被动方式

答案：D

67. 儿童退热的用药选择和单次用量, 正确的是()

A: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg

B: 布洛芬 0.4~0.6g (12 岁以上儿童)

C: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg

D: 阿司匹林 30~60mg/kg

答案：A

68. 一旦误服中毒, 必须用硫酸镁洗胃的是

A: 磷化锌等杀鼠药

B: 急性铅中毒

C: 香豆素类杀鼠药

D: 急性汞中毒

答案：B

69. 因能引起畸胎或胚胎致死效应, 故治疗期间和治疗 6 个月内, 所有育龄期妇女和男性均须采取避孕措施的药物是

A: 普萘洛尔

B: 奥美拉唑

C: 哌替啶

D: 利巴韦林

答案：D

70. 蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性, 可导致左心室功能受损、心衰等, 可以采用何种药物预防 ()

A: 普萘洛尔

- B: 阿托品
- C: 硝苯地平
- D: 辅酶 Q

答案：D

71. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 瑞格列奈片应于餐前服用
- B: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- C: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药
- D: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

答案：B

72. 归属"用药记录"项下的是

- A: 医保和费用支付情况
- B: 主要实验室检查数据
- C: 联合用药
- D: 临床诊断

答案：C

73. 2 级高血压是指

- A: 收缩压 140~159mmHg 和（或）舒张压 90~99mmHg
- B: 收缩压 ≥ 180 mmHg 和（或）舒张压 ≥ 110 mmHg
- C: 收缩压 160~179mmHg 和（或）舒张压 100~109mmHg
- D: 收缩压 < 120 mmHg 和舒张压 < 80 mmHg

答案：C

74. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜

- A: 利血平
- B: 硝苯地平
- C: β -受体阻滞剂
- D: 甲基多巴

答案：C

75. 患者通过电话、网络或信件询问是

- A: 被动方式
- B: 指令方式
- C: 质问方式
- D: 主动方式

答案：A

76. 运动员禁用药物中，蛋白同化激素产生的危害是

- A: 易造成人体严重脱水、肾衰竭
- B: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- C: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
- D: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

答案：D

77. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和伴有过敏性鼻炎哮喘患者的药品是

- A: 异丙托溴铵
- B: 孟鲁司特
- C: 噻托溴铵

D: 氨茶碱

答案: B

78. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

A: 处方点评

B: 处方审核

C: 药物信息服务

D: 参与健康教育

答案: C

79. 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数(BMI)是()

A: 30.2

B: 27.8

C: 20

D: 18

答案: B

80. (2019 年真题) 患者，男，25 岁，有癫痫病史 2 年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。

下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

A: 头孢曲松

B: 阿莫西林

C: 莫西沙星

D: 阿奇霉素

答案: C

81. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

A: 500ml, 500ml

B: 200ml, 800ml

C: 111ml, 889ml

D: 889ml, 111ml

答案：C

82. 归属公共网络资源的是

A: www.ashp.org

B: www.cmt.com.cn

C: www.googl

D: www.merck.com

答案：C

83. II 期临床试验

A: 以特殊人群为给药对象

B: 以目标适应证患者为给药对象

C: 以患者为给药对象

D: 以健康志愿者为给药对象

答案：B

84. 慢性汞中毒患者的首发症状是（）

A: 易兴奋症

B: 神经衰弱

C: 剥脱性皮炎

D: 口腔炎

答案：B

85. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

- A: 消化性溃疡
- B: 粒细胞减少症
- C: 溶血性贫血
- D: 慢性肾衰竭

答案：B

86. (抗甲状腺药分阶段治疗时间)，初治阶段

- A: 1~2 周
- B: 1~2 年
- C: 1~2 个月
- D: 2~3 个月

答案：C

87. (2016 年真题) 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ()。

- A: 布洛芬
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 伪麻黄碱
- D: 氯苯那敏

答案：B

88. 我国育龄妇女的主要避孕措施为

- A: 宫内节育器
- B: 阴茎套

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 口服避孕药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/055220204122012033>