

精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

（辅导资料、习题资源、知识点训练等）

临床检验基础考试题库及答案

1、仪器法 MCHC 的参考范围是()。

- A、180~250g / L
- B、250~360g / L
- C、180~320g / L
- D、320~360g / L
- E、250~320g / L

答案：D

2、尿蛋白试带对尿中哪种蛋白质最敏感()。

- A、肌红蛋白
- B、清蛋白
- C、球蛋白
- D、黏蛋白
- E、血红蛋白

答案：B

3、不属于中性粒细胞毒性变化的是()。

- A、中性粒细胞大小不均
- B、空泡变性
- C、中毒颗粒
- D、卡波环
- E、核固缩

答案：D

4、脑脊液蛋白定性试验的几种方法中，检测敏感、且操作简单的是()。

- A、Ross-Jone 试验
- B、Nonne-Apelt 试验
- C、Pandy 试验
- D、Levinson 试验
- E、Rivalta 试验

答案：C

5、关于瑞特染色嗜碱性粒细胞形态的叙述，错误的是()。

- A、直径 10~12 μm ，略小于中性粒细胞
- B、细胞浆颗粒量少，大小不均，染蓝黑色
- C、胞质较少，常呈淡红或淡紫色
- D、嗜碱性颗粒易溶于水，制片染色时不易脱失
- E、细胞核常被颗粒遮盖，着色较浅

答案：D

6、关于网织红细胞的叙述，错误的是()。

- A、是介于晚幼红细胞和成熟红细胞之间的红细胞
- B、细胞质中含有 RNA、核糖体等嗜碱性物质
- C、经瑞特染色后可见到连成线状或网状的结构
- D、骨髓增生明显时可出现工型和 II 型网织红细胞
- E、可用于判断骨髓的造血功能

答案：C

7、病人，女，23 岁。停经 40d 就诊，考虑为妊娠，hCG 检查的最佳尿标本是()。

- A、晨尿
- B、3h 尿
- C、12h 尿
- D、中段尿
- E、餐后尿

答案：A

8、关于中性粒细胞核象的叙述，正确的是()。

- A、指胞核的染色致密程度
- B、指胞核是否处于分裂状态
- C、指胞核的分叶状况
- D、指胞核的位置
- E、指核质比例

答案：C

9、关于核左移定义的叙述，错误的是()。

- A、再生性左移，其白细胞总数增高
- B、退行性左移，其白细胞总数不增高或减低
- C、指外周血涂片中中性杆状核粒细胞计数<10%
- D、指外周血涂片中中性杆状核粒细胞增多，可出现幼稚细胞
- E、根据病情严重程度，分为轻度左移、中度左移和重度左移

答案：C

10、MCV 以飞升(fL)为单位，1fL 等于()。

- A、10⁻¹⁰L
- B、10⁻¹¹ L
- C、10⁻¹²L
- D、10⁻¹⁵L

E、10-18L

答案：D

11、镜下血尿的红细胞数量应为()。

A、>3 个 / HP

B、>5 个 / HP

C、>10 个 / HP

D、>15 个 / HP

E、>20 个 / HP

答案：A

12、下列哪项与中性粒细胞的退行性变无关 ()。

A、胞体肿大

B、核固缩

C、核棘突

D、核溶解

E、结构模糊

答案：C

13、关于尿血红蛋白检测的叙述，错误的是()。

A、标本应新鲜

B、3%过氧化氢浓度必须准确

C、应设立阳性对照

D、为防止假阴性，可将尿液煮沸 2min

E、试带要干燥、避光保存

答案：D

14、收集中段尿时，不必要的措施是()。

A、清洗外阴

B、用 0.1% 苯扎溴铵消毒

C、不间断排尿过程中收集尿液标本

D、弃前、后时段的尿液

E、所有尿液均收集在无菌容器内

答案：E

15、磺基水杨酸法可与下列成分发生反应，除外的是()。

A、清蛋白

B、球蛋白

C、糖蛋白

D、尿胆原

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/057131132132006115>