专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年甘肃省秦安县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题内部题库附答案【巩固】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.无症状菌尿

A：治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

B：宜选用毒性小的抗菌药物

C：治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

D：患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数>105cfu／ml

答案：D

2.美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

A：酶诱导作用

B：与血浆蛋白结合

C：排泄

D：作用于同一受体的拮抗作用

答案：D

3.（2019年真题）患者，女，57岁，BMI31.2，诊断为2型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

A：格列齐特

B：二甲双胍

C：吡格列酮

D：阿卡波糖

答案：B

4.（2020年真题）患者，男，41岁，因甲状腺功能亢进症，服用甲巯咪唑治疗5个月，目前剂量是10mgqd，今日查血常规:白细胞1.50×109/L（成人正常参考值为4×109/L～10×109/L），中性粒细胞0.5×109/L（成人正常参考值为1.8×109/L~6.3×109/L）。根据血常规检查结果，关于该患者用药方案调整的说法，正确的是（）

A：将甲巯咪唑减量至每日5mg

B：甲巯咪唑减量至每日5mg，并加用粒细胞集落刺激因子

C：停用甲巯咪唑，改为丙硫氧嘧啶50mgtid

D：停用甲巯咪唑，严密观察，必要时加用粒细胞集落刺激因子

答案：D

5.病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别

A：3级证据

B：2级证据

C：1级证据

D：4级证据

答案：A

6.判别"大三阳"区别于"小三阳"的主要检查项目是

A：抗-HBc(+)

B：HBeAg(+)

C：抗-HBs(+)

D：抗-HBe(+)

答案：B

7.痛经伴有精神紧张者可口服

A：谷维素

B：阿司匹林

C：布洛芬

D：对乙酰氨基酚

答案：A

8.口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

A：低密度脂蛋白胆固醇升高

B：甘油三酯降低

C：糖耐量异常

D：高密度脂蛋白胆固醇降低

答案：C

9.钙制剂+维生素D+雌激素（选择性雌激素受体调节剂）用于治疗

A：抗癫痫药所致的骨质疏松症

B：妇女绝经后骨质疏松症

C：原发性骨质疏松症

D：老年性骨质疏松症

答案：B

10.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A：在注射胰岛素制剂时,针头可重复使用

B：未使用的胰岛素可以冷冻保存

C：注射胰岛素制剂时,应变换注射部位,两次注射点要间隔2cm

D：开启的胰岛素需要冷藏保存

答案：C

11.急性细菌性扁桃体炎患者常表现为()

A：中性粒细胞增多

B：血红蛋白减少

C：红细胞增多

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：A

12.可加重老年人慢性便秘的药物是

A：氯丙嗪

B：麻黄碱

C：异丙嗪

D：H

答案：C

13.(肾功能不全者的药物排泄机制)有机酸排出减少

A：肾小管分泌减少

B：肾血流量减少

C：肾小管重吸收增加

D：肾小球滤过减少

答案：A

14.鼻窦炎的急性期应尽早采用足量的何种药物治疗

A：抗过敏药

B：解热镇痛药

C：抗菌药

D：局部血管收缩剂

答案：C

15.血清淀粉酶检查超过正常值

A：诊断急性胰腺炎

B：诊断痛风

C：诊断消化性溃疡

D：诊断心肌梗死

答案：A

16.一日一次用药的外文规范缩写是

A：q.h

B：q.d

C：q.o.d

D：q.n

答案：B

17.（2017年真题）药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括（）

A：仔细核对药品

B：进行用药指导

C：自行修改错误处方

D：严格审核处方

答案：C

18.治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

A: 用药安全是药物治疗的前提
B: 有效性是选择药物的首要标准
C: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本
D: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性
答案：C

19.导致心脑血管事件的是
A: 加替沙星
B: 己烯雌酚
C: 罗非昔布
D: 阿托伐他汀
答案：C

20.患者男性，45岁，反复发作夜间呼吸困难1个月，加重1天就诊。体格检查：血压180／110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次／分。
A: 肺心病还是冠心病
B: 肺炎还是肺间质纤维化
C: 支气管哮喘还是心源性哮喘
D: 慢性支气管炎还是急性支气管炎
答案：C

21.1%硫酸镁溶液洗胃用于解救
A: 磷化锌中毒
B: 苯丙胺中毒
C: 铅中毒
D: 汞中毒
答案：C

22.主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

A: 盐酸烯丙吗啡

B: 谷胱甘肽

C: 双解磷

D: 亚硝酸钠

答案：A

23.药物对孕妇的不良影响中，甲氨蝶呤可引起()。

A: 流产

B: 死胎

C: 畸形

D: 溶血

答案：C

24.在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

A: H.pylori 感染

B: 胃黏膜血流减少

C: 胃黏膜屏障的完整性

D: 胃酸

答案：D

25.成人静脉血白细胞计数的正常范围值

A: （11.0～12.0）×109/L

B: （10.0～20.0）×109/L

C: （15.0～20.0）×109/L

D: （3.5～10.0）×109/L

答案：D

26.患者，男，60岁，呈典型的"面具脸"，"慌张步态"及"小字症"表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是()

A: 普拉克索

B: 司来吉兰

C: 多奈哌齐

D: 左旋多巴

答案：D

27.小儿呼吸道感染可服用琥乙红霉素颗粒，剂量为30～50mg/(kg.d)，分3～4次服用，一位体重为20kg的儿童一次剂量应为

A: 225～375mg或200～300mg

B: 175～250mg或125～225mg

C: 215～350mg或175～270mg

D: 200～333mg或150～250mg

答案：D

28.有关一级信息的特点描述，错误的是

A: 结论正确

B: 内容比二、三级信息更新

C: 含有研究的具体细节

D: 对读者专业水平要求高

答案：A

29.药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 阿托品联用吗啡
B: 山莨菪碱联用哌替啶
C: 铁剂联用维生素
D: 阿托品联用普萘洛尔
答案：B

30.上市前临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于
A: 考察不全面
B: 管理漏洞
C: 病例数目少
D: 观察时间短
答案：A

31.注射后10~30min起效，作用维持时间2~3h，属于速效强心苷的是
A: 米力农
B: 去乙酰毛花苷
C: 多巴胺
D: 维拉帕米
答案：B

32.某患者，男，71岁，既往有血脂异常，胆固醇7.7mmol/L，甘油三酯2.3mmol/L，肝功能正常，患者连续服用氟伐他汀和非诺贝特5个月，检测肝功能AST142U/L(正常值为40U/L)，ALT126(正常值为40U/L)，磷酸激酶CPK2000U/L(正常值为25～200U/L)。依据上述复查结果判断患者
A: 肾脏毒性
B: 肝脏毒性

C: 肌肉毒性

D: 心脏毒性

答案：C

33.阿尔兹海默病患者应该避免使用的药物是（）

A: 多奈哌齐

B: 卡巴拉汀

C: 颠茄

D: 美金刚

答案：C

34.用药错误定义为药物在临床使用全过程中出现的、任何可以防范的用药不当。临床用药的过程一般是指开写处方、转抄医嘱、药师调剂发药、护士或患者给药以及监测用药结果等。

A: 药品位置凌乱

B: 患者自行选购药品

C: 药品包装外观相似

D: 新手值班

答案：C

35.须在凉暗处保存的常用药品是

A: 多巴胺

B: 复方甘草合剂

C: 双歧三联活菌制剂

D: 硫酸阿托品

答案：B

36.患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次/分，呼吸24次/分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC11×109/L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 社区获得性肺炎

B: 慢性阻塞性肺病

C: 支气管炎

D: 医院获得性肺炎

答案：A

37.对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

A: Ⅲ期临床试验

B: Ⅰ期临床试验

C: 临床预试验

D: Ⅱ期临床试验

答案：D

38.解热镇痛药用于退热，两次用药的间隔时间应该是

A: 2～4小时

B: 3～5小时

C: 5～7小时

D: 4～6小时

答案：D

39.硫脲类最严重的不良反应是

A: 甲状腺功能低下

B: 中枢抑制

C: 甲状腺功能亢进

D: 粒细胞缺乏

答案：D

40.血尿酸检查超过正常值

A: 诊断消化性溃疡

B: 诊断心肌梗死

C: 诊断痛风

D: 诊断急性胰腺炎

答案：C

41.代谢性或呼吸性碱中毒

A: 尿酸碱度增高

B: 尿酸碱度降低

C: 尿胆红素检测阳性

D: 尿蛋白检测阳性

答案：A

42.抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

A: 丙磺舒

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 阿司匹林

答案：C

43.患者男,78岁实施右侧髋关节置换术,术后第10日,患侧下肢出现肿胀、疼痛,诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是（）

A: 血凝酶

B: 依诺肝素

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：B

44.妊娠期妇女甲亢首选

A: 甲巯咪唑

B: 碘化钾

C: 放射性131I

D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

45.脂溶性中等，作用持续3～6h的是

A: 硫喷妥

B: 苯巴比妥

C: 巴比妥

D: 戊巴比妥

答案：D

46.KDIGO推荐的CKD分期方法主要依据指标是

A: 尿微量白蛋白排泄率（AER）

B: 尿微量白蛋白肌酐比值（ACR）

C: 肾小球滤过率（GFR）

D: 肌酐清除率（CrCl）

答案：C

47.服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A: 餐前0.5～1h

B: 餐后1h
C: 餐前
D: 餐后
答案：A

48.选择合适药物的前提是
A: 药物治疗的方便性
B: 药物治疗的有效性
C: 药物治疗的安全性
D: 药物治疗的规范性
答案：C

49.解救经口急性铅中毒的洗胃液是
A: 3%过氧化氢
B: 1%氯化钠
C: 1%硫酸镁
D: 1%硫酸铜
答案：C

50.乳母服用华法林，乳汁中几乎不会含有华法林的机制是其
A: 在母体血浆中处于结合状态
B: 呈弱酸性
C: 呈弱碱性
D: 解离度大
答案：A

51.慢性肾小球肾炎常见
A: 颗粒管型、透明管型

B: 蜡样管型
C: 细胞管型
D: 白细胞管型
答案：A

52.下面有关帕金森病治疗的说法错误的是
A: 药物治疗在病程晚期多数疗效不佳
B: 康复与心理治疗是帕金森病治疗中重要的辅助措施
C: 药物治疗的目标是延缓疾病进展，尽可能延长症状控制的年限
D: 司来吉兰适用于帕金森病早期阶段，胃溃疡患者慎用；其可以与5-羟色胺再摄取抑制剂一起提高疗效
答案：D

53.非甾体类抗炎药引起的典型药源性疾病是
A: 神经系统疾病
B: 肌病
C: 血液系统疾病
D: 胃肠道反应
答案：D

54.不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管
A: 泡腾片
B: 糖浆剂
C: 粉剂
D: 胶囊剂
答案：C

55.公众用药咨询的内容是

A: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

B: 抗菌药物的合理使用

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：C

56.用于癌性胸水

A: 肌内注射

B: 动脉注药

C: 腔内注射

D: 静脉注射

答案：C

57.用于评价肝功能不全严重程度的是()

A: CTP评分标准

B: 数字评分法

C: APACHE评分系统

D: Cochrane证据分级

答案：A

58.患者，女，45岁，既往有扩张型心肌病，近1年出现劳累性呼吸困难，1天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。

A: 维拉帕米

B: 阿托品

C: 普萘洛尔

D: 肾上腺素

答案：B

59.轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

A：口服给药

B：外用给药

C：腔道给药

D：肌内注射

答案：A

60.以下关于抑郁症的介绍错误的是

A：该病具有高发病、高复发、高致残的特点

B：抑郁症的病因明确

C：抑郁症的好发年龄在20～50岁

D：及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

答案：B

61.（2018年真题）服用华法林期间应进行监测的指标是（）

A：INR

B：APTT

C：RBC

D：ALT

答案：A

62.中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

A：氯苯那敏

B：地高辛

C：复方利血平

D: 甲氧氯普胺

答案：D

63.关于处方书写中的基本要求错误的

A: 年龄必须写实足年龄

B: 麻醉药品处方应有病历记录

C: 一般情况下均要注明临床诊断

D: 中药饮片调剂、煎煮的特殊要求注明在药品左上方并加括号

答案：D

64.某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快补服一片,然后在常规时间继续服药

B: 不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

C: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

D: 到21日20:00再同时服用两片药,然后在常规时间继续服药

答案：A

65.可导致体重增加的抗焦虑药物为（）

A: 氟西汀

B: 舍曲林

C: 米氮平

D: 文拉法辛

答案：C

66.应用两种以上药物以增强与确保疗效

A：联合

B：规律

C：适量

D：早期

答案：A

67.老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物不良反应的发生率增高。

A：维生素B1

B：阿司匹林

C：苯巴比妥

D：磺胺异恶唑

答案：A

68.急性黄疸型肝炎患者尿常规检查可发现

A：尿胆红素阳性

B：尿葡萄糖阳性

C：尿淀粉酶增高

D：尿血红蛋白阳性

答案：A

69.（2021年真题）患者,男,45岁,因消化不良（上腹饱胀,餐后明显）来药店咨询。下列说法错误的是（）

A：可用助消化药对症治疗

B：应除外器质性疾病

C：Hp感染是引|起消化不良的常见原因

D：进餐时不要摄入过多的液体

答案：C

70.药师最基本的技能是

A：沟通技能

B：自主学习能力

C：调剂技能

D：药品管理技能

答案：C

71.控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

A：经济性

B：有效性

C：安全性

D：规范性

答案：A

72.可加重痴呆及认知功能受损的是

A：氯苯那敏

B：地西泮

C：H

D：异丙嗪

答案：C

73.可能导致血小板(PLT)计数减少的药物是

A：阿司匹林

B：胰岛素

C：苯妥英钠

D：氯氮平

答案：A

74.治疗真菌性阴道炎首选的非处方药是

A：硝酸咪康唑栓

B：克霉唑栓

C：甲硝唑栓

D：聚甲酚磺醛栓

答案：A

75.以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛患者的首选处方药是

A：卡马西平

B：地西泮

C：苯噻啶

D：山莨菪碱

答案：A

76.饮水可能会引起水潴留是指

A：苦味健胃药

B：抗利尿药

C：舌下片（丸）

D：利胆药

答案：B

77.患者，女，29岁，孕25+6周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为Hb71g/L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A：口服，每次5ml，一日3次

B: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1小时后继续静脉注射余下剂量

C: 快速静脉注射

D: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

答案：B

78.（2015年真题）下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是（）。

A: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

B: 需要终身服药

C: 服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状

D: 妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶

答案：D

79.关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

A: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是Ⅱa因子)

B: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

C: 需监测INR

D: 与食物和药物相互作用小

答案：C

80.（2019年真题）患者，女，35岁，复杂部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

A: 卡马西平

B: 丙戊酸钠

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：A

81.核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂（）

A: PIs

B: NNRTIs

C: FIs

D: NRTIs

答案：D

82.（2018年真题）患者,女,38岁,已婚,妊娠2个月,近日自觉心慌、多汗,查FT3,FT4偏高TSH0.01mU/L,临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为（）

A: 维持妊娠,选用甲巯咪唑治疗

B: 维持妊娠,行甲状腺切除手术

C: 终止妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

D: 维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

答案：D

83.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

B: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

C: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

D: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

答案：C

84.不属于用药错误在药师发药环节技术层面的防范措施是

A: 保持清新、整齐、干净和安静的环境

B: 良好的服务态度和服务语言标准化

C: 交代正确的给药时间

D: 正确交代药物用量

答案：A

85.不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管的药物是

A: 非洛地平缓释片

B: 聚乙二醇粉剂

C: 吲哚美辛胶囊

D: 磷酸可待因糖浆

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/057164145050010024