

北京住院医师内科 I 阶段《神经内科必看考点》考试题

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|-----|----|
| | |

- 1、单项选择题: 女患, 59 岁, 左侧面部发作性剧痛 2 年, 疼痛自上唇始, 延至外眦下方, 每次持续数秒钟, 讲话、进食、刷牙和洗脸可诱发, 神经系统检查无阳性体征。诊断考虑为 ()。A. 偏头痛
B. 鼻窦炎
C. 原发性三叉神经痛
D. 蝶腭神经痛
E. 非典型面痛
- 2、单项选择题: 全身强直-阵挛性发作和失神发作合并发生时, 药物治疗首选 ()。A. 地西洋 (安定)
B. 乙琥胺
C. 苯妥英钠
D. 苯巴比妥
E. 丙戊酸钠
- 3、单项选择题: 对急性脑梗死病人, 下列哪种情况不适于溶栓治疗 ()。A. 发病 6 小时以内
B. CT 证实无出血灶
C. 病人无出血素质
D. 出凝血时间正常
E. 头部 CT 出现低密度灶
- 4、单项选择题: 下列哪些疾病属于钠离子通道病 ()。A. 高钾型周期性瘫痪
B. 低钾型周期性瘫痪
C. 强直性肌营养不良
D. 多发性肌炎
E. 先天性肌强直
- 5、单项选择题: 女性, 31 岁, 双眼睑下垂, 复视 2 年, 溴吡斯的明治疗, 症状一时缓解, 近期出现抬头困难, 四肢疲软, 此病人属重症肌无力的哪一型 ()。A. 迟发重症型
B. 轻度全身型
C. 中度全身型
D. 眼肌型
E. 重症急进型
- 6、单项选择题: 男性, 30 岁。双眼睑下垂, 复视 2 年。以吡啶斯的明治疗, 症状一度缓解。近期出现屈颈, 抬头无力, 四肢疲软, 该病人属于重症肌无力中的哪一型 ()。A. 眼肌型
B. 延髓肌型

- C. 全身型
 - D. 脊髓肌型
 - E. 肌萎缩症
- 7、单项选择题：脑出血的内科治疗最重要的是（ ）。A. 控制脑水肿
- B. 给止血剂
 - C. 降低血压
 - D. 抗生素治疗
 - E. 给氧
- 8、单项选择题：以下不是路易体痴呆临床表现的是（ ）。A. 进行性痴呆
- B. 运动迟缓
 - C. 肌强直
 - D. 视幻觉
 - E. 尿失禁
- 9、单项选择题：急性脊髓炎治疗中，哪项是错误的（ ）。A. 免疫球蛋白
- B. 不能过早康复训练
 - C. 急性期可应用大剂量甲基泼尼松龙
 - D. 保持呼吸道通畅
 - E. 抗生素预防感染
- 10、单项选择题：关于癫痫，下列哪项不符合（ ）。A. 按照病因可分特发性癫痫和症状性癫痫
- B. 遗传因素和环境因素均可影响痫性发作
 - C. 每一位癫痫病人只有一种发作类型
 - D. 女性病人通常在月经期和排卵期发作频繁
 - E. 癫痫的临床表现可分痫性发作和癫痫症两方面
- 11、单项选择题：以下哪项发生病变时，可出现 Beever 征（ ）。A. T9-10
- B. T7-8
 - C. T8-9
 - D. T10-11
 - E. T6-7
- 12、单项选择题：下列哪些不是重症肌无力的特点（ ）。A. 起病隐袭，眼外肌常常首先受累
- B. 10 岁以下儿童眼外肌受累首发者更加常见
 - C. 受累肌肉呈病态疲劳性，晨轻暮重
 - D. 肌无力分布符合单一神经或神经根受累模式
 - E. 平滑肌和括约肌通常不受累
- 13、单项选择题：面神经炎的体征表述不正确的是（ ）。A. 病侧鼻唇沟变浅，嘴角下垂
- B. 鼓腮时漏气
 - C. 病侧眼裂不能闭合
 - D. 健侧额纹消失
 - E. 病侧乳突部压痛
- 14、单项选择题：男性，40 岁。进行性上升性左下肢麻木 1 年余伴右下肢肌力减退就诊。大小便无明显障碍。体检：左肋弓以下感觉减退，双侧腹壁反射减弱，右侧膝反射亢进。该患者的诊断最可能为（ ）
- A. 胸 6 水平髓外肿瘤
 - B. 胸 6 水平髓内肿瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058025111107006063>