

最新中药学综合知识与技能试题 50 题含答案

单选题

1、腹痛常见病因病机

- A 呼吸不畅，胸闷气短
- B 呼吸有力，声高气粗
- C 呼吸困难，短促急迫
- D 呼吸困难，喉中有声
- E 呼多吸少，气不得续

答案：D

呼吸困难，短促急迫，甚则鼻翼扇动，或张口抬肩不能平卧的称为喘。喘气时喉中有哮鸣声的称为哮。

单选题

2、应通风干燥、防虫蛀的中药是

- A 生姜
- B 桔梗
- C 连翘
- D 龙胆
- E 川芎

答案：E

含挥发油多的药材和饮片，如薄荷、当归、川芎、荆芥等，贮藏时室温不可太高，否则容易走失香气或泛油，应置阴凉干燥处贮存。

单选题

3、火邪的致病特点是

- A 汗出恶风
- B 经脉拘急
- C 大便溏泻
- D 吐血衄血
- E 干咳少痰

答案：B

寒邪侵袭人体，可使气机收敛，腠理、经络、筋脉收缩而挛急。如寒邪侵袭肌表，毛窍腠理闭塞，卫阳被郁不得宣泄，则可见恶寒发热、无汗；寒客血脉，则气血凝滞，血脉挛缩，可见头身疼痛、脉紧；寒客经络关节，经脉拘急收引，则可使肢体屈伸不利，或冷厥不仁。

单选题

4、培土生金法又称

- A 滋肾养肝法
- B 补养脾肺法
- C 滋补肝肾法
- D 补肺滋肾法
- E 滋养肺肾法

答案：B

培土生金法又称为补养脾肺法，是通过补脾益气达到补益肺气的治法。

单选题

5、患者连续几日食用火锅，症见口腔黏膜溃疡，灼痛明显，伴失眠溲黄，大便秘结；黏膜表面有黄白色假膜，周边红肿。舌红，苔黄，脉数有力。患者应被诊断为

- A 疏肝理气，化痰消坚
- B 温肾健脾，化湿敛疮
- C 清心泻脾，消肿止痛
- D 除湿化痰，活血散结
- E 疏风清热，消肿利咽

答案：C

对于心脾积热导致的口疮，应采取清心泻脾，消肿止痛的治法。

单选题

6、易潮解的是

- A 咸秋石
- B 胆矾
- C 砂仁
- D 没药
- E 山药

答案：A

本组题考查中药饮片贮存中常见的质量变异现象。易粘连的药物有芦荟、没药、乳香、阿魏、鹿角胶、龟甲胶、天冬、熟地等；易风化的药物有胆矾、硼砂、芒硝等；易变色的药物有泽泻、白芷、山药、天花粉、黄芪、黄柏、红花、菊花、金银花、腊梅花等；易潮解的药物有咸秋石、芒硝。

单选题

7、主司调畅情志的脏是

- A 肝主疏泄
- B 肺主治节
- C 心主血脉
- D 心主神明
- E 脾主升清

答案：D

心主神明，主管精神活动，所以患者失眠心烦的表现是心主神明出现了异常。

单选题

8、云南白药酊与对乙酰氨基酚同用，能

- A 抗炎类药
- B 降压类药
- C 内分泌类药
- D 催眠镇静类药
- E 抗痉挛类药

答案：D

逍遥散或三黄泻心汤等与西药催眠镇静药联用，既可提高对失眠症的疗效，又可逐渐摆脱对西药的依赖性。

单选题

9、处方名延胡素，调剂时应付

- A 空腹服
- B 饭前服
- C 饭后服
- D 发作前服
- E 睡觉前服

答案：A

驱虫和泻下药宜空腹服。

单选题

10、某中医院，发现仓库内的白芷、北沙参、大黄、鸡内金发生了虫蛀。温湿度仪显示：温度30℃、相对湿度78%。储存药品的环境相对湿度应为

- A5%-10%
- B5%-13%
- C7%-10%
- D7%-13%
- E7%-15%

答案：D

本题考查的是湿度对中药质量变异的影响，一般炮制品的绝对含水量应控制在 7%~13%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%。

单选题

11、真武汤与氢氯噻嗪，能

- A 缩短疗程
- B 降低毒性
- C 减少用量
- D 协同增效
- E 改善体质

答案：D

木防己汤、真武汤、越婢加术汤、分消汤等与西药利尿药联用，可以增强利尿效果。减轻由利尿而导致的口渴等副作用。（氢氯噻嗪为利尿类药）

单选题

12、因配伍禁忌不宜合用的药组是

- A 益母草膏与妇血康颗粒
- B 妇科千金片与当归四物汤
- C 补中益气丸与金匱顺气丸
- D 附子理中丸与牛黄解毒片
- E 祛痰止咳颗粒与通宣理肺丸

答案：E

临床常用中成药心通口服液中含有海藻，祛痰止咳颗粒含有甘遂，若与橘红痰咳颗粒、通宣理肺丸、镇咳宁胶囊等含甘草的中成药联用也属禁忌之列。

单选题

13、低温养护法的温度为

- A 大蒜
- B 冰片
- C 黑豆
- D 花椒
- E 萆澄茄

答案：D

对抗同贮法总结, 蛤蚧---花椒、吴茱萸、萆澄茄；蕲蛇、白花蛇---花椒、大蒜；土鳖虫---大蒜；丹皮---山药、泽泻；人参---细辛；冰片---灯心草；硼砂---绿豆；藏红花---冬虫夏草

单选题

14、可抑制胃蠕动及排空延长某些药物在胃内滞留时间的中药是

- A 乌梅与阿司匹林
- B 乌头散与头孢拉定
- C 石膏和四环素
- D 麻黄与呋喃唑酮
- E 大黄与利福平

答案：E

影响药物透过生物膜吸收：中药中的某些成分如鞣质、药用炭、生物碱、果胶及金属离子等易与西药结合或吸附，特别是以固体形式口服的西药，可导致某些药物作用下降。含鞣质较多的中药有大黄、虎杖、五倍子、石榴皮等，因此中成药牛黄解毒片（丸）、麻仁丸、七厘散等不宜与口服的红霉素、士的宁、利福平等同用，因为鞣质具有吸附作用，使这些西药透过生物膜的吸收量减少。

单选题

15、“小毒”中药是

- A 吴茱萸、蛇床子
- B 车前子、地肤子
- C 山豆根、制川乌
- D 马钱子、天仙子
- E 枇杷叶、侧柏叶

答案：C

2015 版《中国药典》载有毒性药材和饮片共计 83 种，其中有大毒的饮片 10 种，如川乌、马钱子（马钱子粉），天仙子、巴豆（巴豆霜）、草乌、斑蝥等；有毒的饮片 42 种，如三颗针、山豆根、天南星（制天南星）、木鳖子、附子、雄黄、制川乌等；有小毒的饮片 31 种，如土鳖虫、川楝子、苦杏仁、北豆根、重楼、蛇床子、吴茱萸等。

单选题

16、某人身体强壮、胖瘦适中，饮食无偏嗜，二便通调，面色红润，性格开朗随和，精力充沛，举动灵活，睡眠良好。属于

- A 阳亢质

- B 痰湿质
- C 偏阳质
- D 偏阴质
- E 阴阳平和质

答案：E

阴阳平和质,是指强健壮实、功能比较协调的体质类型。体质特征为：身体强壮，胖瘦适度，体形匀称健壮；面色与肤色虽有五色之偏，但都红黄隐隐，明润含蓄，头发稠密有光泽；鼻色明润，嗅觉通利；食量适中，二便调畅；目光有神，性格开朗、随和；夜眠安和，精力充沛，反应灵活，思维敏捷，能耐寒暑，自身调节和对外适应能力强；唇色红润，舌质淡红，润泽，苔薄白，脉象缓匀有神。

单选题

17、内含朱砂的中成药

- A 服用牛奶、蛋清、豆浆、药用炭等
- B 以土茯苓煎汤饮
- C 以生姜捣汁、鲜芦根捣汁内服
- D 可用肉桂煎汤或甘草煎汤饮服
- E 以白萝卜或白菜捣烂取汁加糖频服

答案：B

本组题考查含毒中药中毒的基本救治原则。其中马钱子及含马钱子的中成药中毒解救可用肉桂煎汤或甘草煎汤饮服；蟾酥及含蟾酥中成药中毒解救可用生姜捣汁、鲜芦根捣汁内服；雄黄及含雄黄的中成药中毒解救可用牛奶、蛋清、豆浆、药用炭等；含朱砂、轻粉、红粉等的中成药中毒解救可用土茯苓煎汤饮。

单选题

18、云南白药酊与对乙酰氨基酚同用，能

- A 形成络合物沉淀
- B 引发肝脏损害
- C 产生永久性结合物
- D 引发永久性耳聋
- E 引发药源性肠炎

答案：B

含乙醇的中成药如各种药酒等，不可与对乙酰氨基酚同服，因同用后二者的代谢产物对肝脏损害严重，有些患者对此类药极为敏感，从而可引起肝坏死及急性肾功能衰竭。

单选题

19、膻中被称为

- A 宗气
- B 中气
- C 营气
- D 卫气
- E 元气

答案：C

营气的生理功能，有营养人体和化生血液两方面。水谷精微中的精专部分，是营气的主要成分，是脏腑、经络等生理活动的主要营养物质。营气注入血脉，则又是血液的组成部分。血液之所以能营养脏腑经络，也主要取决于营气的作用。

单选题

20、根据藏药八性理论，水元偏盛的药物性能是

- A 热、锐
- B 凉、钝
- C 轻、糙
- D 柔、软
- E 重、腻

答案：E

八性理论中，土元偏盛药的性能是：重、腻。八性：重、腻、凉、钝、轻、糙、热、锐。八性源于五元，其中土元偏盛药物性能则重、腻；水元偏盛药物性能则凉、钝；火元偏盛药物性能则热、锐；风元偏盛药物性能则轻、糙。重、腻两性对治特性为轻、糙的隆病；凉、钝两性对治特性为热、锐的赤巴病；轻、糙、热、锐四性对治特性为重、柔、寒、钝的培根病。

单选题

21、属于反治的有

- A 通因通用
- B 塞因塞用
- C 寒因寒用
- D 热因热用
- E 用热远热

答案：C

本组题考查反治。反治是顺从疾病假象而治的一种治疗方法。热因热用:是以热治热，即用热性药物治疗具有假热症状的病证。适用于阴寒内盛，格阳于外，反见热象的真寒假热证。寒因寒用：是以寒治寒，即用寒性药物治疗具有假寒症状的病证。适用于里热盛极，阳盛格阴，反见寒象的真热假寒证。塞因塞用：是以补开塞，即用补虚药治疗具有闭塞不通症状的病证。适用于因虚而闭阻的真虚假实证。通因通用：是以通治通，即用通利的药物治疗具有实性通泄症状的病证。适用于实性通利的真实假虚证。

单选题

22、应通风干燥、防虫蛀的中药是

- A 火麻仁
- B 麻黄
- C 丁香
- D 大枣
- E 甘草

答案：B

饮片所含色素受外界影响发生改变，产生变色，如各种花类药材、麻黄、通草。

单选题

23、因配伍禁忌不宜合用的药组是

- A 六应丸与紫雪散
- B 胆宁片与妙济丸
- C 天麻丸与苏合香丸
- D 牛黄解毒片与金匱肾气丸
- E 附子理中丸与参茸卫生丸

答案：D

含十八反、十九畏的中成药配伍禁忌---附子：大活络丹、尪痹冲剂、天麻丸；川贝、半夏：川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸；依据配伍禁忌原则，若将上述两组合用，附子、乌头与川贝、半夏当属相反禁忌同用之列。郁金：利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片。丁香：六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正气丸、紫雪散；依据配伍禁忌原则，若将上述两组合用，郁金与丁香当属相畏禁忌同用之列。不同功效药物联用的辨证论治和禁忌 ---附子理中丸+牛黄解毒片；附子理中丸+黄连上清丸；金匱肾气丸+牛黄解毒片

单选题

24、因配伍禁忌不宜合用的药组是

- A 益母草膏与妇血康颗粒
- B 妇科千金片与当归四物汤
- C 补中益气丸与金匱顺气丸
- D 附子理中丸与牛黄解毒片
- E 祛痰止咳颗粒与通宣理肺丸

答案：D

如附子理中丸与牛黄解毒片联用，附子理中丸系温中散寒之剂，适用于脾胃虚寒所致的胃脘痛、呕吐、腹泻等；而牛黄解毒片性质寒凉，为清热解毒泻火之剂，适用于火热毒邪炽盛于内而上扰清窍者，可见不加分析地盲目将两者合用是不适宜的。再如，盲目将附子理中丸与黄连上清丸、金匱肾气丸与牛黄解毒片等合用，均属不注意证候的不合理用药。

单选题

25、与宗气生成关系最密切的脏腑是

- A 血虚气亏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058052135062006050>