

临床医学相关知识测试题库含答案

1、女性，25岁，二维心脏超声检查示收缩期尖瓣后叶瓣体脱向左心房，M型不二尖瓣曲线CD段呈吊床样改变，考虑为（ ）

- A、二尖瓣脱垂
- B、二尖瓣重度狭窄
- C、二尖瓣乳头肌断裂
- D、二尖瓣关闭不全
- E、以上都不正确

答案：A

2、超声负荷试验（药物或运动）与超声造影的关系是（ ）

- A、降低超声造影诊断效果
- B、增强超声造影诊断效果
- C、替代超声造影的新技术
- D、不能与超声造影同时应用
- E、可增加患者造影的不良反应

答案：B

3、以下关于酸碱平衡与血钾浓度的相互关系，正确的说法是（ ）

- A、代谢性酸中毒时可引起低血钾
- B、低血钾时可引起代谢性碱中毒
- C、代谢性碱中毒时可引起高血钾
- D、高血钾时可引起代谢性碱中毒
- E、低血钾时可引起代谢性酸中毒

答案：B

4、正常腮腺的解剖位置是（ ）

- A、下颌后窝，咀嚼肌前部的皮下
- B、外耳道下方，下颌前窝
- C、位于外耳道的前下方，下颌支与胸锁乳突肌之间
- D、前缘位于咀嚼肌后部，后壁位于乳突部
- E、前缘位于咀嚼肌中部，后界位于胸锁乳突肌后缘

答案：C

5、超声声束的单位面积能量的名称和单位是（ ）

- A、频率，周期
- B、波长，米
- C、强度，瓦/平方米
- D、速度，厘米/秒

E、声速，米/秒

答案：C

6、下列哪一项描述不符合化脓性脑膜炎的 CT 表现（ ）

A、基底池密度增高

B、增强后脑膜强化

C、脑室壁强化

D、脑实质内低密度区并团块状强化

E、脑室扩大

答案：D

7、先天性肝外胆管囊状扩张特点，不正确的是（ ）

A、发生癌变的概率增高

B、胆总管部位出现椭圆形或纺锤形囊肿

C、囊状扩张内可合并结石

D、囊状扩张与肝管相通

E、好发于胆总管的下部

答案：E

8、（ ）属于甲类传染病（ ）

A、新型冠状病毒肺炎

B、鼠疫

C、人感染高致病性禽流感

D、肺炭疽

E、流行性腮腺炎

答案：B

9、男性，20 岁，瘦长体型，高度近视。心脏超声检查示：升主动脉瘤样扩张，内径为 50mm，主动脉瓣脱垂并反流，诊断为（ ）

A、主动脉瓣上狭窄

B、主动脉瓣关闭不全

C、马方综合征

D、主动脉缩窄

E、主动脉夹层

答案：C

10、脑梗死致脑水肿开始逐渐消退的时间为（ ）

A、3 天

B、1 周

C、2、3 周

D、4 周

E、5 周

答案：C

11、用超声造影测定冠状动脉血流储备的叙述，下列错误的是（ ）

A、药物负荷试验

B、测定基础及负荷状态下冠状动脉血流的超声造影效果

C、用时间-强度曲线表示基础及负荷状态下超声造影效果

D、口服减低心肌收缩力的药物

E、负荷状态与基础状态时的时间-强度曲线下面积的比值

答案：D

12、显微镜检查尿管型时，应观察多少个低倍镜视野（ ）

A、2

B、5

C、10

D、20

E、30

答案：D

13、以下哪种 CT 征象最有助于脑外肿瘤的诊断（ ）

A、边界不清

B、肿瘤沿脑镰或天幕生长

C、同侧脑室受压移位

D、病变与颅板交界呈钝角

E、血管源性水肿

答案：D

14、心肌超声造影检查，对造影剂的要求是（ ）

A、微气泡直径 $<5\mu\text{m}$

B、微气泡的包裹膜要厚

C、微气泡的压缩系数要小

D、微气泡密度要高

E、微气泡直径要大于红细胞

答案：A

15、超声检查使用耦合剂的作用是：①润滑；②排除空气；③增加透声性；

④可以不用（ ）

A、①②

B、②③

C、①②③

D、④

E、③

答案：C

16、超声显示正常胃壁为五层回声，强弱排序从胃壁内至外正确的是（ ）

A、强-弱-强-弱-强

B、强-弱-强-强-弱

C、强-弱-强-弱-弱

D、弱-强-弱-强-弱

E、弱-强-强-弱-强

答案：A

17、超声诊断仪观测病变的基本内容中，错误的是（ ）

A、病变位置与大小

B、病变外形与性质

C、内部回声

D、后方回声

E、邻近关系

答案：B

18、不需做胸部增强扫描的是（ ）

A、明确分辨纵隔结构时

B、明确大气管有无狭窄时

C、区分纵隔肿物与大血管时

D、肿块合并肺不张时

E、分析复杂的大血管畸形时

答案：B

19、胆总管上段走行于门静脉（ ）

A、右前方

B、正前方

C、左方

D、右后方

E、左前方

答案：A

20、胎盘早剥应与下列相鉴别的是：①胎盘后静脉丛；②子宫壁局部收缩；
③胎盘后子宫肌瘤；④胎盘内大血窦（ ）

A、①③

- B、①②④
- C、①②③
- D、①②③④
- E、①④

答案：D

21、关于周围血管彩色多普勒检查注意事项，错误的是（ ）

- A、应进行两侧对比检查
- B、取样容积放置在血管腔中央
- C、多普勒增益调节适中
- D、探头在检查部位的压力宜大不宜小
- E、在检查中病人肌肉要放松

答案：D

22、关于栓塞材料明胶海绵的描述，错误的是（ ）

- A、属基质海绵
- B、能被组织吸收
- C、用一般的血管造影导管即可快速注射
- D、属短期栓塞材料
- E、摩擦系数低

答案：D

23、儿童肾实质性肿瘤最常见的是（ ）

- A、中胚层肾肿瘤
- B、肾母细胞瘤（Wilms 瘤）
- C、神经母细胞瘤
- D、肾细胞癌
- E、肾错构瘤

答案：B

24、于胸骨上窝检测主动脉弓长轴时，在降主动脉起始部的外侧可出现伴行的彩色血流信号，此现象称为（ ）

- A、镜面伪像
- B、衰减伪像
- C、彩色增益调节过高
- D、壁滤波调节过高
- E、壁滤波调节过低

答案：A

25、下列关于鹦鹉热衣原体说法错误的是（ ）

- A、主要引起家禽感染
- B、一般存在于动物肠道
- C、以气溶胶传播
- D、引起肺炎和毒血症
- E、偶可由带菌动物传染给人，主要引起人类泌尿道感染

答案：E

26、关于卵巢浆液性囊腺癌，错误的是（ ）

- A、为成人最常见的卵巢恶性肿瘤
- B、肿瘤生长较快，常伴出血坏死
- C、多为部分实性、部分囊性
- D、乳头可显示血流较丰富
- E、90%为单侧

答案：E

27、男，49岁，癫痫发作3次。CT示左额叶有圆形低密度区，病灶呈不规则环形增强，最大可能是（ ）

- A、化脓性脑炎
- B、胶质瘤
- C、病毒性脑炎
- D、血管畸形
- E、结节性硬化

答案：B

28、关于流（空）动效应的叙述，下列不正确的一种是（ ）

- A、TR越长，流动效应越明显
- B、血管穿过切面的角度影响流动效应
- C、血流速度影响流动效应
- D、对比剂的注射速率影响流动效应
- E、观察静脉窦的流动效应以T2加权图像更佳

答案：D

29、CT平扫图像上，与脑实质相比髓母细胞瘤多数表现为（ ）

- A、等密度
- B、略高密度
- C、低密度
- D、混杂密度
- E、水样密度

答案：B

30、腰椎峡部不连，X线摄片清晰显影于（ ）

- A、正位像
- B、侧位像
- C、斜位像
- D、过伸侧位像
- E、过屈侧位像

答案：C

31、下列关于急性白血病的几种分型方法的叙述，错误的是（ ）

- A、FAB 骨髓细胞形态学分型标准明确，是急性白血病诊断、分型的主要依据，但判断符合率低
- B、免疫学分型方法比 FAB 分型更客观、准确、重复好，还可鉴别白血病细胞的起源、分化阶段及基因克隆的特点，已能取代形态学分型
- C、细胞遗传学分型主要与预后有关
- D、MICM 分型是当今乃至今后的发展方向，对白血病诊断、分型、判断预后及微小残留病检测等具有重要意义
- E、WHO 建议骨髓原始细胞数 $>20\%$ 作为诊断急性白血病的标准

答案：B

32、关于房间隔，下列不正确的是（ ）

- A、是左右心房之间的薄层纤维隔膜
- B、房间隔中部浅的凹陷称卵圆窝
- C、卵圆窝位于胎儿右房侧
- D、若成人卵圆孔未能闭合，称为房间隔缺损
- E、以继发性房间隔缺损最为多见

答案：D

33、对冠状静脉窦扩大者，从左肘静脉注射超声造影剂见冠状静脉窦显影后右心房显影，而从右肘部位注射则冠状静脉窦内无造影剂，此病可能是（ ）

- A、永存左上腔静脉
- B、心内型肺静脉异位引流
- C、心上型肺静脉异位引流
- D、心下型肺静脉异位引流
- E、混合型肺静脉异位引流

答案：A

34、下列属于后天性心脏病的是（ ）

- A、主动脉弓中断
- B、主动脉瓣上狭窄

- C、Valsalva 窦瘤
- D、主动脉瓣二瓣畸形
- E、主动脉夹层

答案：E

35、主动脉瓣关闭不全的病理生理变化，最主要是（ ）

- A、左心室充盈量减少
- B、左心室充盈量增加
- C、左心室压力超负荷
- D、左心室容量超负荷
- E、主动脉运动幅度增大

答案：D

36、输尿管扩张的最常见原因是（ ）

- A、输尿管肿瘤
- B、输尿管结核
- C、输尿管结石
- D、腹膜后肿瘤压迫
- E、输尿管先天性畸形

答案：C

37、下列哪项不宜通过纤维支气管镜检进行治疗（ ）

- A、取气管、支气管内异物
- B、肿瘤的电凝、电切或激光治疗
- C、病灶局部药物注射
- D、止血治疗
- E、气胸时经支气管抽气治疗

答案：E

38、关于纵隔肿瘤，下列知识哪项不对（ ）

- A、多数纵隔肿瘤都有其好发部位
- B、前纵隔：多为胎生性囊肿和胸腺瘤
- C、中纵隔：多为恶性淋巴瘤
- D、转移瘤：纵隔影常对称性增宽
- E、胸片难以区分胸腺瘤和畸胎瘤

答案：D

39、对于程控 X 线机，下列哪种说法不正确（ ）

- A、kV、mAs
- B、采用数字显示

- C、采用 CPU 进行监测
- D、设有透视定时电路
- E、采用 CPU 控制高压频率

答案：E

40、当声波通过两种不同介质的界面时会发生折射是因为（ ）

- A、声阻抗
- B、介质的声速
- C、介质的密度
- D、传播途径
- E、传播方式

答案：A

41、下列描述肺动脉高压，错误的是（ ）

- A、右心室阻力负荷增加
- B、右心房和右心室增大
- C、左心室壁增厚
- D、室间隔运动异常
- E、右心室壁增厚

答案：C

42、肝的脏面方位是向（ ）

- A、下、后和左
- B、下、后和右
- C、上、后和左
- D、上、前和右
- E、下、前和左

答案：A

43、正常乳房的结构由浅至深依次为（ ）

- A、皮肤、皮下脂肪、浅筋膜浅层、乳腺腺体、浅筋膜深层、胸大肌及肋骨等
- B、皮肤、浅筋膜浅层、皮下脂肪、乳腺腺体、浅筋膜深层、胸大肌及肋骨等
- C、皮肤、浅筋膜浅层、皮下脂肪、乳腺腺体、胸大肌及肋骨等，浅筋膜深层
- D、皮肤、皮下脂肪、浅筋膜浅层、乳腺腺体、胸大肌及肋骨等、浅筋膜深层
- E、皮肤、浅筋膜、皮下脂肪、乳腺腺体、深筋膜、胸大肌及肋骨等

答案：A

44、室间隔缺损继发肺动脉高压，下列能最早称为艾森门格综合征的是（ ）

- A、当室水平发生右向左分流时
- B、当右心室扩大并室壁增厚时
- C、当室水平发生双向分流时
- D、当右心房显著扩大时
- E、当室水平发生左向右分流时

答案：C

45、下列哪种疾病可出现肺血减少的X线征象是（ ）

- A、室间隔缺损
- B、风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- C、原发性肺动脉高压
- D、高血压性心脏病
- E、房间隔缺损

答案：C

46、目前3D容积超声成像技术主要应用于（ ）

- A、心脏和大血管
- B、腹部脏器
- C、产科
- D、眼部
- E、甲状腺

答案：C

47、下列彩色血流显像的特点，错误的是（ ）

- A、朝向探头血流，显示红色
- B、背离探头血流，显示蓝色
- C、血流速度越快，色彩的亮度越亮
- D、血流出现紊流时显示为红蓝相杂的五彩色
- E、动脉血流显示为红色，静脉血流显示为蓝色

答案：E

48、10MHz探头在软组织中的纵向分辨力的理论值大约是（ ）

- A、0.075mm
- B、0.15mm
- C、0.03mm
- D、0.75mm
- E、0.35mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058062055010006036>