

2024 年浙江省仙居县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库（历年真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是（）。

- A: 混合型高脂血症 TC 和 TG 均增高
- B: 高三酰甘油血症主要为 TG 升高，而 TC 正常或轻度增加
- C: 低高密度脂蛋白血症 TC 水平明显增高，TG 正常或偏高
- D: 高胆固醇血症 TC 增高，TG 正常

答案：C

2. 药师审核处方"用药与病症诊断不相符"工作中，所遇到的典型问题不包括

- A: 有禁忌证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 联合用药
- D: 无适应证用药

答案：C

3. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 氟马西尼
- B: 纳洛酮
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 亚甲蓝

答案：A

4. (2017 年真题) 患者男, 65 岁, 身高 170cm, 体重 60kg, 经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测 (肌酐清除率 45ml/min), 诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全, 该患者应首选的药物是

- A: 格列吡嗪
- B: 格列齐特
- C: 格列喹酮
- D: 格列本脲

答案: C

5. 泡腾片的注意事项是

- A: 宜用温开水送服, 直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适
- B: 不宜在口中久含, 以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的
- C: 用后应漱口
- D: 不宜直接给患者服用, 应溶解在水中服用, 以免引起窒息

答案: D

6. 患者, 女, 52 岁, 近年来发现手关节肿痛, 且呈对称性, 并有畸形, 晨起时有僵硬现象持续 1 小时, 疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h, 指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

- A: 环孢素
- B: 来氟米特
- C: 甲氨蝶呤
- D: 柳氮磺吡啶

答案: C

7. 患者，男，35 岁。血压 180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗 3 周后血压降至 120/80mmHg，关于停药的问题应是
- A: 为避免血压下降过低，应停药
- B: 可以停药降压药
- C: 继续服药，血压平稳控制 1~2 年后再逐渐减少剂量至停药 1 种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量
- D: 停药后血压增高再服

答案：C

8. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是
- A: 血浆蛋白结合率高的药物
- B: 分布容积小的药物
- C: 分子量>500 的药物
- D: 低水溶性的药物

答案：B

9. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0.5g / 片)，该患者适宜的用法用量是
- A: 6 片 qd
- B: 2 片 tid
- C: 1 片 tid
- D: 4 片 qd

答案：C

10. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是 ()
- A: 0.009

B: 0.01

C: 0.1

D: 0.1

答案：B

11. 下面有关帕金森病治疗的说法错误的是

A: 康复与心理治疗是帕金森病治疗中重要的辅助措施

B: 司来吉兰适用于帕金森病早期阶段，胃溃疡患者慎用；其可以与 5-羟色胺再摄取抑制剂一起提高疗效

C: 药物治疗在病程晚期多数疗效不佳

D: 药物治疗的目标是延缓疾病进展，尽可能延长症状控制的年限

答案：B

12. (2015 年真题) 易经乳汁分泌的药物的特征是 ()。

A: 分子量大

B: 弱酸性

C: 脂溶性大

D: 蛋白结合率高

答案：C

13. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

A: 奥美拉唑

B: 红霉素

C: 洛伐他汀

D: 青霉素

答案：C

14. (2018 年真题) 患者,男,60 岁,因上臂出现湿疹到药店购药,药师应推荐的药品是 ()

- A: 氢化可的松软膏
- B: 利巴韦林软膏
- C: 10%樟脑软膏
- D: 特比萘芬乳膏

答案: A

15. 患者,女,8 岁,体重 22kg,因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊,症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前,先出现病毒性上呼吸道感染的症状(咽喉痛、流涕和咳嗽)3 天。在过去的 2 年,患者有过几次急性支气管炎发作,并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体:中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音,偶尔咳嗽,呼气相延长,胸部过度膨胀,胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声,左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次/分、血压 110/83mmHg、心率 130 次/分、体温 37.8℃,动脉血气分析血氧饱和度(SaO₂) 90%。

- A: 雾化噻托溴铵
- B: 口服泼尼松龙,0.5~1.0mg/kg,持续 5~7 日
- C: 口服福莫特罗
- D: 雾化大剂量布地奈德

答案: C

16. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

- A: 1%氯化钠
- B: 3%过氧化氢
- C: 1%硫酸镁
- D: 1%硫酸铜

答案：C

17. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

- A: 乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用
- B: 输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿
- C: 排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性
- D: 胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强

答案：B

18. （2015 年真题）下列药物属于肝药酶诱导剂的是（ ）。

- A: 氟康唑
- B: 卡马西平
- C: 胺碘酮
- D: 环丙沙星

答案：B

19. 关于患者用药注意事项的说法错误的是()

- A: 在患者症状好转后,应立即停用比索洛尔
- B: 应定期监测地高辛血药浓度
- C: 应注意观察是否有黑便
- D: 应定期监测血压、心率

答案：A

20. （2019 年真题）患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

- A: 格列齐特
- B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 吡格列酮

答案: D

21. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A: 《中国国家处方集》

B: 《新编药物学》

C: 《梅氏药物副作用》

D: 《中华人民共和国药典》

答案: C

22. 肠外营养 1g 脂肪能提供的热量是

A: 3kcal

B: 7kcal

C: 4kcal

D: 9kcal

答案: D

23. 老年人应该避免使用与疾病状态相关的潜在不适当用药。以下用于判断老年患者潜在不适当用药的依据是

A: Bayesian 反馈法

B: CTP 评分标准

C: Beers 标准

D: 数字评分法

答案: C

24. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是 ()

A: 东莨菪碱片

- B: 阿米洛利片
- C: 氟桂利嗪胶囊
- D: 左甲状腺素钠片

答案：D

25. 磺胺类药物用于抗感染不宜食用的是

- A: 食盐
- B: 脂肪
- C: 蛋白质
- D: 食醋

答案：D

26. 麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

- A: 患者身份证明编号
- B: 药品名称、剂型、规格、数量
- C: 临床诊断
- D: 患者姓名、性别

答案：A

27. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 双氯芬酸钠
- B: 尼美舒利
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 美洛昔康

答案：C

28. 消化不良患者宜选用

- A: 小檗碱
- B: 干酵母
- C: 阿苯达唑
- D: 乳果糖

答案: B

29. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等
- B: 内容全面、细致
- C: 内容广泛、使用方便
- D: 提供的信息丰富、详实

答案: C

30. 解救氰化物中毒的是（）

- A: 纳洛酮
- B: 双复磷
- C: 亚硝酸钠
- D: 二巯丁二钠

答案: C

31. 患者，女性，62 岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

- A: 巴曲酶
- B: 肝素
- C: 华法林

D: 氯吡格雷

答案：D

32. 处方是医院药品消耗及药品经济收入结帐的凭证和原始依据

A: 经济性

B: 技术性

C: 法律性

D: 有效性

答案：A

33. (2018 年真题) 患儿, 14 岁, 体重 50kg, 体温 38.7℃, 使用布洛芬退热。单次给药剂量是 ()

A: 300~600mg

B: 10~15mg

C: 500~1000mg

D: 200~400mg

答案：D

34. 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是 ()

A: 华法林与人参同服

B: 异烟肼与牛奶同服

C: 硫酸亚铁与维生素 C 同服

D: 左甲状腺素与钙剂同服

答案：C

35. 蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性, 可导致左心室功能受损、心衰等, 可以采用何种药物预防 ()

- A: 阿托品
- B: 辅酶 Q
- C: 硝苯地平
- D: 普萘洛尔

答案：B

36. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

- A: 尼莫地平注射液 20mgqdiv
- B: 甘露醇注射液 250mlq6hiv
- C: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv
- D: 呋塞米片 200mgqdp0

答案：B

37. (2018 年真题) 患者,女,47 岁,出现一侧颜面部骤然发作性闪痛,诊断为三叉神经痛,应选用的药物是 ()

- A: 布洛芬
- B: 卡马西平
- C: 山莨菪碱
- D: 麦角胺咖啡因

答案：B

38. 服药期间宜多喝水的药物

- A: 苯溴马隆
- B: 左旋多巴
- C: 苯妥英钠

D: 琥珀酸亚铁

答案: A

39. (2016 年真题) 与左旋多巴合用, 可提高疗效的是 ()。

A: 苄丝肼

B: 奥美拉唑

C: 克拉维酸钾

D: 叶酸

答案: A

40. 女, 37 岁, 前来药店购买退热药, 药师应进行的咨询与指导, 错误的是

A: 顾客告知自己母亲 72 岁, 有慢阻肺病史, 昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽, 前来替母亲购药, 药师应建议顾客带家属就医, 不宜自我药疗

B: 若经过咨询得知顾客是为家里 3 岁女儿购买, 不应推荐阿司匹林

C: 如果得知顾客为本人购药, 且已经服用过对乙酰氨基酚 3 日, 症状未缓解, 药师可建议患者联合服用布洛芬口服液

D: 如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液, 应告知患者 3 天后症状未缓解需及时就医

答案: C

41. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

A: 胃肠道反应

B: 神经系统疾病

C: 血液系统疾病

D: 肌病

答案: D

42. “主要对成本进行量化分析，也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指

- A: 最小成本分析方法
- B: 成本-效益分析方法
- C: 最大效果分析方法
- D: 成本-效用分析方法

答案：A

43. 非甾体抗炎药的不良反应,引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

- A: 塞来昔布
- B: 保泰松
- C: 美洛昔康
- D: 布洛芬

答案：C

44. 黏膜保护剂

- A: 埃索美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：D

45. 可引起视物模糊、辨色困难的药物是

- A: 氯苯那敏
- B: 东莨菪碱
- C: 阿米洛利

D: 右美沙芬

答案: B

46. 稳定型心绞痛发作应首选的药物是

A: 氨氯地平

B: 美托洛尔

C: 硝酸甘油

D: 单硝酸异山梨酯

答案: C

47. 适用于年轻、震颤突出的患者

A: 左旋多巴

B: 恩托卡朋

C: 苯海索

D: 司来吉兰

答案: C

48. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 协同作用

B: 竞争性拮抗作用

C: 敏感化作用

D: 减少不良反应

答案: C

49. (毒物及药物中毒解救)，二巯丙醇用于解救

A: 有机磷中毒

B: 水银中毒

C: 氰化物中毒

D: 吗啡中毒

答案：B

50. 不良反应的评价结果分为 6 级, 报表内容填写不齐全, 等待补充后再评价, 或因果关系难以定论, 缺乏文献资料佐证, 药品不良反应因果关系评价结果为

A: 肯定

B: 很可能

C: 待评价

D: 可能无关

答案：C

51. 下列药品中, 应该贮存在棕色玻璃瓶内的是

A: 硫酸镁

B: 硫糖铝片

C: 狂犬疫苗

D: 硝酸甘油片

答案：D

52. 静脉滴注给药前不宜选用氯化钠注射液溶解或稀释, 以免出现浑浊的药品是

A: 瑞替普酶

B: 阿昔洛韦

C: 依托泊苷

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：D

53. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是()

A: 聚乙二醇 4000

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 番泻叶

答案：D

54. (2018 年真题) 患者, 女, 21 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次/分, 化验结果: 血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝肾功能基本正常, 白细胞计数正常, 诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

A: 碘化钾治疗, 定期复查

B: 注意休息补充营养, 使用甲巯咪唑治疗

C: 甲状腺次全切除手术

D: 选用 ^{131}I 治疗

答案：B

55. “滴、量滴、滴剂”的外文缩写为 ()。

A: qod

B: Ad

C: Add

D: gtt

答案：D

56. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是 ()

A: 维生素 C

B: 阿仑膦酸钠

C: 美托洛尔

D: 特拉唑嗪

答案: B

57. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 铁剂联用维生素

B: 阿托品联用普萘洛尔

C: 山莨菪碱联用哌替啶

D: 阿托品联用吗啡

答案: C

58. 老年糖尿病患者宜选用的药物是

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 罗格列酮

D: 格列喹酮

答案: A

59. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降，引起药源性疾病的因素主要为

A: 遗传因素

B: 年龄因素

C: 基础疾病因素

D: 性别因素

答案: D

60. (2018 年真题) 根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为 ()

- A: 100mg
- B: 50mg
- C: 500~600mg
- D: 2000~4000mg

答案：C

61. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 无适应证用药
- B: 未使用药品规范名称
- C: 有配伍禁忌
- D: 用法、用量或联合用药不适宜

答案：B

62. (2016 年真题) 缓解视疲劳可选用的药物是 ()。

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：C

63. 药学服务的对象涉及面广，其服务中心是 ()。

- A: 以医师为中心的药学服务
- B: 以医院为中心的药学服务
- C: 以药师为中心的药学服务

D: 以患者为中心的药学服务

答案：D

64. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 叶酸

B: 右旋糖酐铁

C: 葡萄糖酸亚铁

D: 琥珀酸亚铁

答案：A

65. (2015 年真题) 治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是 ()。

A: 有效性

B: 经济性

C: 依从性

D: 安全性

答案：C

66. 糖尿病合并肾病者应首选的药物是

A: 格列喹酮

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 罗格列酮

答案：A

67. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

A: 37.0℃～38.3℃

B: 37.4℃～38.0℃

C: 39.1℃～41.0℃

D: 38.1℃～39.0℃

答案：D

68. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 右美沙芬

B: 愈创木酚甘油醚

C: 伪麻黄碱

D: 苯海拉明

答案：C

69. 新生儿体内水溶性药物排出较慢、容易中毒，其主要机制是患儿总体液量占体重的

A: 80%～85%

B: 70%～75%

C: 65%～70%

D: 75%～80%

答案：D

70. 支气管扩张的临床表现是

A: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

B: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

C: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2～3 个月

D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：D

71. 关于治疗药物监测的论述，错误的是

A: 治疗药物监测的常用英文缩写是“TDM”

B: 是临床药学服务的重要内容之一

C: 治疗药物监测可以实现给药个体化

D: 所有的治疗药物都必须进行监测

答案：D

72. 属于 P-糖蛋白抑制剂的药物是

A: 维拉帕米

B: 卡马西平

C: 圣约翰草提取物

D: 利福平

答案：A

73. 美金刚的作用机制为（）

A: 钙通道阻滞剂

B: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体

C: 脑循环改善剂

D: 抑制胆碱酯酶

答案：B

74. 美国心脏病学院与美国心脏协会 2014 年颁布成人降胆固醇治疗降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险指南，强调他汀类药物在降低急性冠脉综合征风险方面的获益表明

A: 改变降脂治疗观念

- B: 有助个体化给药
- C: 列为行政决策的依据
- D: 有利诊断特殊疾患

答案：A

75. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 有禁忌证用药
- B: 无适应证用药
- C: 无正当理由过度治疗用药
- D: 无正当理由超适应证用药

答案：D

76. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准未经严格论证或评估的专家意见在循证医学价中的证据级别属于()

- A: 3 级
- B: 1 级
- C: 2 级
- D: 5 级

答案：D

77. 适用轻中度肾功不全者的是由肝胆排泄的

- A: 甲苯磺丁脲
- B: 格列喹酮
- C: 格列本脲
- D: 格列吡嗪控释片

答案：B

78. 用于癌性胸水

A: 腔内注射

B: 动脉注药

C: 静脉注射

D: 肌内注射

答案：A

79. (2019 年真题) 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称“鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是

A: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平

B: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦

C: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定

D: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦

答案：A

80. 氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为. ()。

A: 新霉素>阿米卡星>链霉素>妥布霉素

B: 阿米卡星>新霉素>妥布霉素>链霉素

C: 庆大霉素>新霉素>妥布霉素>链霉素

D: 新霉素>阿米卡星>妥布霉素>链霉素

答案：D

81. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

A: 吲哚美辛

B: 布洛芬

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案: C

82. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

A: 75~100mgbid，长期维持

B: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg；随后 75~100mgqd，长期维持

C: 100-150mgqd，长期维持

D: 25~50mgqd，长期维持

答案: B

83. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

A: 哌唑嗪

B: 普伐他汀

C: 曲美他嗪

D: 左旋氨氯地平

答案: D

84. 下列药物中，适用于压力性尿失禁的药物为

A: 非那雄胺

B: 索利那新

C: 哌唑嗪

D: 米多君

答案: D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/058114112121007022>