

临床技能学-南方医科大学-中国大学MOOC慕课答案

第一章测试题

1、单选题：下列关于体表肿物切除术的术前准备，那一项是错误的：

选项：

- A、术前沟通，让患者了解手术的目的
- B、签署手术同意书
- C、不需要测量生命体征
- D、准备手术器械

参考：【**不需要测量生命体征**】

2、单选题：常用于较大张力切口的加固缝合，为避免缝线割裂皮肤，在结扎前缝线上需上一套管作为垫护，这种缝合方法是：

选项：

- A、荷包缝合
- B、减张缝合
- C、毯边缝合
- D、皮内缝合

参考：【**减张缝合**】

3、单选题：对于患侧肢体存在进行性肿胀的患者，以下哪种石膏不建议使用

选项：

- A、石膏夹板
- B、U型石膏托
- C、石膏管型
- D、石膏单托

参考：【**石膏管型**】

4、单选题：以下哪种情况不建议用关节腔穿刺：

选项：

- A、出血性疾病者
- B、老年患者
- C、疑似关节感染病人
- D、关节积液者

参考：【**出血性疾病者**】

5、单选题：下列关于胸腔闭式引流术的注意事项，哪一项是错误的：

选项：

- A、排气放液不宜过快
- B、置管后病人取半卧位，以利引流
- C、置管后要避免患者咳嗽及深呼吸
- D、每天观察记录引流液量

参考：【**置管后要避免患者咳嗽及深呼吸**】

6、单选题：下列哪项是直肠指诊的禁忌证：

选项：

- A、肛痿
- B、月经来潮
- C、骶骨骨折
- D、新鲜肛裂

参考：【新鲜肛裂】

7、单选题：以下哪种情况不建议用关节腔穿刺：

选项：

- A、出血性疾病者
- B、老年患者
- C、疑似关节感染病人
- D、关节积液者

参考：【出血性疾病者】

8、单选题：胫骨结节的牵引重量一般为：

选项：

- A、体重的1/7
- B、体重的1/3
- C、体重的1/12
- D、1kg

参考：【体重的1/7】

9、单选题：下列关于输血的注意事项，哪一项是正确的：

选项：

- A、输血前应由2人进行信息核对
- B、血液在输注前需要升温至体温
- C、输血后可以直接输注其他药物
- D、输血后血袋可直接丢入黄色医疗废物桶内

参考：【输血前应由2人进行信息核对】

10、单选题：35岁男性，因臀部脂肪瘤行手术切除治疗，常规拆线时间为术后

选项：

- A、5天
- B、8天
- C、10天
- D、14天

参考：【8天】

11、单选题：哪种清创技术与方法是基于创面“湿性愈合理论”

选项：

- A、超声清创法
- B、机械性清创法
- C、自溶性清创法
- D、生物清创法

参考：【自溶性清创法】

12、单选题：颅骨牵引的重量为

选项：

- A、10kg
 - B、5kg
 - C、1kg
 - D、第1、2颈椎用4kg，以后每下降一个椎体增加1kg
- 参考：【第1、2颈椎用4kg，以后每下降一个椎体增加1kg】

13、多选题：无菌术内容包括

选项：

- A、灭菌
- B、消毒法
- C、操作规则
- D、管理制度

参考：【灭菌#消毒法#操作规则#管理制度】

14、多选题：哪些情况需提前拆线

选项：

- A、切口术后红肿者
- B、切口术后局部皮温明显升高者
- C、切口术后局部疼痛明显者
- D、切口正常，愈合良好者

参考：【切口术后红肿者#切口术后局部皮温明显升高者#切口术后局部疼痛明显者】

15、多选题：以下关于清创术并发症的处理正确的是

选项：

- A、合理使用抗菌药和破伤风抗毒素或免疫球蛋白
- B、术后应观察伤口有无红肿、压痛、渗液及分泌物等感染征象，一旦出现应拆除部分乃至全部缝线敞开引流
- C、术后应适当抬高伤肢，以利血液和淋巴回流
- D、注意定期观察伤肢血供、感觉和运用功能

参考：【合理使用抗菌药和破伤风抗毒素或免疫球蛋白#术后应观察伤口有无红肿、压痛、渗液及分泌物等感染征象，一旦出现应拆除部分乃至全部缝线敞开引流#术后应适当抬高伤肢，以利血液和淋巴回流#注意定期观察伤肢血供、感觉和运用功能】

16、多选题：下面哪些情况不适宜做皮牵引

选项：

- A、年迈体弱，全身状态不佳易发生意外者
- B、局部皮肤受损者
- C、对胶布或塑料等过敏者
- D、局部血液循环受累

参考：【年迈体弱，全身状态不佳易发生意外者#局部皮肤受损者#对胶布或塑料等过敏者#局部血液循环受累】

17、多选题：高压蒸汽灭菌法多用于以下哪些物品的消毒灭菌

选项：

- A、金属器械
- B、玻璃
- C、敷料

D、缝线

参考：【**金属器械#玻璃#敷料**】

18、多选题：直肠指诊的适应证包括

选项：

A、肛肠疾病

B、男科疾病

C、妇科疾病

D、骨科疾病

E、肠道感染性疾病

参考：【**肛肠疾病#男科疾病#妇科疾病#骨科疾病#肠道感染性疾病**】

19、判断题：带缝线的伤口，若出现感染，如未到拆线时间，不应拆线。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【**错误**】

20、判断题：脓腔切开后常规引流，可使用凡士林纱条、碘仿纱条、橡皮条、引流管等。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【**正确**】

21、判断题：近关节处的缝线可在术后10天进行拆线

选项：

A、正确

B、错误

参考：【**错误**】

22、判断题：局部封闭治疗常用药物搭配是激素加皮质醇

选项：

A、正确

B、错误

参考：【**错误**】

大家来找茬

第二章单元测试

1、单选题：关于女性患者做心电图，不正确的是：

选项：

A、如为男医师，需有一名女性医务工作者陪同

B、注意保护患者隐私

C、应把患者乳房上推，使V3、V4、V5的电极安置在胸壁上

D、根据两乳头连线中点进行第四肋间隙定位

参考：【**根据两乳头连线中点进行第四肋间隙定位**】

2、单选题：动脉血标本送入血气分析仪前，除了输入患者吸氧浓度外，还需输入患者

选项：

- A、心率
- B、呼吸频率
- C、血压
- D、体温

参考：【**体温**】

3、单选题：患者刘某，男性，48岁，因反复腹胀伴双下肢水肿2年，呕血2小时入院。予以三腔二囊管压迫止血，在插管过程中患者心电监护提示心动过缓。患者目前最需要做的处理是

选项：

- A、输血
- B、立刻停止操作并抽出囊内气体
- C、注射阿托品
- D、注射肾上腺素
- E、利尿

参考：【**立刻停止操作并抽出囊内气体**】

4、单选题：对患者行左侧胸腔穿刺抽液，术中突然出现面色苍白、大汗、心慌胸闷。以下说法错误的是

选项：

- A、考虑可能出现胸膜反应
- B、更换穿刺部位继续操作
- C、立即停止操作
- D、给予吸氧，必要时给予肾上腺素
- E、密切观察患者反应，监测生命体征

参考：【**更换穿刺部位继续操作**】

5、单选题：血气分析前进行动脉血标本的采集处理中，下列做法错误的是：

选项：

- A、以肝素抗凝
- B、立即送检
- C、不需与空气隔绝
- D、抽血后将针头扎入胶塞并摇匀血液标本

参考：【**不需与空气隔绝**】

6、单选题：关于心肌梗死心电图的定位，下列哪项是错误

选项：

- A、V1、V2、V3提示前间壁梗塞
- B、V1至V5提示广泛前壁梗塞
- C、II、III、aVF提示下壁梗塞
- D、I、aVL提示正后壁梗塞

参考：【**I、aVL提示正后壁梗塞**】

7、单选题：患者，男，42岁，因“胸闷、腹胀、少尿2月”就诊。查体：肝性面容，腹部明显膨隆，左下腹可见静脉曲张，腹壁张力高，移动性浊音阳性，液波震颤阳性。既往有乙肝病史。患者目前最需要做的处理是

选项：

- A、输注白蛋白

- B、腹腔穿刺术
- C、导尿术
- D、膀胱穿刺造瘘
- E、利尿

参考：【**腹腔穿刺术**】

8、单选题：血气分析前进行动脉血标本的采集处理中，下列做法错误的是
选项：

- A、以肝素抗凝
- B、立即送检
- C、不需与空气隔绝
- D、抽血后将针头扎入胶塞并摇匀血液标本

参考：【**不需与空气隔绝**】

9、多选题：下面哪些为同步电复律前的准备工作
选项：

- A、吸氧
- B、开放静脉通路
- C、进行心电监护
- D、常规做心电图检查

参考：【**吸氧#开放静脉通路#进行心电监护#常规做心电图检查**】

10、多选题：下面哪些不属于腰椎穿刺术适应证
选项：

- A、休克患者
- B、蛛网膜下腔出血
- C、穿刺部位感染
- D、凝血功能异常

参考：【**休克患者#穿刺部位感染 #凝血功能异常**】

11、多选题：使用无创呼吸机的相对禁忌证有
选项：

- A、排痰障碍
- B、PaO₂为43mmHg
- C、血压75/30mmHg
- D、近期上腹部术后需胃肠减压

参考：【**排痰障碍#PaO₂为43mmHg#近期上腹部术后需胃肠减压**】

12、多选题：以下哪项是违反腰椎穿刺术的无菌原则
选项：

- A、没有铺单直接打麻药
- B、铺单后挪动孔巾位置使穿刺点位于其中央位置
- C、助手未戴手套直接给主操传递腰穿包内物品
- D、拔针后直接覆盖辅料

参考：【**没有铺单直接打麻药#铺单后挪动孔巾位置使穿刺点位于其中央位置#助手未戴手套直接给主操传递腰穿包内物品#拔针后直接覆盖辅料**】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058124140022006033>