

2024 年甘肃省秦安县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题及答案【精选题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

- A: 维生素 B
- B: 维生素 E
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B

答案：C

2. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 利妥昔单抗
- B: 英夫利昔单抗
- C: 西妥昔单抗
- D: 贝伐单抗

答案：A

3. 患者，女，55 岁，2 型糖尿病史 5 年；心律失常病史 2 年长期使用胺碘酮治疗。关于胺碘酮的不良反应的说法，错误的是

- A: 可致甲状腺功能减退较为常见发病隐匿
- B: 可掩盖低血糖症状（如心悸、手抖），但低血糖的其他症状（如出汗）仍然存在
- C: 可致肺毒性，早期一般表现为咳嗽，但病情发展时可出现发热和呼吸困难，表现为急性肺炎

D: 可致甲状腺功能亢进,同时会加重心房颤动或出现快速室性心律失常

答案: B

4. 临床常用于治疗结核病的药物是

A: 甲硝唑

B: 链霉素

C: 两性霉素 B

D: 阿奇霉素

答案: B

5. 阻断白三烯受体,起效缓慢,作用较弱,仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是 ()

A: 沙美特罗

B: 氟替卡松

C: 孟鲁司特

D: 茶碱

答案: C

6. 主要经胆汁排泄的抗生素是

A: 青霉素

B: 头孢哌酮

C: 美洛西林

D: 头孢甲肟

答案: B

7. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

A: 大剂量碘

B: 小剂量碘

C: 甲状腺素

D: 甲巯咪唑

答案: D

8. 使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

A: 频繁静脉输注给药

B: 同时使用氨基糖苷类药物

C: 快速静脉输注给药

D: 口服方式给药

答案: D

9. 关于链激酶的叙述不正确的是

A: 可促使纤溶酶原激活形成纤溶酶

B: 链球菌感染可增强其作用

C: 对各种早期栓塞有溶解作用

D: 是 β 溶血链球菌产生的一种蛋白质

答案: B

10. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

A: 阿托伐他汀

B: 阿昔莫司

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案: D

11. 以下适应证与其他四个药物不同的是

A: 联苯苄唑

B: 特比萘芬

C: 制霉菌素

D: 克霉唑

答案: C

12. 属于促凝血因子合成药的是

A: 鱼精蛋白

B: 氨甲环酸

C: 酚磺乙胺

D: 甲萘氢醌

答案: D

13. 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是()

A: 干扰微管蛋白的合成

B: 直接抑制拓扑异构酶, 并与拓扑异构酶形成复合物

C: 抑制二氢叶酸还原酶, 使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸

D: 与 DNA 发生共价结合, 使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂

答案: A

14. 已发生超敏反应, 用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

A: 注射用柔红霉素

B: 注射用盐酸博来霉素

C: 紫杉醇注射液

D: 注射用硫酸长春新碱

答案: C

15. 肝素应用过量可注射

- A: 鱼精蛋白
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 氨基苯酸
- D: 维生素 K

答案：A

16. 为高分子聚合物，通过增加局部渗透压软化大便，对肠道 pH 没有影响的是

- A: 开塞露
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 酚酞
- D: 乳果糖

答案：B

17. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

- A: 磺胺甲唑
- B: 格列喹酮
- C: 甲状腺素
- D: 普萘洛尔

答案：C

18. （2018 年真题）可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻，具有固定和清除多种病原体和毒素药物是（）

- A: 洛哌丁胺
- B: 地芬诺酯
- C: 番泻叶
- D: 蒙脱石散

答案：D

19. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 苯唑西林
- B: 青霉素 V
- C: 哌拉西林
- D: 氨苄西林

答案：A

20. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

- A: CYP2C19
- B: CYP286
- C: CYP3A4
- D: CYP2D6

答案：A

21. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

- A: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- B: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- C: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松
- D: 新生儿对头孢曲松不敏感

答案：C

22. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

- A: 高血压危象
- B: 红人综合征
- C: 急性肝衰竭
- D: 血糖异常

答案：B

23. 只有肾脏为其主要的排泄脏器 β 受体阻断剂是

- A: 普萘洛尔
- B: 美托洛尔
- C: 比索洛尔
- D: 阿替洛尔

答案：D

24. 通过抑制 HMG-CoA 还原酶调血脂的药物是

- A: 依折麦布
- B: 烟酸
- C: 洛伐他汀
- D: 阿昔莫司

答案：C

25. 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是

- A: 更昔洛韦滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 四环素可的松眼膏

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 利巴韦林滴眼液

答案: C

26. 下列可用于治疗哮喘的是

- A: 氮革斯汀
- B: 孟鲁司特
- C: 氯苯那敏
- D: 氯雷他定

答案：B

27. 属于雌激素类的是()

- A: 甲地孕酮
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 睾酮

答案：B

28. 属于硝基咪唑类的是()

- A: 呋喃妥因
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 夫西地酸
- D: 甲硝唑

答案：D

29. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 阻断 CTZ 的 D
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 阻断 H
- D: 抑制胃壁细胞的 H

答案：C

30. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是

- A: 红霉素
- B: 氯霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 青霉素

答案：C

31. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

- A: 湿疹
- B: 变态反应性疾病
- C: 肾病综合征
- D: 抑制器官移植急性排斥危象

答案：D

32. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

- A: 缬沙坦
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 吲达帕胺

答案：A

33. 适用于晚期前列腺癌患者的是

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺
- D: 曲妥珠单抗

答案：C

34. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

- A: 煤焦油类
- B: 补骨脂素及其衍生物
- C: 重金属元素及其化合物
- D: 肾上腺皮质激素类

答案：A

35. 下列关于 5α 还原酶抑制剂的描述，错误的是

- A: 可以缩小前列腺体积
- B: 对膀胱颈和平滑肌没有作用
- C: 与 $\alpha 1$ 受体阻断剂相比，更易引起性功能障碍
- D: 是有性生活要求的患者治疗 BPH 的一线用药的

答案：D

36. 不属于茶碱适应证的是

- A: 阻塞性肺气肿
- B: 喘息型支气管炎
- C: 过敏性鼻炎
- D: 支气管哮喘

答案：C

37. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

- A: 羟喜树碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 卡莫氟
- D: 来曲唑

答案：A

38. 亲脂性较强，易通过血-脑屏障

A: 卡莫司汀

B: 巯嘌呤

C: 氟尿嘧啶

D: 环磷酰胺

答案：A

39. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的是

A: 氨苯蝶啶

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 阿米洛利

答案：B

40. 服用 5 型磷酸二酯酶抑制剂可导致

A: 刺激性干咳

B: 视物模糊、复视

C: 肾功能异常

D: 高血压

答案：B

41. 下列药物中，没有降低眼压作用的药物是()

A: 阿托品

B: 比马前列素

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

答案：A

42.（2016 年真题）减少钠离子内流而使神经细胞稳定，属于乙内酰脲类的是抗癫痫药

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案：B

43.（2018 年真题）可与 PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是（）

- A: 大观霉素
- B: 替考拉宁
- C: 克拉霉素
- D: 美罗培南

答案：C

44. 用于肾移植的排异反应和类风湿关节炎的是（）

- A: 环磷酰胺
- B: 硫唑嘌呤
- C: 甲泼尼龙
- D: 环孢素

答案：B

45. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 止咳
- B: 抗菌
- C: 扩张支气管
- D: 化痰

答案：D

46. 以下不属于地西泮的药理作用的是

- A: 抗抑郁
- B: 抗惊厥
- C: 抗癫痫
- D: 镇静催眠

答案：A

47. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 拉西地平
- B: 普伐他汀
- C: 依诺肝素
- D: 普萘洛尔

答案：C

48. （2015 年真题）对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是（）。

- A: 泼尼松龙
- B: 羧甲司坦

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 左氧氟沙星

D: 多索茶碱

答案：B

49. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节的感染的是

- A: 红霉素
- B: 替硝唑
- C: 克林霉素
- D: 万古霉素

答案：C

50. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

- A: 胞磷胆碱
- B: 吡拉西坦
- C: 利斯的明
- D: 多奈哌齐

答案：B

51. 糖皮质激素的适应证，不包括

- A: 风湿性关节炎
- B: 活动性肺结核
- C: 系统性红斑狼疮
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

52. 常见不良反应为关节痛的药物是()

- A: 异烟肼
- B: 对氨基水杨酸
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案：C

53. 对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

- A: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长
- B: 抑制 DNA 回旋酶
- C: 抑制蛋白质合成
- D: 干扰叶酸合成

答案：A

54. 袢利尿药中，结构中不含有磺酰胺基，可以用于对磺胺过敏者的是()

- A: 布美他尼
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 呋塞米

答案：B

55. 有性激素样副作用的是()

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

56. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是()

- A: 高钙血症
- B: 血栓性静脉炎

C: 颅内压升高

D: 高胆红素血症

答案：A

57. 可用于防治夜盲症的维生素是()

A: 维生素 K

B: 叶酸

C: 维生素 A

D: 维生素 B

答案：C

58. 地高辛与其合用，可使血清地高辛浓度增加 70%~100% 的药物是

A: 阿利吉仑

B: 沙库巴曲缬沙坦

C: 阿托品

D: 胺碘酮

答案：D

59. 可产生 β 拟交感神经效应，刺激黏膜纤毛运动，增强黏膜纤毛清除功能的是

A: 西地碘

B: 复方薄荷油

C: 羟甲唑啉

D: 桃金娘油

答案：D

60. 肝素过量所致出血的解救药物是()

A: 蛇毒血凝酶

- B: 维生素 K
- C: 鱼精蛋白
- D: 酚磺乙胺

答案：C

61. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的主要作用靶点是

- A: Na^+-Cl^- -共转运子
- B: 磷酸二酯酶
- C: 远曲小管近端
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ -同向转运子

答案：A

62. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 吗氯贝胺
- B: 帕罗西汀
- C: 马普替林
- D: 度洛西汀

答案：B

63. （2018 年真题）属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是（）

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：B

64. 抑制血管紧张素转化酶的药物是

- A: 洛伐他汀

- B: 氯沙坦
- C: 卡托普利
- D: 米力农

答案: C

65. 茶碱浓度 $42 \mu\text{g/ml}$ 时会出现

- A: 心动过速、心律失常
- B: 呼吸、心跳停止
- C: 恶心、呕吐、失眠
- D: 为有效的治疗浓度

答案: B

66. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

- A: 静脉注射
- B: 皮内注射
- C: 肌肉注射
- D: 皮下注射

答案: B

67. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- B: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取
- C: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解
- D: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取

答案: C

68. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物的是

- A: 克林霉素

- B: 红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 罗红霉素

答案：B

69. 格列本脲的作用特点是

- A: 抑制胰高血糖素的分泌
- B: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- C: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平
- D: 增强胰岛素的作用

答案：C

70. 下列选项中，除抑制延髓咳嗽中枢外，还可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，并具有罂粟样平滑肌解痉作用的药物是（）。

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 喷托维林

答案：A

71. 属于平衡型氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液（18AA）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 赖氨酸注射液
- D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：A

72. 临床作为控制复发和阻止疟疾传播的首选药的药物是()。

- A: 奎宁
- B: 甲硝唑
- C: 伯氨喹
- D: 氯喹

答案：C

73. 磺酰脲类降糖药的药理作用是

- A: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素
- B: 加速胰岛素合成
- C: 抑制胰岛素降解
- D: 提高胰岛 B 细胞功能

答案：A

74. 多黏菌素主要作用于

- A: 支原体
- B: 厌氧菌
- C: 革兰阳性菌
- D: 革兰阴性杆菌

答案：D

75. 大环内酯类抗生素()

- A: 克拉霉素
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：D

76. 属于抑酸药的是()

- A: 胶体果胶铋
- B: 胃蛋白酶
- C: 奥美拉唑
- D: 莫沙必利

答案: C

77. 磷酸二酯酶抑制剂的机制

- A: 抑制葡萄糖脱氢酶
- B: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用
- C: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合
- D: 抑制血小板表面的 ADP 受体

答案: B

78. 治疗斑疹伤寒的首选药是

- A: 氯霉素
- B: 四环素
- C: 青霉素
- D: 诺氟沙星

答案: B

79. 绒促性素属于

- A: 促性腺激素
- B: 短效口服避孕药
- C: 雌激素类
- D: 促性腺激素释放激素类似物

答案: A

80. 促进钙剂吸收可选用

- A: 阿法骨化醇
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 阿伦膦酸钠
- D: 依降钙素

答案：A

81. 属于孕激素类的是()

- A: 他莫昔芬
- B: 己烯雌酚
- C: 睾酮
- D: 甲羟孕酮

答案：D

82. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

- A: 美托洛尔
- B: 硝普钠
- C: 贝那普利
- D: 氨氯地平

答案：A

83. (2020 年真题) 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平

C: 吲达帕胺

D: 赖诺普利

答案: D

84. 螺内酯与下列哪种氨基酸合用可导致高钾血症

A: 缬氨酸

B: 精氨酸

C: 赖氨酸

D: 色氨酸

答案: B

85. 下列强心苷类药物中，主要经肝脏代谢的是()

A: 地高辛

B: 洋地黄毒苷

C: 毒毛花苷 K

D: 毛花苷丙

答案: B

86. 维生素 K 为

A: 抗出血药

B: 抗贫血药

C: 抗血小板药

D: 抗凝血药

答案: A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/058137121043007022>