

## 北京住院医师儿内科 I 阶段《儿童保健考试试题》模拟考试卷

姓名: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1.     B. 生后 15 天  
        C. 生后 1~2 个月  
        D. 生后 3~4 个月  
        E. 生后 4~5 个月
- 4、单项选择题: 关于合理营养与平衡膳食, 错误的是 (    )。A. 合理烹调, 减少营养素损失  
        B. 良好的饮食习惯有助于儿童达到膳食平衡  
        C. 合理搭配各类食品, 以刺激儿童食欲  
        D. 早餐和午餐应安排富含蛋白质和脂肪的食物  
        E. 儿童每餐进餐的时间应为 20~30 分钟
- 5、单项选择题: 小儿最常见的药物剂量计算方法是 (    ) A. 按体重计算  
        B. 按身长计算  
        C. 按体表面积计算  
        D. 按年龄计算  
        E. 按成人剂量折算
- 6、单项选择题: 中医治疗营养不良的主要方法, 下列错误的是 (    )。A. 消积  
        B. 理脾  
        C. 安神  
        D. 益气  
        E. 养血
- 7、单项选择题: 对小儿营养不良最具诊断价值的病史是 (    )。A. 家族史  
        B. 过敏史  
        C. 喂养史  
        D. 预防接种史  
        E. 传染病接触史
- 8、单项选择题: 11 个月健康男婴。为了保证其健康地生长发育, 其饮食中蛋白质、脂肪、碳水化合物(糖)类所供应的热量占总热量的百分比为蛋白质 (%) 脂肪 (%) 碳水化合物(糖)类 (%) (    ) A. 155035  
        B. 351550  
        C. 503515  
        D. 355015

E. 153550

- 9、单项选择题：将牛奶稀释的主要目的是（ ）。A. 调整维生素含量  
B. 降低脂肪的浓度  
C. 降低酪蛋白的浓度  
D. 调整钙磷比例  
E. 调整铁的含量
- 10、单项选择题：患儿囟门未闭，身材矮小，骨骼痿软，行走无力。主要是由于（ ）。A. 元气的功能减弱  
B. 宗气的功能减弱  
C. 肺气的功能减弱  
D. 卫气的功能减弱  
E. 营气的功能减弱
- 11、单项选择题：疳病的临床特征，下列错误的是（ ）。A. 形体消瘦  
B. 面黄发枯  
C. 精神萎靡或烦躁不安  
D. 饮食异常  
E. 小便异常
- 12、单项选择题：维生素 D 缺乏性佝偻病骨的骨骼改变，因胸骨及相邻肋骨向前突出所导致的体征是（ ）。A. 方颅  
B. 鸡胸  
C. 肋骨串珠  
D. 手镯征  
E. 脚镯征
- 13、单项选择题：维生素 D 缺乏性手足搐搦症，主要是由于（ ）。A. 血钙迅速转移至骨骼  
B. 甲状旁腺反应迟钝  
C. 骨钙不能游离入血  
D. 血磷增加  
E. 以上都是
- 14、单项选择题：营养不良患儿可能出现的化验异常不包括（ ）。A. 血清白蛋白降低  
B. 胰岛素样生长因子 I 降低  
C. 必需氨基酸浓度降低  
D. 微量元素降低  
E. 生长激素水平降低
- 15、单项选择题：小儿营养代谢特点，正确的是（ ）。A. 生长发育快，代谢旺盛  
B. 对蛋白质、水的需要比成人相对少  
C. 胃肠消化功能不成熟  
D. 不易营养缺乏和消化紊乱  
E. 生长代谢缺陷病，大多在较大儿童发病
- 16、单项选择题：生理维持液的组成是（ ）。A. 4 份 5%葡萄糖液，1 份生理盐水含 0.15%氯化钾  
B. 3 份 5%葡萄糖液，1 份生理盐水含 0.15%氯化钾  
C. 2 份 5%葡萄糖液，1 份生理盐水含 0.3%氯化钾  
D. 4 份 5%葡萄糖液，1 份生理盐水含 0.3%氯化钾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/065004323023011201>