

2024 河南省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库含答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 需要在凉暗处贮存的药品是

- A: 阿卡波糖片
- B: 复方甘草合剂
- C: 头孢曲松钠
- D: 硝酸甘油

答案：B

2. 哺乳期妇女使用，可致男婴乳房增大的药物是（）

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 复方炔诺酮
- C: 胰岛素
- D: 依那普利

答案：B

3. 用后可有食欲不振、口腔异味

- A: 地塞米松粘贴片
- B: 氯己定
- C: 硼酸甘油
- D: 甲硝唑含漱制剂

答案：D

4. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 利福平

答案：D

5. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 晚期顽固性卵巢癌
- B: 皮脂腺囊肿
- C: 非精原细胞性生殖细胞癌
- D: 晚期顽固性膀胱癌

答案：B

6. (2019 年真题) 处方中外文缩写 p

- A: 微克
- B: 代表
- C: 必要时
- D: 临睡时

答案：D

7. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 泼尼松
- B: 痰液稀释剂
- C: 氨茶碱
- D: 吗啡

答案：C

8. 非甾体抗炎药引起的典型药源性肌病是

- A: 血液系统疾病
- B: 胃肠道疾病
- C: 神经系统疾病
- D: 肌病

答案：B

9. 最容易吸湿的药品是

- A: 甘油
- B: 叶酸
- C: 乙醇
- D: 鱼肝油乳

答案：A

10. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一级预防，最佳剂量范围是：

- A: 75-150mg/d
- B: 25-77mg/d
- C: 25-70mg/d
- D: 150-300mg/d

答案：A

11. 转复并维持窦性心律

- A: 华法林
- B: 多非利特
- C: 血凝酶

D: 硝苯地平

答案：B

12. (2015 年真题) 患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 的药物是 ()

。

A: 布洛芬

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 吲哚美辛

答案：B

13. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

A: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用

B: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶

C: 需要终身服药

D: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状

答案：B

14. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

B: 瑞格列奈片应于餐前服用

C: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案：C

15. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100 μ g pm 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg pm 舌下含服。

- A: 氨氯地平的不良反应
- B: 布地奈德剂量太大
- C: 硝酸甘油剂量不足
- D: 沙丁胺醇的不良反应

答案：D

16. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为

- A: 神经精神障碍
- B: 体位性低血压
- C: 姿势反射障碍
- D: 不宁腿综合征

答案：C

17. 老年患者给予静脉滴注治疗药物宜降低输液速度，过快易引起

- A: 低血压
- B: 高血钾
- C: 肺水肿
- D: 胃肠道刺激

答案：C

18. 可引起尿肌酐减少的是

- A: 病毒性肝炎
- B: 肾小球肾炎
- C: 肺结核

D: 再生障碍性贫血

答案：B

19. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

A: 氯苯那敏

B: 铋制剂

C: 氟西汀

D: 卡托普利

答案：A

20. 三叉神经痛，应选的药物是

A: 芬太尼透皮贴剂

B: 对乙酰氨基酚片

C: 卡马西平片

D: 羟考酮缓释片

答案：C

21. 孟鲁司特平喘的主要机制是

A: 阻断腺苷受体

B: 激动肾上腺素 β_2 受体

C: 抑制白三烯受体

D: 拮抗 M 胆碱受体

答案：C

22. 原料血浆包装、贮存、运输的温度应控制在

A: -10°C 以下。

B: -20°C 以下

C: -15°C 以下

D: -4°C 以下

答案: B

23. 患儿，3 岁，因发热就诊，体温 38.8°C 。药师应推荐的治疗药物是

A: 塞来昔布缓释片

B: 布洛芬混悬液

C: 阿司匹林肠溶片

D: 20% 安乃近滴鼻剂

答案: B

24. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

A: 阿司匹林肠溶片

B: 特拉唑嗪片

C: 氨氯地平片

D: 曲美他嗪片

答案: B

25. 长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

A: 地西泮

B: 谷维素

C: 阿司匹林

D: 罗通定

答案: A

26. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

A: 一般无须调整剂量

- B: 尽可能避免使用
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 需增加给药剂量

答案：A

27. 抗肿瘤药物引起骨髓抑制，白细胞下降多开始于用药后

- A: 第 7 天
- B: 第 14 天
- C: 第 5 天
- D: 第 3 天

答案：A

28. 麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

- A: 药品名称、剂型、规格、数量
- B: 临床诊断
- C: 患者姓名、性别
- D: 患者身份证明编号

答案：D

29. 中成药血脂康中含有的化学成分是

- A: 辛伐他汀
- B: 洛伐他汀
- C: 阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：B

30. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是()

A: A 级

B: C 级

C: D 级

D: X 级

答案：A

31. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 新药信息

B: 药品适应证

C: 治疗药物监测

D: 自我保健

答案：B

32. 患者，女，36 岁。患支气管哮喘，以上哪种药物能够最有效地控制哮喘呼吸道炎症

A: 白三烯受体阻断剂

B: 短效 β_2 受体激动剂

C: 糖皮质激素

D: β_2 受体阻断剂

答案：C

33. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

A: 阿仑膦酸钠

B: 特拉唑嗪

C: 美托洛尔

D: 维生素 C

答案：A

34. (2018 年真题) 患者, 男, 67 岁, 慢性哮喘 20 余年, 现因哮喘急性发作就诊, 首选的药物是 ()

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 二羟丙茶碱片

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 氨茶碱片

答案：C

35. 患者, 男, 57 岁, 因甲状腺结节行全切除术, 术后应服用

A: 左甲状腺素

B: 甲巯咪唑

C: 碳酸锂

D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

36. 患者, 女, 66 岁, 身高 156cm, 体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol / L, 餐后血糖 11.2mmol / L, 糖化血红蛋白 8.7%。

A: 口服磺酰脲类降糖药

B: 口服 Gt - 葡萄糖苷酶抑制剂

C: 饮食干预及运动治疗

D: 口服二甲双胍

答案：D

37. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准未经严格论证或评估的专家意见在循证医学价中的证据级别属于()

- A: 5 级
- B: 1 级
- C: 2 级
- D: 3 级

答案：A

38. 具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

- A: 淀粉溶液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 活性炭混悬液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案：B

39. 患者,女,46岁,高血压病史3年,2年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛,诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重,采用了联合用药方案:患者用药如下:

- A: 双氯芬酸钠缓释片
- B: 羟氯喹片
- C: 氨氯地平片
- D: 甲氨蝶呤片

答案：B

40. 患者，男，65岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

- A: 75~100mgbid, 长期维持

B: 25~50mgqd, 长期维持

C: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg; 随后 75~100mgqd, 长期维持

D: 100-150mgqd, 长期维持

答案: C

41. 需要在服药时多饮水的药物不包括

A: 氨基糖苷类抗菌药

B: 平喘药

C: 抗痛风药

D: 降糖药

答案: D

42. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

A: 利胆药

B: 苦味健胃药

C: 抗利尿药

D: 利尿结石药

答案: C

43. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

A: 扎西他滨

B: 恩夫韦替

C: 沙奎那韦

D: 奈韦拉平

答案: A

44. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，铁缺乏时铁剂的吸收率可达

- A: 20%~60%
- B: 10%~20%
- C: 15%~20%
- D: 20%~40%

答案：A

45. 关于皮肤病外用剂型的选择，错误的说法

- A: 急性期局部有红肿、水疱、糜烂时，多选用糊剂和乳膏剂
- B: 慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，多用软膏剂和乳膏剂
- C: 有渗液者，先用溶液剂湿敷，后用油剂
- D: 皮损处于亚急性期时，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂

答案：A

46. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

- A: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- B: 糖皮质激素的分泌规律
- C: 胃酸的分泌规律
- D: 肝脏合成胆固醇的规律

答案：A

47. 有关依从性的说法错误的是

- A: 依从性仅限于药物治疗
- B: 药师加强对患者的用药指导可提高其依从性
- C: 采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性
- D: 患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果

答案：A

48. 属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 甲基多巴

答案：A

49. 肖爷爷家的保姆来社区药店咨询购买治疗腹泻药品。询问后得知：肖爷爷 72 岁，独居，平日由保姆照顾起居。2 天前开始腹泻，水样便，患者看上去虚弱乏力，身上长了红疹，但能正常饮食。有心衰和背痛病史，平常服用的药品有地高辛、呋塞米、对乙酰氨基酚；5 天前因“咽炎”，医生处方“阿莫西林胶囊，500mg tid，连续服用 7 天”，还未吃完。药师应给予的正确建议是

- A: 继续服用原有药物
- B: 停用呋塞米
- C: 停用地高辛
- D: 停用阿莫西林，并立即就医

答案：D

50. 乙型肝炎病毒核心抗体为

- A: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标
- B: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物
- C: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标
- D: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标

答案：D

51. 普萘洛尔的别名是

- A: 心得安
- B: 安痛定
- C: 心痛定
- D: 消心痛

答案：A

52. (2019 年真题) 患者，男，56 岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体：舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是

- A: 奥美拉唑
- B: 二甲双胍
- C: 氨氯地平
- D: 对氨基水杨酸

答案：C

53. 隔日一次用药的外文规范缩写的是

- A: q. n
- B: q. d
- C: q. h
- D: q. o. d

答案：D

54. 不能用热水送服的药物是

- A: 微生态制剂
- B: 胃黏膜保护剂
- C: 磺胺类药物

D: 镇静催眠药

答案：A

55. 应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

A: 甲地孕酮硅胶环

B: 口服低剂量孕激素避孕药

C: 长效复方口服避孕药

D: 探亲避孕药

答案：B

56. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 铜绿假单胞菌

B: 支原体

C: 肺炎链球菌

D: 衣原体

答案：A

57. 已肯定的致畸药物禁止使用，即

A: 用药必须有明确的指征和适应证

B: 选用对胎儿危害较小的药物

C: 可用可不用的药物应尽量不用或少用

D: 禁止用试验性药

答案：B

58. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 布洛芬
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

59. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),长期精神紧张、紧张性头痛者

- A: 推荐应用地西泮(安定)片
- B: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1
- C: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等
- D: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

答案：A

60. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是 ()

- A: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- B: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋
- C: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
- D: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

答案：A

61. 餐前 15~20min 服用的药物是

- A: 复方氢氧化铝
- B: 阿托伐他汀

C: 伊托必利

D: 奥美拉唑

答案: C

62. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

A: 药品贮存

B: 特殊剂型用法

C: 特殊装置药品

D: 药品有效期

答案: A

63. 一般由葡萄糖与脂肪提供机体 NPC 的比例是

A: 100kcal: 1gN

B: NPC7: 3

C: NPC5: 5

D: 150kcal: 1gN

答案: B

64. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

A: 含氢溴酸右美沙芬制剂

B: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

C: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

D: 含非甾体抗炎药制剂

答案: C

65. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快可出现红人综合征的药物是

- A: 培氟沙星
- B: 苯妥英钠
- C: 洛铂
- D: 万古霉素

答案：D

66. 有磺胺类过敏史者禁用的药物是

- A: 可的松滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 磺胺醋酰钠滴眼液
- D: 硫酸锌滴眼液

答案：C

67. 患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75KG，临床诊断 2 型糖尿病，实验室检查，空腹血糖 5.7mmol/L(参考值范围 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L)，糖化红蛋白 7.1%(正常值 4.8%~6.0%)，经饮食控制、规律锻炼、血糖控制认为达到理想水平。

- A: 胰岛素+二甲双胍
- B: 二甲双胍
- C: 格列齐特
- D: 胰岛素

答案：B

68. 不宜与麻杏止咳片、通宣理肺丸、消咳宁片合用的药品是

- A: 氨茶碱
- B: 可待因

C: 氯苯那敏

D: 地高辛

答案: D

69. 服药期间饮茶可降低疗效的药品是

A: 格列本脲

B: 维生素

C: 硫酸亚铁

D: 西咪替丁

答案: C

70. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差

A: 乳酸亚铁(二价铁)

B: 右旋糖酐铁(二价铁)

C: 琥珀酸亚铁(二价铁)

D: 枸橼酸铁(三价铁)

答案: D

71. 对有过敏倾向和特异体质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

A: 注意定期监测器官功能

B: 注意特殊人群用药

C: 注意药物的迟发反应

D: 了解患者及家族的过敏史

答案: D

72. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

A: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

B: 涂片、培养鉴定

C: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

D: 临床治疗方案

答案：D

73. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 应正片吞服

B: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

C: 适宜餐前 30 分钟服用

D: 长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏

答案：D

74. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

A: 食盐

B: 脂肪

C: 食醋

D: 酒

答案：C

75. 下列不属于鼻黏膜肿胀的用药与健康提示内容是

A: 驾车司机、高空作业者、精密仪器操作者在服用或滴药后 4 小时内不宜从事本职工作

B: α 受体激动剂口服一般连续使用不超过 2 周

C: 妊娠及哺乳期妇女禁用肾上腺素受体激动剂

D: 应用肾上腺素 α 受体激动剂时，应采用间断给药

答案：B

76. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 血压升高
- B: 过敏反应
- C: 低血糖症状
- D: 血糖不降

答案：C

77. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是

- A: 胃酸的分泌
- B: 肝脏合成胆固醇
- C: 糖皮质激素的分泌
- D: 胰岛 B 细胞

答案：A

78. 临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

- A: 观察时间短
- B: 病例数目少
- C: 管理漏洞
- D: 考察不全面

答案：D

79. 饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

- A: 10ml
- B: 20ml
- C: 25ml
- D: 15ml

答案：C

80. 重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

- A: 静脉滴注
- B: 腔道给药
- C: 吸入给药
- D: 喷雾给药

答案：B

81. 适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

- A: 塞来昔布
- B: 可待因
- C: 硫酸氨基葡萄糖
- D: 阿托品

答案：A

82. 药师应具备的素质中，贯穿于药学服务全过程的是（）。

- A: 高尚的职业道德
- B: 交流沟通能力
- C: 药历制订、修改
- D: 良好的教育背景

答案：C

83. “调查显示，应用过庆大霉素治疗的霍乱患者肾衰竭的发病率是未用患者的 5 倍”提示诊断药源性疾病应该进行

- A: 流行病学的调查
- B: 询问用药过敏史和家族史
- C: 致病药物的确定
- D: 排除药物以外的因素

答案：A

84. 解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量导致中毒，应立刻给予（）

- A: 毛果芸香碱
- B: 东莨菪碱
- C: 山莨菪碱
- D: 麻黄碱

答案：A

85. 交代患者药品未开启包装时应置于 2℃~8℃保存，开始使用后不要存放于冰箱中，可在室温下（不超过 25℃）存放 4 周的是

- A: 氟西汀
- B: 米索前列醇
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 胰岛素注射剂

答案：D

86. 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是（）

- A: 伪麻黄碱

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 氯苯那敏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/066202214054011030>