

2024 河北省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题内部题库带答案（满分必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，男，70 岁，高血压病史 14 年，服用依那普利 20mg/日，平时血压控制不佳，今晨大便时突然出现头疼、头晕，随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg，头颅 CT 检查结果为左侧脑出血，出血量约 10ml，拟采用内科治疗，该患者首先应采取的治疗措施是

- A: 肌内注射利血平注射液
- B: 口服氨氯地平片
- C: 静脉滴注甘露醇注射液
- D: 静脉滴注硝酸甘油注射液

答案：C

2. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白？
- B: 药用炭？
- C: 洛哌丁胺？

D: 小檗碱?

答案: C

3. 烯丙吗啡用于解救

A: 水银中毒

B: 氰化物中毒

C: 有机磷中毒

D: 吗啡中毒

答案: D

4. 不宜选用静脉滴注 5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

A: 苯妥英钠中毒

B: 司可巴比妥中毒

C: 苯巴比妥中毒

D: 异戊巴比妥中毒

答案: D

5. 关于血清尿素氮和血肌酐的叙述正确的是

A: 血肌酐的浓度会受到饮食、高分子代谢等肾外因素的影响

B: 血清尿素氮主要经肾小管分泌而随尿液排出体外

C: 当肾实质受损害时，可使血液中血清尿素氮的水平降低

D: 通过测定尿素氮可了解肾小球的滤过功能

答案: D

6. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 Et 频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。

A: 苯巴比妥

B: 阿托品

C: 苯海拉明

D: 胺碘酮

答案: B

7. 蒽环类药物的主要毒副作用是 ()

A: 出血性膀胱炎

B: 肺纤维化

C: 溶血性尿毒症

D: 心脏毒性

答案: D

8. 青霉素较难在乳汁中出现的机制是

A: 在母体血浆中处于结合状态

B: 呈弱碱性

C: 解离度大

D: 呈弱酸性

答案: D

9. 脑梗死的分期，恢复期

A: 1~6 个月

B: 2~3 个月

C: 15 天

D: 1 个月内

答案: A

10. (抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是

A: 加巴喷丁

B: 卡马西平

C: 扑米酮

D: 乙琥胺

答案: B

11. 患者，女，35 岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

A: 肝毒性

B: 肾毒性

C: 心脏相关风险

D: 胃肠道反应

答案: D

12. 非糜烂性胃食管反流病的抑酸治疗疗程是

A: 2 周

B: 6 周

C: 4 周

D: 3 周

答案: C

13. 属于中枢和外周多巴胺 D₂ 受体阻断剂，具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是

A: 多潘立酮

B: 昂丹司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 莫沙必利

答案: C

14. 数小时到数天即可改善症状，不影响前列腺体积和血清 PSA 水平的是（）

- A: 特拉唑嗪
- B: 奥昔布宁
- C: 非那雄胺
- D: 米多君

答案：A

15. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

- A: 有禁忌证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 超适应证用药
- D: 无适应证用药

答案：B

16. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中华医学会的网址是

- A: org. cn
- B: org. cn
- C: www. cp
- D: www. cm

答案：D

17. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

- A: 吸入倍氯米松
- B: 吸入色甘酸钠

C: 吸入沙丁胺醇

D: 口服麻黄碱

答案: C

18. 可引起局部组织萎缩

A: 甲硝唑含漱制剂

B: 硼酸甘油

C: 地塞米松粘贴片

D: 氯己定

答案: C

19. 阿昔洛韦可导致

A: 阻塞肾小管、肾小球

B: 肾小管坏死

C: 前列腺素合成障碍

D: 肾间质纤维化

答案: A

20. 患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

A: 苯海拉明

B: 甲氧氯普胺

C: 地塞米松

D: 昂丹司琼

答案: B

21. (2018 年真题) 患者, 女, 19 岁, 面部出现多个丘疹和脓疱有脱皮表现, 临床诊断为痤疮。外用制剂改善不佳, 换用异维 A 酸片。使用异维 A 酸片的用药注意事项和用药指导, 不包括 ()

- A: 每 1—3 个月监测血尿酸水平
- B: 用药前排除妊娠
- C: 治疗期间或治疗后 1 个月内避免献血
- D: 监测精神症状

答案: A

22. 下列药物中, 解救氰化物中毒的特效药是

- A: 维生素 K
- B: 维生素 C
- C: 亚甲蓝
- D: 氟马西尼

答案: C

23. 痛风急性发作期应选用

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 阿司匹林

答案: C

24. 易引湿的药物是 ()。

- A: 硫酸镁
- B: 青霉素
- C: 胃蛋白酶
- D: 硝酸甘油

答案：C

25. 对急性卡他性结膜炎可选用

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 杆菌肽眼膏
- C: 碘苷滴眼液
- D: 1%泼尼松龙滴眼液

答案：B

26. 适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 孟鲁司特钠咀嚼片
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 茶碱片

答案：A

27. 急性肠炎可出现()。

- A: 脓血便
- B: 脓状便
- C: 稀糊便
- D: 鲜血便

答案：C

28. 小儿呼吸道感染可服用琥乙红霉素颗粒，剂量为 30~50mg/(kg·d)，分 3~4 次服用，一位体重为 20kg 的儿童一次剂量应为

- A: 175~250mg 或 125~225mg
- B: 225~375mg 或 200~300mg
- C: 200~333mg 或 150~250mg

D: 215~350mg 或 175~270mg

答案：C

29. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A: 血红蛋白生成减少

B: 红细胞丢失过多

C: 红细胞生成减少

D: 红细胞生成过多

答案：C

30. 最常用的解热镇痛药为

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 谷维素

D: 塞来昔布

答案：A

31. 可吸附砷、沉淀汞的是

A: 3%~5%鞣酸溶液

B: 1%氯化钠溶液

C: 药用炭混悬液

D: 鸡蛋白

答案：D

32. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

A: 东莨菪碱

B: 双嘧达莫

C: 阿米洛利

D: 抗过敏药

答案：A

33. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗寻常痤疮时，正确的用法是（）

A: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

B: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用

C: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

D: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏

答案：A

34. 过敏性皮炎常表现为（）

A: 中性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 红细胞增多

答案：C

35. 促进尿酸排泄，用于痛风慢性期，应早餐后服用的药物是

A: 苯溴马隆

B: 非布司他

C: 拉布立酶

D: 枸橼酸氢钾钠

答案：A

36. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三脂血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为（）

A: 0.2g，qd

B: 0.1g，tid

C: 0.5g, tid

D: 0.5g, qd

答案：B

37. 阿托伐他汀钙的日剂量范围是()

A: 5—20mg

B: 10—20mg

C: 40—200mg

D: 10—80mg

答案：D

38. 血尿酸升高的相关疾病是

A: 湿疹

B: 痛风

C: 流感

D: 过敏性鼻炎

答案：B

39. 肿瘤患者在化疗后出现痛性黏膜炎，可对症给予

A: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

B: 吗啡

C: 劳拉西泮

D: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

答案：A

40. 依药品采购—验收—入库—出库—调配—使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

A: 对可疑药品进行封存

- B: 反向追踪
- C: 药品召回
- D: 查找供货方

答案：B

41. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

- A: 100-150mgqd，长期维持
- B: 25~50mgqd，长期维持
- C: 75~100mgbid，长期维持
- D: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg；随后 75~100mgqd，长期维持

答案：D

42. 原发性蛛网膜下腔出血的最常见的病因是

- A: 动脉硬化
- B: 颅内动脉瘤
- C: 脑血管畸形
- D: 高血压

答案：B

43. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患贫血患者常出现的血常规检查异常是

- A: 血小板计数增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：B

44. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

- A: 可能无关
- B: 可能
- C: 很可能
- D: 肯定

答案：C

45. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次/分，律齐，无杂音。

- A: 支气管哮喘
- B: 慢性支气管炎
- C: 阻塞性肺气肿
- D: 慢性支气管炎合并肺气肿

答案：A

46. 有关噻托溴铵干粉吸入剂（吸乐装置）正确使用操作：①拉开防尘帽，打开吸嘴，从包装中取出 1 粒胶囊，将胶囊放入中央室内，合上吸嘴直至听到一声“咔嗒”声；②尽量呼气（避开吸嘴），用口唇包裹住吸嘴，保持头部垂直，缓慢深吸气，屏住呼吸，约 10 秒后慢慢呼气；③漱口，去除咽部残留药物；④手持吸入器将吸嘴朝上，将刺针按钮完全按下 1 次；⑤擦拭吸嘴，再次打开吸嘴，取出胶囊壳，关闭吸嘴和防尘帽。正确的操作步骤是

- A: ②④①⑤③
- B: ①④②⑤③

C: ⑤④②①③

D: ①②③④⑤

答案：B

47. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌症，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A: 150~300mg/d

B: 25~50mg/d

C: 25~75mg/d

D: 75~150mg/d

答案：D

48. 成年男性的血尿酸正常参考范围是

A: 120~160 $\mu\text{mol/L}$

B: 155~357 $\mu\text{mol/L}$

C: 550~650 $\mu\text{mol/L}$

D: 208~428 $\mu\text{mol/L}$

答案：D

49. (2016 年真题) 患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是 ()。

A: 肾脏毒性

B: 肺纤维化

C: 心脏毒性

D: 肝脏毒性

答案：A

50. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 西咪替丁
- C: 呋塞米
- D: 胰岛素

答案：C

51. 吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

- A: 地西泮
- B: 有机硫类
- C: 间羟胺
- D: 阿托品

答案：A

52. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

- A: $<150/80\text{mmHg}$
- B: $<120/80\text{mmHg}$
- C: $<140/90\text{mmHg}$
- D: $<130/80\text{mmHg}$

答案：C

53. 降钙素属于

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨吸收抑制剂
- D: 骨形成刺激剂

答案：C

54. 溃疡性结肠炎活动期的生化检查标志是

- A: 白细胞计数降低
- B: 血红蛋白升高
- C: 凝血酶原时间缩短
- D: 血沉

答案：D

55. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 心绞痛
- B: 胃溃疡
- C: 支气管哮喘
- D: 胃食管反流病

答案：D

56. 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是：

- A: 脉君安片+氢氯噻嗪片
- B: 消渴丸+格列本脲片
- C: 新癬片+吲哚美辛胶囊
- D: 曲克芦丁片+维生素 C 片

答案：D

57. 患者，女，48 岁，因急性气管-支气管炎发作，出现“咳嗽、咳黄痰、喘息”症状就诊。患者无其他基础疾病，不应出现在患者用药处方中的是

- A: 美敏伪麻溶液
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 氨溴索溶液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：B

58. 儿科用药中，最方便、最安全、最经济的给药途径是

- A: 静脉注射
- B: 肌肉注射
- C: 静脉滴注
- D: 口服给药

答案：D

59. 容易引湿的药物是

- A: 青霉素类、头孢菌素类
- B: 阿朴吗啡、水杨酸钠
- C: 胃蛋白酶
- D: 牛痘菌苗

答案：C

60. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 放线菌素
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

61. 关于药品编码，下列说法错误的是

- A: 药品作为特殊商品，要实现防止伪劣，必须遵循"单品单码"的原则
- B: 国家药品编码只适用于药品生产、经营和使用领域
- C: 建立国家药品编码系统是一项专业化极强的技术工作
- D: 药品编码是我国药品监督管理的一项基础的标准化工作

答案：B

62. 较易导致中毒性肝炎、肝衰竭的药品是

- A: 氯化钾
- B: 新霉素
- C: 阿米卡星
- D: 酮康唑

答案：D

63. 轻度贫血，Hb 为（）

- A: 60~90g/L
- B: 小于 60g/L
- C: 90~120g/L
- D: 60~120g/L

答案：C

64. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 质子泵抑制剂餐后服用
- B: 甲硝唑餐后服用
- C: 甲硝唑餐前服用
- D: 铋剂餐后服用

答案：B

65. 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2~3 次的药物是()

- A: 冰硼咽喉散
- B: 西地碘含片
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 甲硝唑口腔粘贴片

答案：A

66. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 格列吡嗪
- C: 西格列汀
- D: 阿卡波糖

答案：A

67. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是：

- A: 奥美拉唑
- B: 雷尼替丁
- C: 昂丹司琼
- D: 维生素 B

答案：C

68. 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 20 天之内
- B: 15 天之后
- C: 15 天之内
- D: 10 天之后

答案：C

69. 新生儿肾脏有效循环血量及肾小球滤过率较成人低

A: 30%~40%

B: 40%~50%

C: 10%~20%

D: 20%~30%

答案：A

70. 初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段，属于

A: II 期临床试验

B: III 期临床试验

C: IV 期临床试验

D: I 期临床试验

答案：D

71. 饮酒过多可致死亡，所以乙醇浓度危及生命最低限是

A: 0.25%~0.3%

B: 0.2%~0.25%

C: 0.35%~0.4%

D: 0.15%~0.2%

答案：C

72. 绝经激素治疗的基本原则错误的是

A: 选择能达到治疗目的的最低有效剂量

B: 药物选择个体化，剂量个体化

C: 对有子宫的妇女，补充雌激素的同时必须加上孕激素

D: 治疗窗口为绝经 5 年之内或 50 岁之前

答案：D

73. (2018 年真题) 患者, 女, 45 岁, 6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁, 在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗, 症状控制较好, 近 3 个月服用西咪替丁, 患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱, 该患者各地求医, 服用各种药物, 具体药物品种不详。围绕该病例, 医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 遵从联合治疗原则
- B: 定期监测肝功能
- C: 有条件的应测定药物血液浓度
- D: 长期规律用药

答案：A

74. 糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A: 大剂量碘剂
- B: 二甲双胍
- C: 格列本脲
- D: 胰岛素

答案：D

75. 伴有认知障碍的老年帕金森病患者, 首选治疗药物为

- A: 苯海索
- B: 司来吉兰
- C: 金刚烷胺
- D: 复方左旋多巴

答案：D

76. 目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的 IL-1 拮抗剂类生物制剂为

- A: 阿达木单抗
- B: 阿巴西普
- C: 阿那白滞素
- D: 英夫利昔单抗

答案：C

77. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

- A: 红霉素
- B: 洛伐他汀
- C: 奥美拉唑
- D: 青霉素

答案：B

78. 雌二醇的适应症

- A: 前列腺癌
- B: 绝经期前乳腺癌
- C: 子宫颈癌
- D: 子宫内膜癌

答案：A

79. 三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

- A: 肌肉震颤、抽搐
- B: 心血管毒性
- C: 明显的锥体外系症状
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：B

80. 对胃肠刺激较小，体内分解为两种解热镇痛药、作用时间长的是

- A: 贝诺酯
- B: 吲哚美辛
- C: 布洛芬
- D: 阿司匹林

答案：A

81. 以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 异维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 维胺酯

答案：B

82. 检查片剂的硬度属于

- A: 触觉试验
- B: 嗅觉试验
- C: 听觉试验
- D: 视觉试验

答案：A

83. 属于容积性泻药的是

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 硫酸镁
- D: 番泻叶

答案：C

84. 苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠 26~29 周时游离药物浓度达高峰，是由于

- A: 妊娠期药物分布容积明显增加
- B: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多
- C: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低
- D: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

答案：C

85. 秋水仙碱具有严重的毒副作用，痛风急性发作期使用秋水仙碱治疗时，出现严重中毒前驱症状应立即停药，停药指征是

- A: 肌肉抽搐
- B: 紫癜
- C: 胃肠道反应
- D: 血小板减少

答案：C

86. 患儿，14 岁，体重 50kg，体温 38.7℃，使用布洛芬退热。单次给药剂量是()

- A: 300-600mg
- B: 200-400mg
- C: 500-1000mg
- D: 10-15mg

答案：B

87. 可导致体重增加的抗癫痫药是

- A: 拉莫三嗪

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 卡马西平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/066223112054011030>