

同等学力申硕-专硕口腔医学-基础知识-口腔内科学-口腔内科学(A1A2 型题 1)

[单选题]1. 龋病时，牙体硬组织病理改变涉及

- A. 牙釉质
- B. 牙本质
- C. 牙骨质
- D. 牙釉质和牙本质
- E. 牙釉质、牙本质、牙骨质

(江南博哥) 正确答案: E

[单选题]2. 菌斑的获得性膜结构的功能不包括

- A. 修复或保护釉质表面
- B. 影响微生物对牙面的附着
- C. 为菌斑微生物提供营养
- D. 为釉质提供有选择的渗透性
- E. 利于抗生素发挥作用

正确答案: E

[单选题]3. 常见的致龋微生物不包括

- A. 放线菌属
- B. 乳杆菌属
- C. 福赛类杆菌
- D. 变形链球菌
- E. 茸毛链球菌

正确答案: C

[单选题]4. 引起龋病的前三位糖类是

- A. 蔗糖、葡萄糖、麦芽糖
- B. 葡萄糖、蔗糖、乳糖
- C. 乳糖、麦芽糖、果糖
- D. 麦芽糖、乳糖、果糖
- E. 果糖、山梨糖、木糖醇

正确答案: A

[单选题]5. 下面对“湿性龋”的描述正确的是

- A. 多见于儿童或青年人，进展快，病变组织颜色浅、质软
- B. 多见于儿童或青年人，进展慢，病变组织颜色深、质硬
- C. 多见于老年人，进展快，病变组织颜色浅、质软
- D. 多见于老年人，进展慢，病变组织颜色深、质硬
- E. 多见于体质较弱者，进展快，病变颜色较深、质硬

正确答案: A

[单选题]6. 早期龋损的改变，下述哪项是错误的

- A. 硬组织发生脱矿

- B. 硬组织结构发生改变
- C. 牙齿透明度下降
- D. 呈白垩色
- E. 出现龋洞

正确答案：E

[单选题]7. 邻面龋好发于

- A. 青少年
- B. 儿童
- C. 成年人
- D. 老人
- E. 以上均好发

正确答案：D

[单选题]8. 继发龋不易查出时，可用下列哪种方法帮助诊断

- A. 探针
- B. X线
- C. 温度测试
- D. 叩诊
- E. 以上均不是

正确答案：B

[单选题]9. 氟化水源防龋的标准浓度是

- A. 0.05~0.1ppm
- B. 0.1~0.5ppm
- C. 0.5~1ppm
- D. 1~5ppm
- E. 5~10ppm

正确答案：C

[单选题]10. 关于窝洞抗力形，下列说法不正确的是

- A. 是使修复体在承受咬合力时不折裂的形状
- B. 窝洞有一定的深度
- C. 窝洞要求底平、壁直
- D. 双面洞的轴面洞底与邻面洞的轴壁形成阶梯
- E. 洞底加倒凹

正确答案：E

[单选题]11. 玻璃离子充填时，洞形要求错误的是

- A. 洞有一定的深度
- B. 洞缘可保留无基釉
- C. 洞缘可做洞斜面
- D. 可降低固位形要求

E. 洞底可呈弧形

**正确答案：C**

[单选题]12. 下列哪种材料对牙髓刺激小并可促进牙本质形成

- A. 磷酸锌水门汀
- B. 聚羧酸水门汀
- C. 玻璃离子水门汀
- D. Ca(OH)<sub>2</sub>糊剂
- E. 银汞合金

**正确答案：D**

[单选题]13. 龋损在什么阶段开始产生牙髓反应

- A. 釉牙本质界处
- B. 牙本质浅层
- C. 牙本质中层
- D. 牙本质深层
- E. 髓壁处

**正确答案：C**

[单选题]14. 复合树脂充填时，洞形要求不包括

- A. 洞缘及点线角圆钝
- B. 前牙可保留无基釉
- C. 不必做固位形
- D. 洞缘线圆缓
- E. 洞缘制备成斜面

**正确答案：C**

[单选题]15. 牙本质龋充填时，对牙髓刺激最大的材料是

- A. 水门汀类
- B. 氧化锌丁香油糊剂
- C. 银汞合金
- D. 复合树脂
- E. 玻璃离子

**正确答案：D**

[单选题]16. 增强窝洞抗力的方法不包括

- A. 去除无基釉
- B. 去除薄壁弱尖
- C. 保留承力区的薄壁弱尖
- D. 洞缘线设计为圆钝曲线
- E. 洞形成箱状

**正确答案：C**

[单选题]17. 龋齿使牙髓受到刺激后可造成

- A. 继发性牙本质形成
- B. 修复性牙本质形成
- C. 牙髓充血
- D. 牙髓变性
- E. 牙髓钙变

正确答案：B

[单选题]18. 大面积龋损修复时，固位钉在修复体与牙本质中长度一般应为

- A. 小于 2mm
- B. 大于 2mm
- C. 2mm
- D. 1~1.5mm
- E. 1mm

正确答案：C

[单选题]19. 对固位钉的描述不正确的是

- A. 固位钉的钉道应大于钉的直径
- B. 固位钉的数目应根据牙体缺损情况而定
- C. 摩擦固位钉的钉道大于钉的直径
- D. 自攻螺纹钉遇到一定阻力即于颈部折断
- E. 黏固钉的固位力相对不强

正确答案：C

[单选题]20. 钉道的位置距釉牙本质界至少为

- A. 0.5~1.0mm
- B. 10~15mm
- C. 15~20mm
- D. 大于 2mm
- E. 以上均不正确

正确答案：A

[单选题]21. 牙齿发育异常不包括

- A. 结构异常
- B. 牙列异常
- C. 形态异常
- D. 数目异常
- E. 萌出异常

正确答案：B

[单选题]22. 关于釉质发育不全，下列叙述不正确的是

- A. 是指釉质结构出现异常
- B. 分为釉质发育不全和釉质矿化不良
- C. 釉质发育不良一般不会造成牙齿实质缺损

- D. 釉质发育不全和矿化不良可同时存在
- E. 维生素 A、C、D 及钙磷的缺乏可造成釉质发育不全

**正确答案：C**

[单选题]23. 釉质发育不全与浅龋的区别为

- A. 釉质表面缺损
- B. 色素沉着斑
- C. 探针时损害部位硬而光滑
- D. 患者无症状
- E. 釉质表面有白垩斑

**正确答案：C**

[单选题]24. 关于氟牙症叙述不正确的是

- A. 氟斑牙又称斑釉牙
- B. 具有地区性
- C. 常表现为釉质表面有白垩色到褐色斑块
- D. 乳牙列或恒牙列均好发
- E. 严重时可致釉质缺损

**正确答案：D**

**参考解析：**胎盘屏障

[单选题]25. 氟牙症与釉质发育不全的区别主要为

- A. 病因不同
- B. 表现不同
- C. 牙位不同
- D. 牙面不同
- E. 部位不同

**正确答案：A**

[单选题]26. 畸形中央尖折断引起牙髓或根尖周病变时，为保存患牙并促使牙根发育，可采用

- A. 牙髓塑化治疗
- B. 干髓术
- C. 牙髓切断术
- D. 根尖诱导成形术
- E. 盖髓术

**正确答案：D**

[单选题]27. 完全脱位牙如果不能即时复位，对患牙可采取的措施不包括

- A. 置于舌下
- B. 放在鲜牛奶中
- C. 放在生理盐水中
- D. 洗净吹干备用

E. 放置于清洁的自来水中

**正确答案：D**

[单选题]28. 外伤所致的前牙根尖 1 / 3 处折断、不松动病例，选择的处理应为

- A. 定期观察
- B. 牙髓治疗
- C. 固定并定期观察
- D. 调𦍃
- E. 拔除

**正确答案：D**

[单选题]29. 磨牙症的病因不包括

- A. 心理因素
- B. 𦍃因素
- C. 全身因素
- D. 牙体牙髓病
- E. 职业

**正确答案：D**

[单选题]30. 牙本质敏感症对下列哪项刺激最敏感

- A. 刷牙
- B. 冷热
- C. 酸甜
- D. 机械刺激
- E. 吃硬物

**正确答案：D**

[单选题]31. 激光脱敏治疗的原理为

- A. 热凝封闭牙本质小管
- B. 阻塞牙本质小管
- C. 减小牙本质小管直径
- D. 作用于牙本质小管牙髓的末梢
- E. 作用于牙本质细胞突

**正确答案：A**

[单选题]32. 患者 40 岁，左下第一磨牙深龋治疗时不慎穿髓，穿髓孔 > 1mm，该牙处理方法应选择

- A. 直接盖髓+术永久充填
- B. 直接盖髓+安抚充填
- C. 失活术
- D. 活髓切断术
- E. 牙髓治疗

**正确答案：E**

[单选题]33. 患者上前牙牙冠变色，问诊一年前有牙外伤史，未曾治疗，其原因最可能是

- A. 色素沉着
- B. 牙髓坏死
- C. 牙髓变性
- D. 牙本质变性
- E. 以上均不是

正确答案：B

[单选题]34. 患者 25 岁，左下后牙反复肿痛而就诊，查： $\overline{15}$  无龋，𦘔面磨损可见牙本质暴露，探（-），叩（+），X 线：根尖区病变，根尖孔成喇叭口状。其病因最有可能是

- A. 磨损
- B. 牙隐裂
- C. 畸形中央尖
- D. 𦘔创伤
- E. 发育不全

正确答案：C

[单选题]35. 牙髓感染的途径不包括

- A. 牙周途径
- B. 牙髓暴露
- C. 淋巴途径
- D. 牙本质小管
- E. 血源性感染

正确答案：C

[单选题]36. 牙髓炎症的主要感染途径

- A. 外伤
- B. 楔状缺损
- C. 牙周袋
- D. 发育异常
- E. 深龋

正确答案：E

[单选题]37. 口腔内扪诊可以检查以下症状，除外

- A. 牙髓炎症程度
- B. 骨膜下囊肿的波动感
- C. 牙松动度
- D. 黏膜肿胀范围
- E. 溃疡的基底情况

正确答案：A

[单选题]38. 鉴别急性牙髓炎的患牙为上颌或下颌可用

- A. 电诊法
- B. X线片
- C. 麻醉法
- D. 染色法
- E. 嗅诊

正确答案：C

[单选题]39. 可复性牙髓炎的描述不包括

- A. 受到化学刺激时出现短暂疼痛
- B. 偶有自发性疼痛
- C. 对冷刺激更为敏感
- D. 刺激去除症状消失
- E. 及时正确的治疗，牙髓可恢复到原有状态

正确答案：B

[单选题]40. 急性化脓性牙髓炎症状，下述错误的是

- A. 自发性阵发性疼痛
- B. 夜间疼痛加重
- C. 冷刺激疼痛加重
- D. 放射性疼痛
- E. 不能定位

正确答案：C

[单选题]41. 下列患者不适合牙髓电测者是

- A. 冠心病患者
- B. 高血压患者
- C. 装心脏起搏器者
- D. 癫痫病患者
- E. 糖尿病患者

正确答案：C

[单选题]42. 诊断牙内吸收最有价值的手段是

- A. 视诊
- B. 口诊
- C. X线片
- D. 电活力测验
- E. 温度试验

正确答案：C

[单选题]43. 急性化脓性根尖周炎理想的排脓方式

- A. 穿通骨壁突破黏膜
- B. 穿通骨壁突破皮肤



- C. 通过根尖孔经根管从冠部排脓
- D. 通过牙周膜从龈沟或牙周袋排脓
- E. 以上均不是

正确答案：C

[单选题]44. 失活剂 As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 封药时间

- A. 24~48 小时
- B. 1~7 天
- C. 10~12 天
- D. 30~40 分
- E. 2~4 天

正确答案：A

[单选题]45. 牙髓失活法最严重的并发症是

- A. 封药后疼痛
- B. 化学性骨坏死
- C. 急性牙髓炎
- D. 急性根尖炎
- E. 均不正确

正确答案：B

[单选题]46. 下颌双尖牙牙髓炎进行治疗时，应用

- A. 浸润麻醉
- B. 上颌结节麻醉
- C. 下颌传导麻醉
- D. 腭大孔麻醉
- E. 门齿孔麻醉

正确答案：C

[单选题]47. 盖髓剂应具备的特性中不正确的是

- A. 能促进牙髓组织再修复能力
- B. 对牙髓组织无毒性
- C. 渗透性不能强
- D. 有杀菌或抑菌作用
- E. 药物效果稳定持久

正确答案：C

[单选题]48. 直接盖髓术不正确的叙述是

- A. 隔离口水，消毒牙面
- B. 用生理盐水冲洗窝洞
- C. 穿髓孔直径大于 0.5mm
- D. 盖髓剂放在穿髓孔上方
- E. 盖髓后用氧化锌丁香油糊剂暂封

**正确答案：C**

[单选题]49. 可复性牙髓炎行盖髓术后复诊的时间为

- A. 1~2 天
- B. 3~4 天
- C. 5~6 天
- D. 1~2 周
- E. 2~3 个月

**正确答案：D**

[单选题]50. 干髓治疗的原理是

- A. 要保留感染的牙髓
- B. 要保留感染的冠髓
- C. 要保留分解的根髓
- D. 要保留成形的根髓
- E. 要保留健康的根髓

**正确答案：D**

[单选题]51. 放置失活剂错误的方法是

- A. 暴露穿髓孔，直径约为 0.5~1mm
- B. 用氧化锌膏严密加压封堵
- C. 对于邻面龋洞应防止失活剂外溢
- D. 掌握失活时间
- E. 封药后疼痛较严重时，应重新开放

**正确答案：B**

[单选题]52. 放置干髓剂时，应注意的问题不包括

- A. 覆盖根分歧部
- B. 隔湿止血
- C. 应放于根管口处
- D. 水门汀垫底
- E. 包括以上各项

**正确答案：A**

[单选题]53. 急性牙槽脓肿的发展过程一般经历

- A. 浆液期、化脓期、引流期
- B. 根尖脓肿、骨膜下脓肿、黏膜下脓肿
- C. 根尖炎症、根尖肉芽肿、根尖囊肿
- D. 急性根尖炎、慢性根尖炎、慢性牙槽脓肿
- E. 根尖脓肿、骨膜下脓肿、面部蜂窝织炎

**正确答案：B**

[单选题]54. 根尖囊肿的特征性诊断

- A. 牙髓无活力

- B. X 线示根尖周透射区周边有白线围绕
- C. 根管内淡黄透明囊液
- D. 囊液中见到胆固醇结晶
- E. 根尖周骨质膨隆

**正确答案：** B

[单选题]55. 使用拔髓针在根管内旋转的角度为

- A.  $90^{\circ}$
- B.  $95^{\circ} \sim 120^{\circ}$
- C.  $150^{\circ}$
- D.  $180^{\circ}$
- E.  $360^{\circ}$

**正确答案：** D

[单选题]56. 前牙的工作长度具体指

- A. 牙齿长度
- B. 根管长度
- C. 开髓口到根尖端的长度
- D. 切端到根尖狭窄部的长度
- E. X 线片上牙齿长度

**正确答案：** D

[单选题]57. 根管长度测量最不准确的方法是

- A. 统计学的牙平均长度
- B. 根管器械探测
- C. X 线片法
- D. 根管长度电测法
- E. 根管工作长度测量板

**正确答案：** A

[单选题]58. 18 岁患者前牙根管充填时常用的固体类根管充填材料是

- A. 银针
- B. 牙胶尖
- C. 钴铬合金尖
- D. 钛尖
- E. 塑料

**正确答案：** B

[单选题]59. 根管充填时填充长度应该是

- A. 牙齿长度
- B. 工作长度
- C. 根管长度
- D. 髓腔长度

E. X 线片上的根管长度

**正确答案：B**

[单选题]60. 根管充填应达到的标准为

- A. 超填
- B. 恰填
- C. 糊剂超填
- D. 牙胶尖欠填
- E. 欠填

**正确答案：B**

[单选题]61. 塑化治疗技术中的要求是

- A. 尽量拔除牙髓
- B. 保留根尖 1 / 3 处牙髓
- C. 保留根尖 1 / 2 处牙髓
- D. 可以不拔髓
- E. 必须拔尽牙髓

**正确答案：A**

[单选题]62. 感染根管扩大的标准（年轻恒牙除外）比原来直径至少扩大

- A. 2 个型号
- B. 3 个型号
- C. 4 个型号
- D. 5 个型号
- E. 根据情况来定

**正确答案：B**

[单选题]63. 根管治疗术后失败，多发生在

- A. 半年以内
- B. 1 年以内
- C. 2 年以内
- D. 3~5 年
- E. 5 年以上

**正确答案：C**

[单选题]64. 年轻恒牙牙根完全形成在萌出后

- A. 1 年
- B. 1 年~1 年半
- C. 2~2 年半
- D. 3~5 年
- E. 6 年

**正确答案：D**

[单选题]65. 发育期的上颌正中间隙，在哪个牙萌出后间隙关闭

- A. 上颌中切牙
- B. 下颌尖牙
- C. 上颌第一双尖牙
- D. 上颌尖牙
- E. 上颌第二双尖牙

正确答案：D

[单选题]66. FC 活髓切断术时 FC 小棉球应放置的时间为

- A. 1 分钟
- B. 2 分钟
- C. 3 分钟
- D. 5 分钟
- E. 8 分钟

正确答案：C

[单选题]67. 活髓切断术成功的关键因素是

- A. 去尽腐质
- B. 髓室顶揭除完全
- C. 止血彻底
- D. 无菌操作
- E. 放置盖髓剂

正确答案：D

[单选题]68. FC 活髓切断时去除牙髓组织的量是

- A. 露髓点周围 4mm 范围内的牙髓
- B. 冠髓的上半部分
- C. 牙冠颈部缩窄以上的全部牙髓
- D. 根分歧以上的全部牙髓
- E. 每一个根管口以上的全部牙髓

正确答案：E

[单选题]69. 乳牙牙根吸收的特点中正确的是

- A. 乳前牙根吸收从根尖开始
- B. 乳磨牙从根分歧内侧壁开始吸收，各根吸收速度一致
- C. 先天缺失恒牙时，乳牙根不发生吸收
- D. 乳牙根吸收 1 / 2 以上其牙髓发生退行性变
- E. 乳牙牙根呈横向吸收

正确答案：D

[单选题]70. 有关年轻恒牙的各项叙述，错误的是

- A. 年轻恒牙髓组织增生明显
- B. 轻度炎症易于局限，重度炎症易于扩散
- C. 牙乳头对感染的抵抗力弱、恢复力弱，容易坏死

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067043142114006154>