

# 预防接种技能竞赛-预防接种实施专项

## 一、单选题

1.接种时医疗卫生人员在实施接种前，开展“三查七对一验证”，其中“七对”不包括：（ ）[单选题] \*

A.受种者身份证或出生证明✓

B.疫苗品名

C.疫苗规格、剂量

D.接种部位、接种途径

2.按最高预约接种人数的（ ）配备规格齐全的接种注射器材。（ ）[单选题] \*

A.1:1

B.1:1.1✓

C.1:1.2

D.1:1.3

3.预防接种应准备的药品器械，以下正确的是？（ ）[单选题] \*

A.消毒棉签、碘酒、安全盒（锐器盒、毁形器）、1:1000 肾上腺素等

B.消毒棉签、75%乙醇、安全盒（锐器盒、毁形器）、1:1000 肾上腺素等✓

C.消毒棉签、碘伏、安全盒（锐器盒、毁形器）、1:1000 肾上腺素等

D.消毒棉签、70%乙醇、安全盒（锐器盒、毁形器）、1:1000 肾上腺素等

4.接种时应严格执行安全注射，以下错误的是？（ ）[单选题] \*

A.应查验一次性注射器的外包装袋是否破损,接种后方可打开或取出一次性注射器具

B.将一次性注射器具直接投入安全盒或防刺的容器内

C.一次性注射器具注射完毕应回套针帽✓

D.一次性注射器必须由证照齐全的单位生产，使用前要检查包装和注射器是否完好、针头是否锐利

5.使用减毒活疫苗接种时,以下正确的是? ( ) [单选题] \*

A.疫苗开启后 1 小时未用完应废弃

B.疫苗必须在-20℃环境中贮存

C.HIV 感染者母亲所生感染状态不详儿童可接种减毒活疫苗

D.免疫功能缺陷是禁忌证✓

6.接种记录应当保存至疫苗有效期满后不少于多少年备查? ( ) [单选题] \*

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.5 年✓

7.预防接种卡（簿）的保管期限应在儿童满 6 岁后再保存不少于几年? ( ) [单选题] \*

A.5 年

B.10 年

C.15 年✓

D.7 年

8.接种时医疗卫生人员在实施接种前，开展“三查七对一验证”，其中“三查”不包括以下哪项? ( ) [单选题] \*

A.查询受种者健康状况和接种禁忌证

B.查预防接种卡与儿童预防接种证

C.查既往接种记录✓

D.查疫苗和注射器外观、批号、效期

9.冷藏箱（包）中疫苗的放置，以下错误的是？（ ）[单选题] \*

A.脊灰减毒活疫苗放在冷藏箱（包）的底层

B.卡介苗放底层，并有醒目标记✓

C.百白破疫苗、白破疫苗放在冷藏箱（包）的上层，不能直接接触冰排

D.甲肝减毒活疫苗放在冷藏箱（包）的底层

10.关于使用预防接种信息系统开展接种工作描述不正确的是？（ ）[单选题] \*

A.接种前需要进行疫苗登记

B.所有疫苗均需进行扫码出入库

C.接种时需扫描疫苗追溯码

D.扫码接种主要是指扫描受种对象的条码或二维码✓

11.哪个机构负责儿童预防接种个案信息的收集、登记、录入和网络报告？（ ）[单选题] \*

A.村级医生

B.接种单位✓

C.市级以上疾病预防控制中心

D.县级以上疾病预防控制中心

12.关于皮内接种法操作错误的是？（ ）[单选题] \*

A.吸取 1 人份疫苗，皮肤常规消毒，待消毒液干后，左手绷紧注射部位皮肤，右手持注射器，食指固

定针管

B.针头斜面向上，与皮肤呈 100~150 角刺入皮内

C.左手拇指固定针管，然后注入疫苗，使注射部位形成一个圆形隆起皮丘

D.针管顺时针方向旋转 180°角后拔出针头，用无菌棉签按压针眼部位片刻✓

13.卡介苗冻干注射菌苗稀释方法:用 1mL 注射器将随制品附带的稀释液按要求量精确吸至冻干卡介苗安瓿中,放置多少分钟后摇动安瓿使之溶化,用注射器来回抽取数次,使之充分混匀? ( ) [单选题] \*

A.0.5 分钟

B.1 分钟✓

C.2 分钟

D.3 分钟

14.卡介苗每支安瓿自稀释时起,必须在多少分钟内用完,以防污染? ( ) [单选题] \*

A.10 分钟

B.15 分钟

C.30 分钟✓

D.60 分钟

15.关于肌肉接种法操作错误的是? ( ) [单选题] \*

A.吸取 1 人份疫苗,皮肤常规消毒,左手将三角肌绷紧

B.右手持注射器,与皮肤呈  $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 角,快速刺入针头长度的  $2/3$ ✓

C.固定针管,放松皮肤,注入疫苗后快速拔出针头

D.用无菌棉签稍加按压针眼部位片刻

16.信息系统中的用户要严格遵守国家有关保密制度。用户密码设置不得少于多少位,需使用数字、字母、符号混合编制? ( ) [单选题] \*

A.5 位

B.6 位

C.7 位

D.8 位✓

17.预防接种实行什么管理? ( ) [单选题] \*

- A.儿童户籍地管理
- B.儿童居住地管理✓
- C.儿童出生医院管理
- D.父母原籍管理

18.城镇地区原则上每个镇(街道)至少应当设立一个预防接种门诊,服务半径不超过5公里,实行按日预防接种,每周不少于多少天接种? ( ) [单选题] \*

- A.1天
- B.2天
- C.3天✓
- D.5天

19.如何正确开启疫苗? ( ) [单选题] \*

- A.将疫苗安瓿尖端的疫苗弹至底部,用砂轮在安瓿颈部锯一圈,用75%的酒精棉球消毒安瓿颈部,用消毒干棉球包在安瓿颈部将其折断✓
- B.用砂轮在安瓿颈部锯一圈,用75%的酒精棉球消毒安瓿颈部,用消毒干棉球包住安瓿颈部将其折断
- C.将疫苗安瓿尖端的疫苗弹至体部,用75%的酒精棉球消毒安瓿颈部,用镊子敲开安瓿
- D.将安瓿尖端的疫苗弹至体部,再用砂轮在安瓿颈部锯一圈,用干棉球包住安瓿颈部将其折断

20.乡镇卫生院或社区卫生服务中心开展接种证查验工作,将预防接种证查验完成情况统计表于次年什么时间前上报至县级疾病预防控制中心? ( ) [单选题] \*

- A.1月10日✓
- B.1月20日

C.1月30日

D.2月1日

21.关于疫苗外观质量，下列说法正确的是? ( ) [单选题] \*

A.有摇不散块状物时，需用振荡器多次振荡后使用

B.疫苗如冻结，应放置温水中缓慢解冻后使用

C.安瓿有裂纹但未破裂时可使用

D.无标签或标签不清时不得使用√

22.下列说法正确的是? ( ) [单选题] \*

A.活疫苗开启超过半小时后不能使用√

B.灭活疫苗必须在开启两个小时内使用

C.无细胞百白破是精制疫苗，使用前不需要摇匀

D.肌肉注射应与注射面呈 30°角

23.当疫苗瓶开启后，活疫苗超过多少小时、灭活疫苗超过多少小时未用完，

应将剩余疫苗废弃? ( ) [单选题] \*

A.0.5 小时/0.5 小时 B.0.5 小时/1 小时

C.1 小时/2 小时 D.1 小时/0.5 小时√

24.县级疾病预防控制中心在次年什么时间前将入托入学查验预防接种证查验及疫苗补种工作报表报

送至市级疾病预防控制中心? ( ) [单选题] \*

A.1月10日

B.1月20日√

C.1月30日

D.2月1日

25.下列关于卡介苗的接种，描述错误的是? ( ) [单选题] \*

A.操作技术优劣对卡介苗的异常反应影响不大✓

B.不宜将卡疤率和接种率等同

C.用卡疤率和卡疤大小来替代 PPD 实验，确定接种是否成功，既不准确又无科学依据

D.接种剂量越大，局部病变也越大

26.免疫规划疫苗在最小外包装的显著位置标明“免费”字样和什么专用标识? ( ) [单选题] \*

A.国家免疫

B.扩大免疫

C.计划免疫

D.免疫规划✓

27.入托入学预防接种证查验工作中不是必须查验的疫苗种类是? ( ) [单选题] \*

A.卡介苗、乙型肝炎疫苗、口服脊髓灰质炎减毒活疫苗

B.水痘疫苗、EV71 疫苗、轮状病毒疫苗✓

C.乙型脑炎病毒活疫苗、A 群脑膜炎球菌多糖疫苗、甲肝减毒活疫苗

D.A+C 脑膜炎球菌多糖疫苗或相应疫苗的替代疫苗

28.下列关于接种单位接种免疫规划疫苗收费正确的说法是? ( ) [单选题] \*

A.可以收取疫苗费用

B.可以收接种服务费

C.可以收取接种证成本费

D.不得收取任何费用✓

29.含吸附剂的疫苗冻结后的后果，除因为冷冻后吸附剂胶体被破坏,失去吸附作用外，还包括? ( ) [单选题] \*

- A.恢复致病力
- B.增加不良反应✓
- C.产生毒性物质
- D.没有影响

30.关于卡介苗接种，错误的是? ( ) [单选题] \*

- A.卡介苗接种剂量 0.1ml，接种途径为皮内接种
- B.卡介苗的注射器和针头应专用，皮内接种的剂量要准确，避免注射过深至皮下或肌肉
- C.冻干卡介苗稀释时应注意使之完全溶化，使用时需摇匀，吸入注射器后亦应注意随时摇匀
- D.接种卡介苗时药液外流剂量不足，应另打一针补足剂量✓

31.下面哪一项急救药品是必须准备的? ( ) [单选题] \*

- A.1:1000 肾上腺素✓
- B.抗生素
- C.葡萄糖水
- D.扑尔敏

32.在预防接种日，前来接种的儿童很多，现场所用疫苗存放在什么地方合适? ( ) [单选题] \*

- A.冰箱的冷藏室
- B.冰箱冷冻室
- C.放有冰排的冷藏包内，或临时存放疫苗的小冰箱里✓
- D.直接放在接种台上

33.接种门诊医生误把百白破疫苗存入冷冻室，发现时疫苗已经冻结，该如何正确处理? ( ) [单选题] \*

- A.解冻后发现浑浊，不想浪费继续给儿童接种
- B.解冻后经观察外观无明显改变继续使用

C.放入冷藏室观察其性状是否改变再做决定

D.直接报废疫苗√

34.使用冷藏箱和冷藏包时，操作错误的是? ( ) [单选题] \*

A.检查箱（或包）盖是否密闭，有无破损、开裂

B.在冷藏箱（包）的底层垫上纱布或纸，以吸水和防止疫苗破碎

C.将疫苗安瓿直接与冰排接触，确保冷冻√

D.每次使用冷藏箱（包）后，应清洗擦干后保存

35.接种后应告知受种者或其家长、监护人，以下哪项不正确? ( ) [单选题] \*

A.告知受种者在接种后留在接种现场观察 30 分钟

B.告知如出现异常反应，及时处理和报告

C.预约下次接种疫苗的种类、时间和地点

D.如未带接种证，告知回去自己补上接种记录√

36.接种后关于剩余疫苗处理错误的是? ( ) [单选题] \*

A.废弃已开启疫苗瓶的疫苗

B.冷藏容器内未开启的疫苗做好标记，放入冰箱，下次接种时先用

C.本月接种剩余的免疫规划疫苗应向原发疫苗单位报告，并说明理由

D.已开启的疫苗可以在 3 天以内使用√

37.接种单位如何做好本地儿童外出管理，错误的是? ( ) [单选题] \*

A.掌握儿童外出、返回时间,及时核对接种信息

B.定期对长期外出儿童进行疫苗查漏补种

C.儿童外出马上更改其属性，纳入临时管理对象√

D.和儿童父母建立联系，及时掌握其动向

38.预防接种实施前告知家长的信息不包括哪些内容? ( ) [单选题] \*

- A.接种疫苗的品种
- B.接种疫苗的作用
- C.接种疫苗的禁忌和不良反应
- D.疫苗成分✓

39.对于预防接种证的使用,下列说法错误的是 ( ) [单选题] \*

- A.接种单位负责对新生儿发放接种证,并对没有接种证的儿童建证、补证
- B.如果儿童接种时没有携带接种证,可以采用先接种、后补记录的便民措施✓
- C.入托入学时,幼托机构和学校应负责查验接种证
- D.接种记录应填写接种日期、接种部位、疫苗批号、有效期、生产企业、接种单位和接种人员签章等

40.应当肌内注射的疫苗是 ( ) [单选题] \*

- A.麻腮风和水痘疫苗
- B.乙脑和流脑疫苗
- C.无细胞百白破和乙肝疫苗✓
- D.乙肝和麻疹疫苗

41.下列说法正确的是 ( ) [单选题] \*

- A.卡介苗接种剂量是 0.1ml✓
- B.卡介苗可以在开启半小时后使用
- C.皮内注射应与注射面呈 30 度角
- D.乙肝疫苗冻结后可以继续使用

42.儿童出生后正常情况下在出生医院接种的疫苗是 ( ) [单选题] \*

- A.乙肝疫苗和麻疹疫苗

B.乙肝疫苗和卡介苗✓

C.卡介苗和麻疹疫苗

D.麻疹疫苗和脊髓灰质炎疫苗

43.自毁型注射器使用步骤，以下哪项是正确的? ( ) [单选题] \*

A.取针、吸液、检查、排气、注射、毁型

B.取针、检查、吸液、排气、注射、毁型

C.检查、取针、吸液、排气、注射

D.检查、取针、吸液、排气、注射、毁型✓

44. 下列哪一项不属于预防接种前的准备工作? ( ) [单选题] \*

A.确定接种对象、通知接种对象

B.领取准备疫苗、准备接种器材

C.接种场所准备、准备药品器械

D.进行接种登记、完成疫苗出库✓

45.预防接种组织形式包括哪些? ( ) [单选题] \*

A.常规接种、临时接种、应急接种、入户接种

B.定点接种、临时接种、入户接种、群体接种

C.定点接种、产房接种、临时接种、应急接种

D.常规接种、临时接种、群体接种、应急接种✓

46.预防接种前医生应询问孩子的身体健康状况及既往免疫情况，不包括? ( ) [单选题] \*

A.孩子是否有发热，过敏性史,孩子在某次接种后是否有过过敏反应

B.孩子是否入托入学✓

C.孩子是否患有免疫缺陷或正在接受免疫抑制治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067051046025006041>