2024年广西壮族自治区邕宁区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题真题及参考答案（最新）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对于硼酸的描述，错误的是()

A：清洗外耳道，适量擦拭外耳道，一日3次

B：滴耳；成人一次1～2滴，一日3次

C：用于急、慢性中耳炎

D：作为滴耳剂的常用规格是10ml：4g

答案：D

2.以下关于硫酸阿托品眼用凝胶的叙述，不正确的是

A：为散瞳药

B：前列腺肥大病人慎用

C：青光眼禁用

D：用于虹膜睫状体炎

答案：B

3.不可与氟西汀合用的是

A：竞争性β-内酰胺酶抑制剂

B：核酸合成抑制剂

C：单胺氧化酶抑制剂

D：肝药酶抑制剂

答案：C

4.止泻药()

A：乳果糖

B：硫酸镁

C：甘油

D：地芬诺酯

答案：D

5.下列具有抗血小板作用的药物是

A：噻氯匹定

B：华法林

C：肝素

D：维生素K

答案：A

6.利福平与口服避孕药合用()

A：抑制排酸作用

B：代谢加速而导致意外怀孕

C：子宫内膜突破性出血

D：代谢加快而失效

答案：B

7.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A：注射与口服并用

B：注射给药

C：短期口服给药

D：长期口服给药

答案：C

8.维生素K的作用是()

A: 促凝血因子合成

B: 促进纤维蛋白溶解

C: 抑制纤维蛋白溶解

D: 抑制血小板聚集

答案：A

9.（2018年真题）蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性,临床应用的解毒方案是（）

A: 在用柔红霉素前30min,使用柔红霉素10倍量的右雷佐生

B: 在用柔红霉素同时,使用柔红霉素等量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素前30min,使用柔红霉素2倍量的氟马西尼

D: 在用柔红霉素后30min,使用柔红霉素2倍量的右雷佐生

答案：A

10.降压时常见干咳的不良反应，发生率约为20%的药物是

A: 硝苯地平

B: 烟酸

C: 卡托普利

D: 硝普钠

答案：C

11.肾病综合征患者长期使用泼尼松时,用法为隔日清晨给药一次,这种给药方法的原理是()

A: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

B: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

C: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理利用糖皮质激素逐渐减量原理

D: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

答案：B

12.下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

B: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

C: 属于抗动力药

D: 具有吸附、收敛的作用

答案：C

13.抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A: 静脉用胰岛素

B: 胰岛素皮下注射

C: 二甲双胍

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：A

14.糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

A: 促进胃酸分泌

B: 抑制蛋白质合成

C: 抑制免疫功能只抗炎不抗菌

D: 水钠潴留

答案：D

15.患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 爆发性恶心呕吐
B: 预期性恶心呕吐
C: 延迟性恶心呕吐
D: 急性恶心呕吐
答案：D

16.治疗重度消瘦营养不良的糖尿病的是
A: 二甲双胍
B: A和B均无效
C: 胰岛素
D: 磺酰脲类
答案：C

17.氯霉素抗菌谱广，而典型严重的不良反应是
A: 对造血系统的毒性
B: 二重感染
C: 对肝脏严重损害
D: 胃肠道反应
答案：A

18.患者，男，25岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上10点及下午4点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X线钡餐检查：十二指肠溃疡。
A: 兰索拉唑和阿莫西林
B: 阿莫西林和四环素
C: 米索前列醇和四环素
D: 哌仑西平和西咪替丁
答案：A

19.下列属于窄谱抗菌药物的是

A: 阿莫西林

B: 氨曲南

C: 环丙沙星

D: 头孢唑啉

答案：B

20.伊曲康唑属于

A: 丙烯胺类

B: 抗生素类

C: 吗啉类

D: 唑类

答案：D

21.巨幼红细胞性贫血可选用()

A: 肝素

B: 叶酸

C: 尿激酶

D: 维生素K

答案：B

22.主要经胆汁排泄的抗生素是

A: 青霉素

B: 头孢甲肟

C: 头孢哌酮

D: 美洛西林

答案：C

23.弥散性血管内凝血早期可选用()

A：肝素

B：叶酸

C：维生素K

D：尿激酶

答案：A

24.可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

A：炔诺酮

B：他达拉非

C：米非司酮

D：丙酸睾酮

答案：B

25.通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上PBP3的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

A：头孢他啶

B：氨曲南

C：头孢美唑

D：头孢噻肟

答案：B

26.氨茶碱的作用特点是

A：不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于18个月的婴幼儿和大多数儿童有效

B：舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿

C: 适用于轻度持续型（2级以上）哮喘的长期治疗

D: 10μg/ml为有效治疗浓度，15-20μg/ml以上会出现毒性毒性反应

答案：D

27.属于胃肠解痉药的是

A: 多潘立酮

B: 胶体果胶铋

C: 熊去氧胆酸

D: 山莨菪碱

答案：D

28.导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C: 布洛芬

D: 吲哚美辛

答案：A

29.下列关于蛇毒血凝酶的给药途径，错误的是

A: 口服给药

B: 皮下注射

C: 静脉注射

D: 肌内注射

答案：A

30.变异型心绞痛不宜选用的是

A: 普萘洛尔

B: 硝酸甘油

C：胍乙啶

D：硝苯地平

答案：A

31.（2019年真题）患者，女，52岁，因“闭经1年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日1次，每次1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日1次，每次2mg。

A：激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

B：应在绝经后6年之内开始

C：绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险

D：可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

答案：C

32.奥美拉唑属于

A：M受体拮抗药

B：H+，K+-ATP酶抑制剂

C：H2受体拮抗药

D：胃泌素受体拮抗药

答案：B

33.吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是（）

A：金刚烷胺

B：奥司他韦

C：金刚乙胺

D：扎那米韦

答案：B

34.下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

A: 可以肌内注射，也可以直接静脉注射

B: 严禁肌内注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

C: 禁止肌内注射，可以直接静脉注射

D: 可以肌内注射，禁止直接静脉注射

答案：B

35.容易引起球后神经炎的抗结核药物是

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 链霉素

D: 异烟肼

答案：A

36.下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

A: 卡马西平

B: 氢化可的松

C: 利福平

D: 苯巴比妥

答案：B

37.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

B: 抗肿瘤作用比紫杉醇强

C：属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

D：多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

答案：D

38.与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

A：氯化钠

B：氯化钙

C：枸橼酸钾

D：氯化钾

答案：D

39.患者，男，55岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生的与用药相关的不良反应是

A：体位性低血压

B：心悸

C：性欲减退

D：脱发

答案：C

40.使用铁制品煎煮酸性食物

A：锥体外系反应

B：细胞缺氧、酸中毒、休克

C：恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

D：过敏反应

答案：B

41.（2016年真题）具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

A: 异维A酸
B: 维A酸
C: 过氧苯甲酰
D: 阿达帕林
答案：C

42.可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是
A: 阿达帕林
B: 壬二酸
C: 过氧苯甲酰
D: 维A酸
答案：B

43.与氧头孢烯类药的抗菌活性相似的第三代头孢菌素是
A: 头孢噻肟
B: 头孢美唑
C: 头孢他啶
D: 氨曲南
答案：A

44.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。
A: 促进血栓形成
B: 肾结石
C: 胃肠道反应
D: 尿道刺激
答案：D

45.（2020年真题）痛风急性发作时首选的药物是

A：苯溴马隆

B：秋水仙碱

C：碳酸氢钠

D：非布司他

答案：B

46.因为能增强β-肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

A：倍他司汀

B：二甲双胍

C：尼麦角林

D：丁苯酞

答案：C

47.金刚烷胺和美金刚合用

A：增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

B：增加锥体外系不良反应的风险

C：增加肾毒性

D：可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：A

48.急性广泛性肺栓塞宜选用()

A：肝素

B：叶酸

C：维生素K

D：尿激酶

答案：D

49.（2017年真题）可抑制维生素K环氧化酶活性的抗凝血药是（）

A: 达比加群酯

B: 华法林

C: 依诺肝素

D: 氨甲环酸

答案：B

50.外源性及内源性凝血途径的交汇点是

A: 凝血因子ⅠXa

B: 凝血因子Ⅱa

C: 凝血因子XⅠa

D: 凝血因子Xa

答案：D

51.应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物的是

A: 维生素K3

B: 维生素K4

C: 维生素K1

D: 维生素B1

答案：C

52.某患者，63岁，诊断为"慢性支气管炎急性发作"，痰培养为"铜绿假单胞菌"，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

A: 头孢哌酮

B: 头孢他啶

C: 头孢克洛

D: 哌拉西林

答案：C

53.下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

A: 其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关

B: 对肝硬化者无效

C: 利尿作用强，药效持久

D: 具有抑制心肌纤维化的功能

答案：D

54.属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

A: 阿糖胞苷

B: 甲氨蝶呤

C: 顺铂

D: 环磷酰胺

答案：B

55.与长春新碱合用可增强第Ⅷ对脑神经障碍

A: 异烟肼

B: 铂类

C: 替尼泊苷

D: 非格司亭

答案：B

56.可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

A: 维生素

B: 美司钠

C: 糖皮质激素

D: 呋塞米

答案：B

57.不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

A: 阿卡波糖

B: 甲苯磺丁脲

C: 苯乙双胍

D: 二甲双胍

答案：D

58.与甘露醇相比，甘油果糖具有的特点不包括

A: 起效更快，维持作用时间较长

B: 对患者电解质的平衡无明显影响

C: 可为患者提供一定的能量

D: 利尿作用小

答案：A

59.谷维素适用于

A: 神经源性尿崩症

B: 急慢性脑功能不全

C: 内分泌失调引起的失眠

D: 原发性失眠

答案：C

60.糖尿病选用

A: 丙硫氧嘧啶

B: 大剂量碘剂

C: 放射性碘

D: 格列齐特

答案：D

61.对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A: 乙琥胺

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案：D

62.吡喹酮的抗虫作用首选用于

A: 丝虫

B: 牛肉绦虫

C: 蛔虫

D: 血吸虫

答案：D

63.甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

A: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢

B: 促进吸收

C: 抗菌谱不相似

D: 促进分布

答案：A

64.肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

A: 抗病毒

B: 免疫抑制

C: 抗炎

D: 抗休克

答案：A

65.患者，男性，46岁，经常头痛，头晕近8年。2天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压230／120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为202／120mmHg，且气急不能平卧，心率108次／分，早搏3次／分。两肺底有湿啰音。

A: 硫氰酸盐不超过20μg／ml，氰化物不超过1μmol／ml

B: 硫氰酸盐不超过100μg／ml，氰化物不超过3μmol／ml

C: 硫氰酸盐不超过200μg／ml，氰化物不超过4μmol／ml

D: 硫氰酸盐不超过50μg／ml，氰化物不超过2μmoL／ml

答案：B

66.下列降压药中属于血管紧张素II受体阻断药的是()

A: 地尔硫

B: 阿利克仑

C: 左旋氨氯地平

D: 坎地沙坦

答案：D

67.阿托品2mg时，出现的症状为()

A: 略有口干

B: 瞳孔轻度散大

C: 语言不清

D: 瞳孔扩大

答案：D

68.在真菌细胞内代谢后进入真菌的RNA，抑制DNA和RNA的合成，导致真菌死亡的是

A：两性霉素

B：万古霉素

C：伊曲康唑

D：氟胞嘧啶

答案：D

69.下述保肝药物中可导致低钾血症的是

A：还原型谷胱甘肽

B：多烯磷脂酰胆碱

C：复方甘草酸苷

D：门冬氨酸鸟氨酸

答案：C

70.呋塞米的利尿作用机制主要是

A：抑制Na+-H+交换

B：特异性阻滞Na+通道

C：抑制Na+-K+-2Cl-同向转运子

D：抑制碳酸酐酶

答案：C

71.关于PDE5抑制剂的代谢动力学，错误的是

A：他达拉非的吸收不受油脂性食物的影响

B：伐地那非对PDE1和PDE6的选择性是西地那非的4倍

C：伐地那非对PDE5的选择性是西地那非和他达那非的10倍

D：他达拉非代谢物少部分从粪便，绝大部分经肾排泄

答案：D

72.润滑性泻药()

A：地芬诺酯

B：甘油

C：硫酸镁

D：乳果糖

答案：B

73.（2018年真题）肾结石患者禁用的药物是（）

A：苯溴马隆

B：秋水仙碱

C：别嘌醇

D：非布索坦

答案：A

74.临床上最常用的强心苷类正性肌力药是()

A：米力农

B：多巴酚丁胺

C：地高辛

D：依那普利

答案：C

75.重度阻滞Na+通道的药物是

A：利多卡因

B：普鲁卡因胺

C：普罗帕酮

D：普萘洛尔

答案：C

76.作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A：依托泊苷

B：顺铂

C：紫杉醇

D：来曲唑

答案：D

77.按作用时间分类，属于超长效的胰岛素/胰岛素类似物的是

A：预混胰岛素

B：地特胰岛素

C：普通胰岛素

D：精蛋白锌胰岛素

答案：B

78.用于治疗低磷血症的药物是()

A：三磷酸腺苷

B：碳酸钙

C：葡萄糖

D：二磷酸果糖

答案：D

79.喷托维林为中枢性镇咳药。

A：沙丁胺醇

B：喷托维林

C：氨溴索

D：噻托溴铵

答案：B

80.利多卡因的电生理作用错误的是

A：缩短复极时间

B：提高心室颤动阈值

C：明显影响动作电位0相

D：使传导减慢

答案：C

81.骨折患者、低磷血症患者不宜服用

A：氢氧化镁

B：碳酸钙

C：氢氧化铝

D：三硅酸镁

答案：C

82.关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的错误的是

A：面部、阴部和皱褶部分的湿疹，需长期使用强效制剂

B：未控制的细菌或真菌感染不宜使用

C：若继发细菌或真菌感染，可与抗菌药或抗真菌药联合使用

D：可用于过敏性皮炎的治疗

答案：A

83.使用痤疮治疗药物不会出现

A：眼周局部刺激

B：红斑

C：皮肤色素沉着

D：中枢神经毒性

答案：D

84.骨髓抑制最严重的是()

A：亚叶酸钙

B：顺铂

C：奥沙利铂

D：卡铂

答案：D

85.可抑制细菌 β-内酰胺酶的是()。

A：利福平

B：替考拉宁

C：磷霉素

D：舒巴坦

答案：D

86.具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

A：阿利克伦

B：呋塞米

C：氨氯地平

D：卡托普利

答案：D

87.下列药物中与酚磺乙胺合用可引起中毒的是()

A：氨基己酸

B：氨甲苯酸

C：维生素K

D：维生素C

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/067114130052010024