

运动医学模拟试题+答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、颈椎压缩性骨折合并脱位最先选择的治疗方法是（ ）。

- A、颌枕带牵引
- B、手法复位,石膏外固定
- C、两桌复位法
- D、切开复位内固定
- E、颅骨牵引

正确答案：E

2、骨折急救处理中,以下选项不恰当的是（ ）。

- A、迅速送往医院
- B、复位已戳出创口的骨折端
- C、创口包扎,止血
- D、妥善固定患肢
- E、凡有骨折可疑的病人,均按骨折处理

正确答案：B

3、对关节面软骨的描述,错误的是（ ）。

- A、其功能之一是使关节头和关节窝的形态更为适应
- B、表面光滑,并有少量的滑液
- C、具有支撑重量和减少摩擦的作用
- D、具有一定的弹性
- E、有丰富的血管和神经

正确答案：E

4、桡骨远端骨折后出现银叉样畸形是因为（ ）。

- A、远侧骨折段向掌侧移位
- B、远侧骨折段向背侧移位
- C、远侧骨折段向尺侧移位
- D、以上均不正确
- E、远侧骨折段向桡侧移位

正确答案：B

5、高处坠落致脊髓损伤的患者,来院后哪一项检查最能准确地确定脊髓损伤的平面（ ）。

- A、X线平片
- B、检查感觉平面

- C、检查肢体的温度
- D、MRI 检查
- E、检查肢体的运动

正确答案：D

6、肱骨中段骨折,最容易损伤的神经是()。

- A、肌皮神经
- B、正中神经
- C、桡神经
- D、尺神经
- E、腋神经

正确答案：C

7、女性患者,68 岁,因雪地路滑摔倒,感右髌疼痛,无法行走,查体:右下肢外旋 50° 畸形,右足纵向叩击痛阳性,右股外侧上段肿胀、压痛,该患者最有可能的诊断是()。

- A、骨盆骨折
- B、右髌关节脱位
- C、右股骨颈骨折
- D、右股上段软组织损伤
- E、右粗隆间骨折

正确答案：C

8、男性,20 岁。工人,在工地右大腿被砸伤,当即不能站立,局部剧痛,用哪一种检查最安全迅速、无痛,还可判断有无骨折?()

- A、听诊
- B、移动式小型 X 线机摄片
- C、有否纵向压痛
- D、检查有否异常活动
- E、检查有否骨磨擦音

正确答案：A

9、45 岁女性患者,10 月前因左股骨颈头下型骨折行空心钉固定术,术后 3 月下地行走。近 2 月来,左髌疼痛明显,不能行走,X 线片示左股骨头密度高低不均,形态基本正常,诊断应为()。

- A、左髌关节结核
- B、化脓性关节炎
- C、股骨头肿瘤

D、左股骨头缺血性坏死

E、创伤性关节炎

正确答案：D

10、长期制动对肌肉代谢的影响不正确的是()。

A、肌浆网对 Ca^{2+} 的摄取和释放增加

B、有氧化活动减弱, 无氧酵解活动加强

C、蛋白质合成增加, 而分解减少

D、运氧能力的降低

E、肌肉局部血流量的减少

正确答案：C

11、男性, 马车翻车时砸伤下腹部, 查体: 耻骨联合处压痛, 挤压试验阳性, 膀胱胀满, 橡皮导尿管插入一定深度未引出尿液, 导尿管尖端见血迹, 此时应考虑()。

A、骨盆骨折合并尿道断裂

B、骨盆骨折合并膀胱损伤

C、导尿管阻塞

D、导尿管插入方法不对

E、导尿管插入深度不足

正确答案：A

12、运动对血糖的影响及调节, 说法错误的是()。

A、长时间运动时血糖下降

B、交感神经兴奋, 升血糖类激素分泌增多

C、肝糖原合成增多

D、胰岛素分泌减少

E、短时间极量运动初始阶段, 肌细胞不吸收血糖

正确答案：C

13、男, 35 岁, 因车祸右小腿受伤, 经拍 X 线片, 诊断为右胫骨中下 1/3 交界处斜形骨折, 易发生的合并症是()。

A、血管损伤

B、延迟愈合或不愈合

C、骨筋膜室综合征

D、神经损伤

E、脂肪栓塞

正确答案：B

14、骨折的特有体征是()。

- A、骨擦音和骨擦感
- B、患肢循环障碍
- C、疼痛与压痛
- D、功能障碍
- E、肿胀与瘀斑

正确答案：A

15、男性,32岁,52天前右前臂因锐器刺伤,经清创缝合,现伤口愈合,但遗有爪形手畸形和骨间肌萎缩,该患者最可能的损伤为()。

- A、尺神经损伤
- B、正中神经和桡神经损伤
- C、桡神经损伤
- D、骨间肌损伤
- E、正中神经损伤

正确答案：A

16、骨折切开复位内固定的指征不包括()。

- A、骨折断端间有肌肉等软组织嵌入,手法复位失败者
- B、多处骨折或并发主要的血管损伤
- C、关节内骨折手法复位后对位不好者
- D、保守治疗未达到功能复位的标准
- E、手法复位未能达到解剖复位的标准

正确答案：E

17、男性,24岁,3小时前车祸致左股骨上段骨折,骨端外露,X线片示为小斜折,此时该患的最佳治疗是()。

- A、清创缝合,骨折待二期处理
- B、清创,骨折复位,髓针内固定加外固定
- C、清创缝合,石膏固定
- D、清创缝合,手法复位,夹板固定
- E、清创缝合,夹板固定

正确答案：B

18、肱骨中下1/3骨折,最易发生的并发症是()。

- A、尺神经损伤
- B、正中神经损伤
- C、肱动脉损伤

D、肱二头肌断裂伤

E、桡神经损伤

正确答案：E

19、伸直型肱骨髁上骨折的断端最常见的移位方向是()。

A、近折端向桡侧移位

B、近侧端向后移位

C、远折端向后移位

D、远折端向前多位

E、近折端向尺侧移位

正确答案：C

20、股骨颈骨折后,下列体征不可能出现的是()。

A、患肢略长于健侧

B、髋部叩击痛

C、患肢外旋

D、Bryant 三角底边短缩

E、大转子在 Nelaton 线上方

正确答案：A

21、男性,55 岁,右大腿被汽车撞伤 1 天,中段明显肿胀、压痛,向外成角畸形,皮温高于对侧,体温 38℃,白细胞正常,最可能的诊断是()。

A、右腿血肿

B、右大腿软组织挫伤

C、右股骨干骨折

D、右股骨骨髓炎

E、右大腿软组织化脓感染

正确答案：C

22、骨折的专有体征是()。

A、疼痛与压痛

B、局部肿胀

C、功能障碍

D、血运不良

E、骨摩擦音

正确答案：E

23、肱骨中段骨折,为粉碎性骨折,选择哪种治疗方法为好?()

A、普通钢板固定

- B、手法复位,夹板固定
- C、骨牵引治疗
- D、加压钢板固定
- E、髓内针固定

正确答案: B

24、骨折的专有体征是()。

- A、瘀斑
- B、肿胀
- C、功能障碍
- D、疼痛
- E、反常活动

正确答案: E

25、从马车上摔下,头后枕部着地,颈部活动受限,下颈椎压痛明显,四肢弛缓性瘫,躯干感觉平面在胸骨柄以下,痛、温觉消失,不能自行排尿,诊断首先考虑()。

- A、颈椎骨折脱位并脊髓损伤
- B、颈椎骨折脱位并臂丛神经与腰骶丛神经损伤
- C、颈部软组织损伤
- D、胸椎骨折并脊髓损伤
- E、颈椎间盘突出症

正确答案: A

26、研究脊柱的生物力学时,通常观察脊柱的某一部分,该部分由相邻两椎体及之间的软组织构成,能显示与整个脊柱相似的生物力学特性的最小功能单位,其运动的叠加可构成脊柱的三维运动,称为()。

- A、角加速度
- B、运动节段
- C、杨氏模量
- D、脊柱生物力学
- E、刚体

正确答案: B

27、20岁,男性,夜间骑自行车时,头朝下跌于壕沟,发生四肢不全瘫,X线片显示齿状突骨折伴半脱位,此时在治疗上最先采取的措施是()。

- A、石膏领固定
- B、切开复位内固定

- C、吊带牵引
- D、颅骨牵引固定
- E、环枕固定术

正确答案：D

28、可导致马尾神经损伤的是()。

- A、第 10 胸椎骨折脱位
- B、第 2 腰椎骨折脱位
- C、第 12 胸椎骨折脱位
- D、第 1 腰椎骨折脱位
- E、第 11 胸椎骨折脱位

正确答案：B

29、髋关节前屈时臀大肌是()。

- A、联合肌
- B、拮抗肌
- C、原动肌
- D、固定肌
- E、协同肌

正确答案：B

30、Coles 骨折时,下列哪一种情况最少见?()

- A、合并下尺桡关节脱位
- B、骨折不愈合
- C、合并腕三角软骨盘破裂
- D、合并尺骨茎突骨折
- E、骨折畸形愈合

正确答案：B

31、判断脊柱骨折是否伴有脊髓损伤,下列诊断方便快捷的是()。

- A、MRI 检查
- B、CT 检查
- C、系统的神经系统检查
- D、腰椎穿刺行脑脊液检查
- E、X 线片检查

正确答案：C

32、关于椎间盘的功能,表述不正确的是()。

- A、对纵向负荷起缓冲作用

- B、不能保持脊柱的高度
- C、维持脊柱的生理曲度
- D、使椎体有一定的活动度
- E、保持椎间孔的大小

正确答案：B

33、科雷(Coles)骨折,发生在()。

- A、桡骨的远端
- B、尺骨的远端
- C、桡骨近端
- D、桡骨的任何部位
- E、桡骨

正确答案：A

34、某工地工人因外伤致股骨干闭合性骨折,在运往医院途中,应该()。

- A、人力牵引置下肢中立位
- B、用木板床运送
- C、置左下肢内收内旋位
- D、置左下肢外展屈曲位
- E、将左下肢和右下肢捆扎一起

正确答案：E

35、青年男性,右大腿刀砍伤 1h 入院。患者烦躁不安.体检:心率 110 次/min.唇呈紫绀色.血压 90/60mmHg(12/8kPa),右足发凉,足背动脉消失,股骨下段可见骨折端突出于皮肤。可能的诊断是()。

- A、右股骨下段开放性损伤伴股动脉损伤
- B、右股骨下段开放性骨折伴休克
- C、右股骨下段开放性骨折
- D、右股骨下段开放性骨折伴坐骨神经损伤
- E、右股骨下段骨折伴休克

正确答案：B

36、关于体液的描述错误的是()。

- A、14 岁以上青少年的体液量所占体重的比例和成人相仿
- B、主要成分是水 and 电解质
- C、分为细胞内液和细胞外液两部分
- D、成年女性体液量比成年男性多
- E、小儿的脂肪较少,体液量所占体重的比例较高

正确答案：D

37、含氮激素不包括()。

- A、降钙素
- B、甲状旁腺激素
- C、肾上腺皮质激素
- D、胰高血糖素
- E、胰岛素

正确答案：C

38、长期卧床对心血管系统的影响不正确的是()。

- A、血液黏滞度增加, 静脉血栓形成危险性增加
- B、易发生直立性低血压
- C、最大摄氧量下降, 肌肉功能容量减退
- D、基础心率下降, 舒张期缩短, 减少冠脉血流灌注
- E、中心血容量增加, 利尿素释放增加, 尿量增加, 血浆容积减少

正确答案：D

39、45 岁男性, 车祸 3 小时。入院诊断: 骨盆骨折、左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折。首先应密切观察的是哪种并发症?()

- A、疼痛
- B、创口感染
- C、泌尿系统感染
- D、坠积性肺炎
- E、休克

正确答案：E

40、关于长期卧床者呼吸系统的变化描述错误的是()。

- A、容易诱发呼吸道感染
- B、通气/血流比值的失调, 影响气体交换
- C、纤毛的功能下降, 分泌物排出困难
- D、呼吸肌肌力下降, 肺活量明显下降
- E、肺的顺应性变大

正确答案：E

41、哪项是胫骨中下 1/3 骨折最常见的并发症?()

- A、损伤性骨化
- B、神经损伤
- C、血管损伤

- D、骨折迟延愈合
- E、骨筋膜室综合征

正确答案：D

42、从马车上摔下，头枕部着地，颈部活动受限，下颈椎压痛明显，四肢弛缓性瘫，躯干感觉平面在胸骨柄以下痛、温觉消失，不能自行排尿，诊断首先考虑()。

- A、颈椎骨折脱位并颈髓损伤
- B、颈椎骨折脱位并臂丛神经与腰骶丛神经损伤
- C、颈部软组织损伤
- D、颈椎间盘突出症
- E、胸椎骨折并脊髓损伤

正确答案：A

43、男性儿童，左肘摔伤急诊就医。小夹板外固定后，前臂高度肿胀，手部青白发凉，麻木无力，经拍 X 线片，诊断为左肱骨髁上骨折，若不及时处理，其最可能的后果是()。

- A、骨化性肌炎
- B、关节僵硬
- C、缺血性骨坏死
- D、缺血性肌挛缩
- E、感染

正确答案：D

44、最具有耐力特性的肌纤维类型是()。

- A、II b 型
- B、III型
- C、I 型
- D、II a 型
- E、IV型

正确答案：C

45、颈椎压缩骨折合并脱位最先选择的治疗方法是()。

- A、两桌复位法
- B、颌枕带牵引
- C、切开复位法
- D、手法复位.石膏固定
- E、颅骨牵引

正确答案：E

46、65 岁女性, 跌倒时右手掌着地, 腕部疼痛, 肿胀, 压痛, 无反常活动, 但餐叉状畸形明显, 该患者最可能的诊断是()。

- A、右腕关节挫伤
- B、右舟状骨骨折
- C、尺骨茎突骨折
- D、右腕关节脱位
- E、右腕 Coles(科雷)骨折

正确答案：E

47、女, 20 岁, 因外伤致第 4、5 颈椎骨折并发颈髓损伤, 四肢呈弛缓性瘫痪, 高热 40°C, 持续数日不降, 应采取何种降温方法?()

- A、物理降温
- B、冬眠疗法
- C、口服 APC
- D、以上都不是
- E、使用抗生素

正确答案：A

48、肱骨中段粉碎性骨折, 选用哪种手术方法较好?()

- A、手法复位, 夹板固定
- B、髓内针固定
- C、加压钢板固定
- D、骨牵引治疗
- E、普通钢板固定

正确答案：A

49、26 岁, 男性, 入院前 2 小时被他人用斧砍伤致股骨下段骨折。查体: 足背动脉触不到, 足苍白、发凉, 血压测不到。正确的诊断是()。

- A、股骨下段开放性骨折
- B、股骨下段开放性骨折伴休克
- C、股骨下段开放性骨折, 股动脉损伤伴休克
- D、股骨下段骨折伴休克
- E、股骨下段开放性损伤伴股动脉损伤

正确答案：C

50、长期卧床致患者体重减少的原因不包括()。

- A、患者情绪抑郁, 摄食意愿减低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/06711506620006060>