

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

药理学考试试题及答案

1、应用强心苷治疗时下列哪项是错误的

- A、选择适当的强心苷制剂
- B、选择适当的剂量与用法
- C、洋地黄化后停药
- D、联合应用利尿药
- E、治疗剂量比较接近中毒剂量

答案：C

2、四环素类药物中抗菌作用最强的是

- A、四环素
- B、土霉素
- C、多西环素
- D、米诺环素
- E、替加环素

答案：D

3、可用于解热镇痛，但却能造成凝血障碍的是

- A、麻黄碱
- B、扑热息痛
- C、阿司匹林
- D、吲哚美辛
- E、阿托品

答案：C

4、氟喹诺酮类抗革兰阳性菌的机制是

- A、抑制 DNA 回旋酶
- B、抑制二氢叶酸合成酶
- C、抑制拓扑异构酶IV
- D、抑制二氢叶酸还原酶
- E、抑制 β -内酰胺酶

答案：C

5、具有 Ca^{2+} 通道阻滞作用，可用于治疗慢性心功能不全的药物是

- A、哌唑嗪
- B、肼屈嗪
- C、硝酸甘油
- D、硝苯地平
- E、硝普钠

答案：D

6、可使血 K⁺升高

- A、卡托普利
- B、氢氯噻嗪
- C、两者均是
- D、两者均不是
- E、硝苯地平

答案：A

7、抗炎效能最小的糖皮质激素药物是

- A、氢化可的松
- B、可的松
- C、曲安西龙
- D、甲泼尼松
- E、氟轻松

答案：B

8、庆大霉素无治疗价值的感染是

- A、铜绿假单胞菌
- B、结核性脑膜炎
- C、大肠埃希菌所致尿路感染
- D、革兰阴性杆菌引起的败血症
- E、细菌性心内膜炎

答案：B

9、下列有关毒性反应的叙述，错误的是

- A、治疗量时产生
- B、多因剂量过大引起
- C、危害多较严重
- D、临床用药时应尽量避免毒性反应出现
- E、三致反应也属于毒性反应

答案：A

10、抢救伴有心肌收缩力减弱并伴有尿量减少的休克病人，最好选用的药物是

- A、麻黄碱
- B、去甲肾上腺素
- C、肾上腺素
- D、异丙肾上腺素

E、多巴胺

答案：E

11、硝酸甘油与普萘洛尔共有的作用是

- A、减弱心肌收缩力
- B、降低血压
- C、增大心室容积
- D、减慢心率
- E、诱发支气管痉挛

答案：B

12、与呋噻米合用，使其耳毒性增强的抗生素是：

- A、青霉素类
- B、磺胺类
- C、四环素类
- D、大环内酯类
- E、氨基糖苷类

答案：E

13、利尿药的分类及搭配正确的是

- A、中效利尿药——布美他尼
- B、高效利尿药——阿米洛利
- C、低效利尿药——呋噻米
- D、高效利尿药——氢氯噻嗪
- E、低效利尿药——螺内酯

答案：E

14、糖皮质激素不适用于

- A、中毒性菌痢
- B、重症伤寒
- C、霉菌感染
- D、暴发型流行性脑膜炎
- E、猩红热

答案：C

15、洋地黄中毒所致的完全性房室传导阻滞禁用

- A、阿托品
- B、山莨菪碱
- C、溴丙胺太林
- D、异丙肾上腺素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067122121132006115>