2023-2024年江苏省溧阳市《执业药师之西药学专业二》考试题库（黄金题型）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是()

A：两性霉素B

B：伏立康唑

C：卡泊芬净

D：氟康唑

答案：D

2.（2020年真题）克罗米通乳膏用于治疗

A：寻常痤疮

B：体、股癣

C：蛲虫感染

D：疥疮

答案：D

3.可引起乳房肿大的药物是()

A：阿司咪唑

B：苯海拉明

C：西咪替丁

D：组胺

答案：C

4.治疗慢性室性心律失常的药物是()

A: 美西律
B: 维拉帕米
C: 奎尼丁
D: 胺碘酮
答案：A

5.可用于防治泌尿系统结石的是
A: 氯化钠
B: 枸橼酸钾
C: 氯化钾
D: 氯化钙
答案：B

6.患者女，55岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138/90mmHg，心率120次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。
A: 3周
B: 1周
C: 2周
D: 4周
答案：C

7.（2018年真题）对β-内酰胺类抗菌药物过敏的患者，Ⅰ类切口围术期预防应用抗菌药物时，可选用（）
A: 万古霉素
B: 青霉素G
C: 氨曲南
D: 头孢唑林

答案：C

8.（2019 年真题）患者，女，13 岁，有哮喘病史，半年前月经初潮，周期 28 天经期持续 4-5 天，月经前两天疼痛明显，影响正常的学习和活动，诊断为原发性痛经，适宜该患者使用的缓解痛经的药物是（）

A: 吲哚美辛栓

B: 布洛芬片

C: 塞来昔布胶囊

D: 对乙酰氨基酚片

答案：D

9.（2019 年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 呋塞米

B: 比索洛尔

C: 螺内酯

D: 贝那普利

答案：D

10.（2015 年真题）属于膨胀性泻药的是（）。

A: 聚乙二醇 4000

B: 酚酞

C: 甘油（开塞露）

D: 乳果糖

答案：A

11.可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A: 硫酸亚铁

B: 重组人促红素

C: 人血白蛋白

D: 维生素 B12

答案：B

12.易引起吉海反应的药物是()

A: 青霉素

B: 诺氟沙星

C: 庆大霉素

D: 四环素

答案：A

13.可与催化肽聚糖合成的磷酸烯醇丙酮酸转移酶不可逆性结合，使该酶灭活，阻断细菌细胞壁的合成，从而导致细菌死亡的是

A: 美罗培南

B: 利奈唑胺

C: 磷霉素

D: 万古霉素

答案：C

14.头孢菌素类药的主要作用靶点是

A: 细胞内膜 PBP

B: 核糖体的 30S 亚基

C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

D: 核糖体的 50S 亚基

答案：A

15.（2015 年真题）长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充（）。

A: 维生素 B 和维生素 K

B: 维生素 E 和叶酸

C: 维生素 C 和烟酸

D: 维生素 A 和维生素 D

答案：A

16.巨幼细胞贫血应首选

A: 维生素 B6

B: 维生素 B12

C: 亚叶酸钙

D: 叶酸+维生素 B12

答案：D

17.（2021 年真题）由于氧吡格置部分经 CYP2C19 转化为活性代谢物，合用控制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效，故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是（）

A: 雷贝拉唑

B: 奥美拉唑

C: 兰索拉唑

D: 泮托拉唑

答案：B

18.血管紧张素Ⅰ转化酶抑制剂是

A: 地高辛

B: 多巴酚丁胺

C: 依那普利

D: 米力农

答案：C

19.抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

A: 丝裂霉素

B: 阿霉素

C: 环磷酰胺

D: 放线菌素 D

答案：C

20.在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

A: 二磷酸腺苷 P2Y12 受体阻断剂

B: 整合素受体阻断剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 环氧酶抑制剂

答案：D

21.可致色觉异常的药物是

A: 硝酸甘油

B: 氨氯地平

C: 地高辛

D: 卡托普利

答案：C

22.兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（）

A: 赛洛唑啉滴鼻液

B: 呋麻滴鼻液

C: 麻黄碱滴鼻液

D: 羟甲唑啉鼻喷剂

答案：B

23.服用二甲双胍期间应注意()

A: 服药期间不可饮酒

B: 肝功能不全患者无需调整剂量

C: 无需控制饮食

D: 初始治疗可大剂量给药

答案：A

24.（2021 年真题）用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是（）

A: 聚乙二醇滴眼液

B: 雷珠单抗注射液

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 硫酸阿托品眼用凝胶

答案：B

25.（2018 年真题）用于治疥疮的药物有（）

A: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

D: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

答案：D

26.门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: G

C: G

D: M 期

答案：C

27.缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A: 维生素 C

B: 维生素 B12

C: 铁剂

D: 叶酸

答案：C

28.（2018 年真题）可用于降低眼压的药物是（）

A: 左氧氟沙星

B: 利福平

C: 卡替洛尔

D: 阿托品

答案：C

29.肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

A: 异烟肼

B: 红霉素

C: 氟胞嘧啶

D: 青霉素

答案：A

30.（2015 年真题）属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是（）。

A: 炔雌醇

B: 阿那曲唑

C: 他莫昔芬

D: 丙酸睾酮

答案：C

31.治疗钙缺乏症可选用

A: 葡萄糖酸钙

B: 阿伦膦酸钠

C: 依降钙素

D: 阿法骨化醇

答案：A

32.支气管哮喘急性发作时宣使用的药物是（）

A: 孟鲁司特钠咀嚼片

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 吸入用布地杂德混悬液

D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

答案：B

33.基因重组产品，与天然内源性红细胞生成素作用相似的是()

A: 重组人促红素

B: 链激酶

C: 尿激酶

D: 叶酸

答案：A

34.可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A: 克拉维酸
B: 亚胺培南
C: 氨曲南
D: 阿莫西林
答案：C

35.维生素 B1 缺乏时引起()
A: 成人佝偻病
B: 坏血病
C: 角膜软化症
D: 脚气病
答案：D

36.丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是
A: 头痛
B: 粒细胞缺乏症
C: 关节痛
D: 胃肠道反应
答案：B

37.用药过程中需注意监护心脏毒性的是()
A: 丝裂霉素
B: 甲氨蝶呤
C: 多柔比星
D: 伊立替康
答案：C

38.具有心脏毒性的抗肿瘤药物

A: 长春新碱

B: 博来霉素

C: 紫杉醇

D: 柔红霉素

答案：D

39.夜盲症患者应选用的维生素是

A: 维生素 A

B: 维生素 D

C: 维生素 B

D: 维生素 B

答案：A

40.有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

A: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

B: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

C: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效

D: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

答案：C

41.有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

A: 芳基丙酸类

B: 选择性 COX-2 抑制剂

C: 水杨酸类

D: 芳基乙酸类

答案：C

42.对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A：氯喹

B：依米丁

C：替硝唑

D：喹碘方

答案：A

43.关于糖皮激素抗炎作用特点的描述，不正确的是

A：促进肉芽组织生成，加速组织修复

B：抑制白细胞和吞噬细胞移行血管外，减轻炎症浸润

C：直接收缩血管，减少渗出和水肿

D：稳定溶酶体膜，抑制致炎物的释放

答案：A

44.青霉素()

A：对 G

B：抗菌作用强，对厌氧菌有效

C：对 G

D：特别对铜绿假单胞菌有效

答案：C

45.（2018 年真题）对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是（）

A：利福平

B：卡替洛尔

C：阿托品

D：左氧氟沙星

答案：A

46.可使维生素 B

A：丙磺舒

B：雌激素

C：异烟肼

D：糖皮质激素

答案：B

47.（2019 年真题）长期使用可能导致血钾升高的降压药物是（）

A：硝普钠

B：贝那普利

C：美托洛尔

D：氨氯地平

答案：B

48.可用于洋地黄中毒导致的室上性心律失常的药物首选

A：奎尼丁

B：美西律

C：苯妥英钠

D：氟西汀

答案：C

49.维生素 B1 缺乏时出现

A：成人佝偻病

B：糙皮病

C：脚气病

D：夜盲症

答案：C

50.戈那瑞林的禁忌不包括

A：垂体相关性闭经者

B：肝肾病患者

C：垂体腺瘤患者

D：妊娠期妇女

答案：B

51.患者男性，25岁。咽炎，注射青霉素后1分钟，呼吸急促，面部发绀，心率130次/分，血压60/40mmHg。

A：地塞米松+多巴胺

B：地塞米松+肾上腺素

C：曲安西龙+异丙肾上腺素

D：地塞米松+去甲肾上腺素

答案：B

52.仅对蛔虫、蛲虫混合感染有效的是()

A：甲苯咪唑

B：氯硝柳胺

C：噻嘧啶

D：哌嗪

答案：D

53.下述药物中兼有角质溶解和抑制真菌作用的是

A：咪康唑

B：苯甲酸

C：阿莫罗芬

D：特比萘芬

答案：B

54.变异型心绞痛不宜选用的药物是()

A: 普萘洛尔

B: 硝酸甘油

C: 硝苯地平

D: 胍乙啶

答案：A

55.属于 α

A: 酚妥拉明

B: 普适泰

C: 特拉唑嗪

D: 度他雄胺

答案：C

56.帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

A: 60mg

B: 100mg

C: 20mg

D: 50mg

答案：C

57.属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是()。

A: 托烷司琼

B: 维生素 B

C: 阿瑞吡坦

D: 甲氧氯普胺

答案：C

58.顺铂

A：干扰 RNA 转录

B：影响蛋白质合成和功能

C：直接破坏 DNA 结构和功能

D：干扰核酸生物合成

答案：C

59.有关阿托品的药理作用不正确的是

A：扩张血管，改善微循环

B：松弛内脏平滑肌

C：大剂量可使心率减慢

D：抑制腺体分泌

答案：C

60.下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

A：不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

B：选择性高

C：可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值(INR)

D：治疗剂量下不会引起血小板减少

答案：A

61.可与核糖体 30S 亚单位结合、而抑制细菌蛋白质合成的药物是

A：替加环素

B：多黏菌素

C：环丙沙星

D：庆大霉素

答案：A

62.甲状腺功能亢进症的内科治疗选用

A：大剂量碘剂

B：放射性碘

C：格列齐特

D：丙硫氧嘧啶

答案：D

63.阿片类药物治疗期间最常出现的不良反应

A：认知障碍

B：尿频、尿急、尿潴留

C：身体和精神依耐性

D：便秘、恶心、镇静功能受损

答案：D

64.抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

A：博来霉素

B：长春新碱

C：多柔比星

D：环磷酰胺

答案：D

65.具有心脏毒性的抗肿瘤药是

A：紫杉醇

B：博来霉素

C：长春新碱

D: 柔红霉素

答案：D

66.服用异烟肼进行抗结核治疗的患者,为预防周围神经炎,应补充的维生素是（）

A: 维生素 B6

B: 维生素

C: 维生素 A

D: 维生素 B2

答案：A

67.属于 α-葡萄糖苷酶抑制剂的药物是

A: 伏格列波糖

B: 那格列奈

C: 利拉鲁肽

D: 阿格列汀

答案：A

68.与青霉素相比，阿莫西林()

A: 对革兰阳性细菌的抗菌作用强

B: 对 β-内酰胺酶稳定

C: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

D: 对革兰阴性杆菌作用强

答案：D

69.甲氧氯普胺的作用不包括

A: 刺激泌乳素释放

B: 促进胃酸分泌

C: 促进胃肠蠕动

D: 胃肠道兴奋作用

答案：B

70.可能导致牙龈增生的药物是

A: 拉西地平

B: 普伐他汀

C: 依诺肝素

D: 普萘洛尔

答案：A

71.属于第四代头孢菌素的药物是()

A: 头孢噻吩

B: 头孢哌酮

C: 头孢噻肟

D: 头孢吡肟

答案：D

72.适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

A: 乙胺嘧啶

B: 奎宁

C: 蒿甲醚

D: 双氢青蒿素

答案：D

73.氟西汀的作用机制是

A: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解

B: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度

C: 抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取

D: 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取

答案：B

74.（2019 年真题）长期用药易发生低镁血症的药物是（）

A: 奥美拉唑

B: 胶体果胶铋

C: 复方碳酸钙

D: 替普瑞酮

答案：A

75.适用于心功能比较稳定的Ⅱ～Ⅲ级心力衰竭患者的药物是

A: 氯沙坦

B: 维拉帕米

C: 卡维地洛

D: 多巴酚丁胺

答案：C

76.使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

A: 血压升高或降低、心率加快调

B: 发热、血管扩张、面色潮红

C: 喉头水肿、尿潴留

D: 头痛、胸闷、气急、出汗

答案：C

77.抑制碳酸酐酶的药物是

A：呋塞米
B：氢氯噻嗪
C：乙酰唑胺
D：氨苯蝶啶
答案：C

78.可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是
A：氯化钠
B：乳酸钠
C：硫酸镁
D：氯化铵
答案：B

79.头孢噻吩
A：用于非典型病原体感染
B：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
C：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
D：肾毒性较大
答案：D

80.作用于血管内皮生长因子的单克隆抗体靶向药物是
A：贝伐珠单抗
B：利妥昔单抗
C：曲妥珠单抗
D：西妥昔单抗
答案：A

81.用于先兆性流产和习惯性流产

A：米非司酮

B：地塞米松

C：雷洛昔分

D：黄体酮

答案：D

82.抑制胃酸分泌作用的药物是

A：奥关拉唑

B：碳酸钙

C：莫沙必利

D：枸橼酸铋钾

答案：A

83.可用于习惯性流产的药品是()

A：他莫昔芬

B：依普黄酮

C：戊酸雌二醇

D：地屈孕酮

答案：D

84.目前治疗肺孢子菌病首选的药物是

A：氨曲南

B：特比萘芬

C：卡泊芬净

D：复方磺胺甲噁唑

答案：D

85.胰岛素对代谢的作用叙述错误的是

A：减少酮体生成
B：促进糖原合成
C：抑制糖原分解
D：抑制脂肪的合成
答案：D

86.患者,男,60岁诊断为房性心律失常,医生给予胺碘酮治疗。近日,因胃溃疡开始用西咪替丁,出现窦性心动过缓症状。胺碘酮典型不良反应()。
A：①②④⑤
B：③④⑤
C：①③⑤
D：②④⑤
答案：A

87.（2020年真题）用于散瞳的眼用药物是
A：毛果芸香碱
B：噻吗洛尔
C：溴莫尼定
D：复方托吡卡胺
答案：D

88.患者，女性，28岁。妊娠5个月。淋雨1天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10
A：阿奇霉素

B: 磺胺嘧啶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/068002014133007022