

中医眼科学试题及答案

1、临床上治疗缺血性视神经病变可选用以下哪种药物()颞浅动脉旁皮下注射

- A. 利多卡因注射液
- B. 维生素 B12 注射液
- C. 丹参注射液
- D. 维生素 B1
- E. 复方樟柳碱注射液

【答案】 E

2、下列哪种说法是错误的

- A. 肉轮系指胞睑, 在脏属脾
- B. 火轮系指两眦, 在脏属心
- C. 气轮系指白睛, 在脏属肺
- D. 风轮系指黑睛, 在脏属肝
- E. 水轮系指瞳神, 在脏属肾

【答案】 B

3、下列哪一种不属于新翳

- A. 凝脂翳
- B. 斑脂翳
- C. 气翳

D. 花翳白陷

E. 聚星障

【答案】B

4、在现存古代医籍中,最早记载五轮学说的是

A. 《灵枢·大惑论》

B. 《诸病源候论》

C. 《太平圣惠方》

D. 《证治准绳》

E. 《审视瑶函》

【答案】C

5、异物入目的主要临床表现为

A. 白睛片状鲜红溢血

B. 白睛混赤壅肿,呈灰白色坏死

C. 白睛或黑睛破裂,神水溢出

D. 白睛或黑睛表层异物存留,伴白睛红赤或抱轮红赤

E. 白睛混赤而肿,黑睛表层微混

【答案】D

6、患者,男,62岁。凝脂翳一月余,现眼红、痛,畏光较轻,眼内干涩,黑睛溃陷,久不收敛,凝脂见薄,伴体倦便溏,舌淡,苔薄白,脉虚弱,应选用何治法

A. 祛风清热

- B. 泻火解毒
- C. 祛湿清热
- D. 滋阴降火
- E. 益气养血, 清泄余热

【答案】 E

7、患者阅读稍久即感眼球酸胀, 头痛, 不欲睁眼, 休息后可缓解, 应首先进行下列哪项检查

- A. 头颅 CT
- B. 眼部 B 超
- C. 新斯的明实验
- D. 屈光状态检查
- E. 视觉诱发电位

【答案】 D

8、绿风内障的西医治疗宜用

- A. 缩瞳剂
- B. 扩瞳剂
- C. 抗生素
- D. 房水抑制剂
- E. 脱水剂

【答案】 ADE

9、泻火解毒法主要用于治疗

- A. 外感火热之邪所致的眼病
- B. 外感风热之邪所致的眼病
- C. 阴虚火旺所致的眼病
- D. 气血凝滞所致的眼病
- E. 肝气郁结所致的眼病

【答案】 A

10、风为阳邪,有升发.向上.向外的特点,这主要是因为风邪有哪个特性

- A. 为百病之长
- B. 善行数变
- C. 常夹邪为患
- D. 开泄
- E. 善动不居

【答案】 D

11、两眦在五轮中称为

- A. 火轮
- B. 风轮
- C. 气轮
- D. 血轮

E. 水轮

【答案】D

12、每只眼有()条眼外肌

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

E. 8

【答案】D

13、胞睑振跳,时疏时频,劳累或失眠加重,兼见心烦失眠,怔忡健忘,食少体倦,舌淡苔薄白,脉细弱,宜采用下列何方加减治疗

A. 补中益气汤

B. 当归活血饮

C. 归脾汤

D. 正容汤

E. 逍遥散

【答案】C

14、眼科常用的辛凉解表药有

A. 桑叶.菊花.柴胡.薄荷.蝉蜕

B. 荆芥.防风.白芷.羌活.细辛

- C. 金银花. 野菊花. 连翘. 大青叶. 板蓝根
- D. 夏枯草. 决明子. 青葙子. 密蒙花. 木贼草
- E. 生地. 丹皮. 赤芍. 黄芩. 黄柏

【答案】 C

15、视神经起于视盘, 止于视交叉前脚, 全长约

- A. 25mm
- B. 30mm
- C. 35mm
- D. 40mm
- E. 45mm

【答案】 D

16、眼之能够明视万物, 辨别颜色, 是赖

- A. 肾精充养
- B. 脾气温养
- C. 肝气条达
- D. 肝血升运
- E. 五脏六腑精气的滋养

【答案】 E

17、下列哪种眼病不属于眼外伤范畴

- A. 撞击伤目
- B. 真睛破损
- C. 异物入目
- D. 漏睛
- E. 化学性眼损伤

【答案】D

18、以下哪种病不属于暴盲的范畴

- A. 视神经乳头炎
- B. 视网膜中央动脉阻塞
- C. 视网膜静脉周围炎
- D. 虹膜睫状体炎
- E. 急性球后视神经炎

【答案】D

19、患者,女,76岁。眼痛,畏光流泪,抱轮红赤,黑睛深层灰白色混浊,由周边向中央蔓延,兼见头痛.鼻塞.舌红,苔薄黄,脉浮数,辨证属何证型

- A. 肝经风热证
- B. 肝胆热毒证
- C. 湿热内蕴证
- D. 虚火上炎证
- E. 正虚邪留证

【答案】 A

20、以下哪项不是眼的附属器

- A. 眼睑
- B. 眼眶
- C. 结膜
- D. 晶状体
- E. 泪器

【答案】 D

21、绿风内障的诊断依据是

- A. 白睛混赤, 黑睛透明, 瞳神散大, 展缩失灵, 瞳色呈淡绿色。前房变浅, 房角关闭。眼压明显升高, 多在 50mmHg 以上
- B. 白睛混赤, 黑睛雾状混浊, 瞳神缩小, 展缩失灵, 瞳色呈淡绿色。前房变浅, 房角关闭。眼压明显升高, 多在 50mmHg 以上
- C. 白睛混赤, 黑睛雾状混浊, 瞳神散大, 展缩失灵, 瞳色呈淡绿色。前房变浅, 房角正常。眼压明显升高, 多在 50mmHg 以上
- D. 白睛混赤, 黑睛雾状混浊, 瞳神散大, 展缩失灵, 瞳色呈淡绿色。前房变浅, 房角关闭。眼压升高, 多在 25mmHg 以上
- E. 白睛混赤, 黑睛雾状混浊, 瞳神散大, 展缩失灵, 瞳色呈淡绿色。前房变浅, 房角关闭。眼压明显升高, 多在 50mmHg 以上

【答案】 E

22、绿风内障西医急救处理时使用 1%毛果芸香碱的目的是

A. 抑制房水生成, 降低眼压

B. 利尿降压

C. 缩小瞳孔

D. 扩大瞳孔

E. 缓解疼痛

【答案】 C

23、患眼起病急骤, 眼胀, 头痛如劈. 连及目眶, 视力急降或仅存光感。检查眼部可见白睛混赤肿胀, 黑睛混浊呈雾状, 前房极浅或几近消失, 瞳神散大, 呈淡绿色, 眼硬如石。全身兼见恶心呕吐, 口苦口干, 尿黄便结, 舌红苔黄, 脉弦数。宜选下列何方治疗

A. 龙胆泻肝汤

B. 将军定痛丸

C. 绿风羚羊饮

D. 温胆汤

E. 驱风散热饮子

【答案】 C

24、眼压是指

A. 眼球内容物对眼眶所施加的压力

B. 眼球内容物对眼底所施加的压力

C. 眼球内容物对眼球壁所施加的压力

D. 眼球内容物对视网膜所施加的压力

E. 以上都不对

【答案】 C

25、凝脂翳的主要病因病机是

A. 外感风热

B. 外感风湿

C. 黑睛外伤. 风热外袭

D. 黑睛外伤. 湿毒之邪侵入

E. 黑睛外伤. 风热邪毒侵入

【答案】 C

26、左眼患病日久, 缠绵难愈, 眼珠坠胀闷痛, 视物不清。神水混浊, 瞳神紧小; 伴肢节酸痛; 苔黄腻, 脉数。证属

A. 肝经风热

B. 风湿夹热

C. 肝胆火炽

D. 脾胃湿热

E. 以上均不是

【答案】 B

27、脉络膜的血管丰富, 其血液主要来自

A. 睫状后短动脉

B. 视网膜中央动脉

- C. 睫状后长动脉
- D. 前睫状动脉
- E. 后睫状动脉

【答案】A

【解析】

28、胎患内障的发病原因主要是什么

- A. 先天因素
- B. 劳倦因素
- C. 外伤因素
- D. 衰老因素
- E. 药物不良反应

【答案】A

29、眼科常用的辛凉解表药有

- A. 桑叶. 菊花. 柴胡. 薄荷. 蝉蜕
- B. 荆芥. 防风. 白芷. 羌活. 细辛
- C. 金银花. 野菊花. 连翘. 大青叶. 板蓝根
- D. 夏枯草. 决明子. 青葙子. 密蒙花. 木贼草
- E. 生地. 丹皮. 赤芍. 黄芩. 黄柏

【答案】C

30、视瞻昏渺中有一定自愈性的病变是

- A. 年龄相关性黄斑变性
- B. 中心性渗出性视网膜脉络膜病变
- C. 缺血性视神经病变
- D. 中心性浆液性视网膜脉络膜病变
- E. 玻璃体积血

【答案】D

31、眉棱骨痛时按压此处有压痛

- A. 睛明
- B. 丝竹空
- C. 阳白
- D. 攒竹
- E. 瞳子髎

【答案】D

32、发于白睛之病症,有时责之于肺,有时不为肺之病,如白睛发黄,形成原因是

- A. 脾胃湿热,交蒸肝胆,胆汁外溢
- B. 肺经风热,上犯于目
- C. 肺胃蕴热,上蒸于目
- D. 肝郁化火,上攻于目白

E. 肝胆实火, 上攻于目白

【答案】A

33、患者视物昏蒙, 视衣脱离, 神水混浊, 伴头目昏痛. 耳鸣. 肢体困重, 舌红苔黄腻, 脉濡数, 宜采用下列何方加减治疗

A. 三仁汤

B. 龙胆泻肝汤

C. 抑阳酒连散

D. 五苓散

E. 以上都不是

【答案】C

34、患者视力突降, 视物不清, 眼底检查可见视衣脉络阻塞, 形成出血。其病机多属

A. 气虚气陷

B. 气滞气逆

C. 血虚

D. 血热

E. 血瘀

【答案】E

35、撞击伤目的常见病因为

A. 球类. 棍棒. 拳头. 砖头. 石块. 皮带等钝器击伤

B. 细小昆虫飞扑入目

- C. 金属碎屑. 玻璃细渣. 谷壳. 麦芒等溅入眼内
- D. 刀. 剪. 锥. 针. 钉. 铁丝. 木签等锐器刺破眼珠
- E. 使用紫外线灭菌灯. 太阳灯. 高能光源等防护不当

【答案】A

36、中心性浆液性脉络膜视网膜病变西医目前认为唯一有效的治疗方法是

- A. 血管扩张剂
- B. 皮质激素
- C. 抗生素
- D. 多种维生素
- E. 激光光凝治疗

【答案】E

37、患者 38 岁, 视力明显下降, 目珠隐痛, 眼底视盘正常, 情志抑郁, 胸胁满胀, 舌质偏红, 苔薄白, 脉弦。宜采用下列何方加减治疗

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 逍遥散
- C. 四物汤
- D. 白薇丸
- E. 以上都不是

【答案】B

38、天行赤眼暴翳病发于眼睛的部位是

- A. 白睛
- B. 黑睛
- C. 白睛和黑睛同时发病
- D. 睑胞和白睛同时发病
- E. 白睛和眦部同时发病

【答案】 B

39、正常瞳孔大小范围

- A. 1——2.5 毫米
- B. 2——3 毫米
- C. 4——5 毫米
- D. 2.5——4 毫米
- E. 5——6 毫米

【答案】 D

40、每只眼有()条眼外肌

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 8

【答案】D

41、以角膜映光法测斜视角时,若反光点偏角膜正中央的鼻侧,位于角膜缘,估计其斜视角约为

A. 内斜 10° —— 15°

B. 内斜 25° —— 30°

C. 内斜 45°

D. 外斜 45°

E. 外斜 25° —— 30°

【答案】D

42、视瞻昏渺中的中心性浆液性视网膜脉络膜病变发生在

A. 周边视网膜

B. 视乳头

C. 黄斑部及其附近视网膜

D. 脉络膜

E. 玻璃体

【答案】C

43、前房出血引起角膜血染的原因是

A. 继发性青光眼

B. 继发低眼压

C. 积血超过了 24 小时

D. 由于角膜裂伤, 使积血渗入

E. 由于角膜上皮受伤所致

【答案】 A

44、患者产后哺乳期发病, 视物昏蒙, 目珠隐痛, 眼底视盘正常, 少气懒言, 面白唇淡, 神疲倦怠; 舌淡嫩, 脉细无力。宜选下列何方治疗

A. 除风益损汤

B. 驱风一字散

C. 人参养荣汤

D. 逍遥散

E. 九味羌活汤

【答案】 C

45、发于白睛之病症, 有时责之于肺, 有时不为肺之病, 如白睛发黄, 形成原因是

A. 脾胃湿热, 交蒸肝胆, 胆汁外溢

B. 肺经风热, 上犯于目

C. 肺胃蕴热, 上蒸于目

D. 肝郁化火, 上攻于目白

E. 肝胆实火, 上攻于目白

【答案】 A

46、治疗聚星障阴虚邪留证的主方是

A. 龙胆泻肝汤

- B. 银翘散
- C. 加减地黄丸
- D. 四顺清凉饮子
- E. 三仁汤

【答案】 C

47、消渴目病增殖期的标志性眼底变化是(据 1984 年我国制定 DR 分期标准,眼底出现新生血管为增殖期)

- A. 微动脉瘤
- B. 斑片状出血
- C. 视网膜新生血管
- D. 视网膜棉絮状斑
- E. 黄斑水肿

【答案】 D

48、泻火解毒法主要用于治疗

- A. 外感火热之邪所致的眼病
- B. 外感风热之邪所致的眼病
- C. 阴虚火旺所致的眼病
- D. 气血凝滞所致的眼病
- E. 肝气郁结所致的眼病

【答案】 A

49、患者男, 55 岁, 眉棱骨痛伴前额疼痛, 伴发热恶风, 鼻塞流涕。多由于

- A. 风热外袭, 上扰清窍
- B. 肝郁化火, 目窍不利
- C. 肝血不足, 外感风邪
- D. 风痰上逆, 目窍不利
- E. 邪毒侵袭, 壅闭清窍

【答案】A

50、与七情过激有关的眼病有

- A. 绿风内障
- B. 青风内障
- C. 圆翳内障
- D. 高风内障
- E. 漏睛

【答案】AB

51、风热壅盛型凝脂翳的治疗可选用

- A. 龙胆泻肝汤十羟苄唑滴眼液十 1%匹罗卡品滴眼液
- B. 新制柴连汤十典必舒滴眼液十 1%匹罗卡品滴眼液
- C. 龙胆泻肝汤十可的松滴眼液十 1%阿托品滴眼液
- D. 龙胆泻肝汤十诺氟沙星滴眼液十 1%阿托品滴眼液

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068016030010006037>