2024河南省《执业药师之西药学专业二》考试必背200题带答案下载

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A：阿司匹林

B：塞来昔布

C：吲哚美辛

D：对乙酰氨基酚

答案：D

2.维生素K参与合成的凝血因子不包括

A：凝血因子Ⅱ

B：凝血因子Ⅷ

C：凝血因子Ⅶ

D：凝血因子Ⅸ

答案：B

3.属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

A：阿昔洛韦

B：奥司他韦

C：恩替卡韦

D：司他夫定

答案：C

4.（2020年真题）餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A：铝碳酸镁

B：米索前列醇

C：枸橼酸铋钾

D：兰索拉唑

答案：A

5.与 α1 受体阻断剂无相互作用的药物是

A：西咪替丁

B：地尔硫

C：卡马西平

D：第三代头孢菌素

答案：D

6.主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

A：普萘洛尔

B：洛伐他汀

C：氯贝丁酯

D：苯扎贝特

答案：B

7.双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

A：通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

B：作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

C：促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

D：降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

答案：D

8.关于万古霉素，描述错误的是

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 属于杀菌剂

C: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

D: 肾功能不全者无需调整剂量

答案：D

9.（2016年真题）用于治疗低磷血症的药物是

A: 二磷酸果糖

B: 葡萄糖

C: 三磷酸腺苷

D: 碳酸钙

答案：A

10.长期大量服用维生素A会出现()

A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、体重减轻、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

11.患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物

B: 在使用万古霉素的第4个维持剂量给药前测定谷浓度

C: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

D: 该万古霉素浓度偏低

答案：A

12.为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

A: VLDL

B: LDL

C: IDL

D: HDL

答案：D

13.复方炔诺酮()

A: 抑制排卵作用

B: 抗着床

C: 减少精子数目

D: 促进蛋白质合成

答案：A

14.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A: 肾结石

B: 促进血栓形成

C: 胃肠道反应

D: 尿道刺激

答案：D

15.氯化钾的禁忌证是

A：急性脱水

B：急、慢性肾功能不全

C：妊娠期高血压疾病

D：应用强心苷类药

答案：B

16.治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

A：氯沙坦

B：氨氯地平

C：比索洛尔

D：硝酸异山梨酯

答案：B

17.作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

A：依托泊苷

B：紫杉醇

C：顺铂

D：来曲唑

答案：D

18.使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

A：硫酸镁

B：氯化钙

C：氯化钾

D：果糖

答案：C

19.不属于氟喹诺酮类的药物是

A: 莫西沙星

B: 环丙沙星

C: 依诺沙星

D: 小檗碱

答案：D

20.对贝特类(苯氧芳酸类)的叙述正确的是()

A: 可降低HDL-ch

B: 能明显降低血浆TG、VLDL-ch

C: LDL-chC主要用于原发性高胆固醇血症

D: 可升高T

答案：B

21.人体主要的热能来源是

A: 果糖

B: 维生素

C: 葡萄糖

D: 氨基酸

答案：C

22.雷尼替丁与硫糖铝合用

A: 使后者药效降低

B: 出现呼吸抑制或停止

C: 减慢药物代谢速度

D: 可升高合用药物的血浆药物浓度

答案：A

23.患者女性，30岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌内注射后，10分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

A: 链霉素引起的过敏性休克

B: 链霉素引起的神经毒性

C: 链霉素引起的肾毒性

D: 链霉素引起的神经肌肉阻滞作用

答案：A

24.属于Ⅰa类抗心律失常药的是

A: 奎尼丁

B: 胺碘酮

C: 普罗帕酮

D: 利多卡因

答案：A

25.下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

A: 应给予预防性或治疗性的止吐用药

B: 其神经系统毒性与剂量大小无关

C: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性

D: 与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌

答案：B

26.在体内主要经CYP3A4代谢的质子泵抑制剂是

A: 枸橼酸铋钾

B: 兰索拉唑

C: 米索前列醇

D: 铝碳酸镁

答案：B

27.（2017年真题）眼底散瞳检查宜选用（）

A: 托吡卡胺滴眼剂

B: 碘苷滴眼剂

C: 拉坦前列素滴眼剂

D: 氯霉素滴眼剂

答案：A

28.小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 吲哚美辛

答案：B

29.（2016年真题）患者，女，55岁，临床诊断为2型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 餐后半小时

B: 餐时

C: 餐后1小时

D: 餐前半小时

答案：B

30.（2017年真题）属于芳香酶制剂抗肿瘤药是（）

A: 氟他胺

B: 阿那曲唑

C：他莫昔芬

D：炔雌醇

答案：B

31.长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

A：链霉素

B：乙胺丁醇

C：利福平

D：异烟肼

答案：B

32.利那洛肽为泻药的作用机制是

A：选择性、高亲和力的5-HT4受体激动剂，可通过5-HT4受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

B：在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

C：一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

D：通过激活CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内cGMP可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

答案：D

33.容积性泻药()

A：甘油

B：地芬诺酯

C：乳果糖

D: 硫酸镁

答案：D

34.关于氟喹诺酮类药物的说法不正确的是

A: 抗菌谱广，抗菌力强

B: 口服吸收好，组织药物浓度高

C: 不良反应少

D: 与其他药物有交叉耐药性

答案：D

35.患者,男,67岁,为葡萄糖-6磷酸脱氢酶缺乏症患者,如果使用复方磺胺甲噁唑,可能引发的药源性疾病是

A: 抗生素相关性腹泻

B: 红人综合征

C: 急性溶血性贫血

D: 肌肉震颤

答案：C

36.主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

A: 普萘洛尔

B: 维拉帕米

C: 奎尼丁

D: 利卡多因

答案：C

37.可用于配合防治肝性脑病的泻药为

A: 硫酸镁

B: 酚酞

C: 乳果糖

D: 甘油

答案：C

38.糖皮质激素禁用于胃溃疡患者是因为

A: 水钠潴留

B: 抑制蛋白质合成

C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

D: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

答案：C

39.对抗胰岛素降血糖作用的药物是

A: 磺胺类药

B: 甲状腺素

C: 蛋白同化激素

D: 口服降血糖药

答案：B

40.（2015年真题）使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（）。

A: 氯化钾

B: 果糖

C: 硫酸镁

D: 氯化钙

答案：D

41.可乐定的降压机制是()

A：扩张血管

B：激动中枢突触后膜和外周突触前膜的α

C：影响NA释放

D：激动外周α

答案：B

42.治疗伤寒、副伤寒的首选药是

A：诺氟沙星

B：四环素

C：氯霉素

D：青霉素

答案：C

43.可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A：氟马西尼

B：纳洛酮

C：苯甲酸钠咖啡因

D：阿托品

答案：D

44.（2018年真题）长期大剂量使用,会降低阿司匹林对心血管的保护作用,应避免合用的药物是（）

A：格列齐特

B：贝那普利

C：阿托伐他汀

D：布洛芬

答案：D

45.下列属于新型非苯二氮

A：佐匹克隆

B：地西泮

C：劳拉西泮

D：阿普唑仑

答案：A

46.属于雌激素类的是

A：他莫昔芬

B：己烯雌酚

C：甲地孕酮

D：睾酮

答案：B

47.常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

A：普拉睾酮

B：麦角新碱

C：缩宫素

D：地诺前列酮

答案：C

48.对于万古霉素，描述错误的是

A：作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B：快速静滴会出现红人综合征

C：可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

D：对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

答案：D

49.能阻断 H

A：奥美拉唑

B：谷丙胺

C：法莫替丁

D：枸橼酸铋钾

答案：C

50.阿卡波糖降血糖作用的机制是

A：增强胰岛素的作用

B：提高靶细胞对胰岛素的敏感性

C：竞争性抑制 α-葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解

D：拮抗胰岛高血糖素的作用

答案：C

51.作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是

A：呋喃妥因

B：甲氧苄啶

C：利奈唑胺

D：磺胺甲唑

答案：D

52.不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

A：聚乙二醇 4000

B：甘油

C：硫酸镁

D：乳果糖

答案：D

53.以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A：收缩压<90mmHg的严重低血压

B：梗阻性肥厚型心肌病

C：急性前壁心肌梗死

D：重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

答案：C

54.可用维生素B6防治的异烟肼的不良反应是

A：胃肠道反应

B：肝损伤

C：过敏反应

D：周围神经炎

答案：D

55.长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

A：欧车前

B：利那洛肽

C：番泻叶

D：多库酯钠

答案：C

56.呋塞米发挥利尿作用的部位在

A：髓袢升支厚壁段和远曲小管初段

B：近曲小管

C：肾小球

D：髓袢升支粗段

答案：D

57.属于M受体阻断剂的药物是

A：奥布卡因

B：乙酰唑胺

C：阿托品

D：拉坦前列素

答案：C

58.对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

A：抑制分枝菌酸的生物合成

B：抑制蛋白质合成

C：干扰叶酸合成

D：抑制DNA回旋酶

答案：C

59.主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

A：加巴喷丁

B：苯巴比妥

C：卡马西平

D：苯妥英钠

答案：C

60.下列维生素中，属于水溶性的是()。

A：维生素

B：维生素

C：维生素A

D：维生素

答案：D

61.可促进白细胞增生的药物是

A：红细胞生成素

B：粒细胞集落刺激因子

C：维生素B

D：叶酸

答案：B

62.可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

A：头孢他啶

B：头孢呋辛

C：头孢米诺

D：头孢唑林

答案：A

63.易引起吉海反应的药物是()

A：诺氟沙星

B：四环素

C：青霉素

D：庆大霉素

答案：C

64.以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

A：低钾血症

B：低钠及低磷血症

C：乳酸中毒

D：尿潜血、血色素尿

答案：B

65.（2017年真题）用药时需关注肺毒性的药物是（）

A：博来霉素

B：柔红霉素

C：长春新碱

D：紫杉醇

答案：A

66.对铜绿假单胞菌感染无效的抗生素是

A：头孢克洛

B：头孢他啶

C：头孢曲松

D：头孢噻肟

答案：A

67.对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

A：奎尼丁

B：维拉帕米

C：利卡多因

D：普萘洛尔

答案：C

68.对地高辛中毒出现异位心律者可静脉注射

A：氯化钾、葡萄糖注射液

B：苯妥英钠

C：利尿剂

D：阿托品

答案：B

69.以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

A：喷托维林、苯丙哌林、可待因

B：苯丙哌林、可待因、吗啡

C：喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林

D：可待因、吗啡、右美沙芬

答案：C

70.（2021年真题）可干扰转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药物是（）

A：多柔比星

B：顺铂

C：丝裂霉素

D：塞替派

答案：A

71.维生素K参与下列哪些凝血因子活化()

A：Ⅱ、Ⅷ、XI、Ⅳ因子

B：Ⅶ、XI、Ⅶ、IX因子

C：Ⅱ、Ⅶ因子

D：Ⅱ、Ⅶ、IX、X因子

答案：D

72.（2017年真题）属于抗雄性激素的肿瘤药是（）

A：炔雌醇

B：阿那曲唑

C：氟他胺

D：他莫昔芬

答案：C

73.患者，男，56岁，有高血压病史4年，体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

A: 血氯

B: 血钾

C: 血钙

D: 血钠

答案：B

74.代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

A: 干扰素

B: 阿昔洛韦

C: 阿糖腺苷

D: 奥司他韦

答案：D

75.下列药物可首选用于治疗小细胞肺癌的是()

A: 奥沙利铂

B: 替尼泊苷

C: 依托泊苷

D: 长春新碱

答案：C

76.主要抑制排卵的长效口服避孕药是

A: 庚酸炔诺酮

B: 丙酸睾丸素

C: 炔诺酮

D: 苯丙酸诺龙

答案：A

77.（2021年真题）通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

A: 地高辛

B: 茶碱

C: 丙戊酸钠

D: 华法林

答案：D

78.易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素B合用的抗真菌药物是

A: 氟胞嘧啶

B: 氟康唑

C: 卡泊芬净

D: 特比萘芬

答案：A

79.较常引起外周神经炎的抗癌药是

A: 氟尿嘧啶

B: 巯嘌呤

C: 长春新碱

D: 甲氨蝶呤

答案：C

80.金刚烷胺和美金刚合用

A: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

B: 增加锥体外系不良反应的风险

C: 可增加抗胆碱不良反应的危险

D: 增加肾毒性

答案：A

81.弱效（使LDL-ch水平降低＜30%）的他汀类调血脂药

A: 小剂量氟伐他汀

B: 依折麦布

C: 大剂量阿托伐他汀

D: 小剂量阿托伐他汀

答案：A

82.单纯性下尿路感染可选择的药物是

A: 利奈唑胺+哌替啶

B: 磷霉素氨丁三醇

C: 利奈唑胺+苯丙醇胺

D: 磷霉素钠+万古霉素

答案：B

83.属于短效胰岛素或短效胰島素类似物的是()

A: 普通胰岛素

B: 甘精胰岛素

C: 低精蛋白锌胰島素

D: 地特胰岛素

答案：A

84.四环素类首选用于()

A: 伤寒、副伤寒

B: 布鲁菌病

C: 钩端螺旋体病

D: 鼠疫、土拉菌病

答案：B

85.患者，男，5岁，体重25kg，有癫痫史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数15.8×109/L，体温39.5℃，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次20mg/kg)

A: 乙琥胺

B: 地西泮

C: 丙戊酸钠

D: 左乙拉西坦

答案：C

86.利福平

A: 禁用于18岁以下儿童及青少年

B: 禁用于8岁以下儿童

C: 禁用于胆道阻塞患者

D: 禁用于早产儿、新生儿

答案：C

87.作用于γ-氨基丁酸受体的药物是

A: 佐匹克隆

B: 苯妥英钠

C: 苯巴比妥

D: 卡马西平

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/068112131042007022