

2024 年广东省鹤山市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整版【基础题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”，给予左甲状腺素钠片治疗。对该患者的用药指导，错误的是（）
- A: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功
- B: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊
- C: 左甲状腺素钠极少通过胎盘，治疗剂量下对胎儿无不良影响
- D: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

答案：D

2. 属于雄激素类的是（）

- A: 甲羟孕酮
- B: 睾酮
- C: 己烯雌酚
- D: 他莫昔芬

答案：B

3. 引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 非那雄胺
- B: 多沙唑嗪
- C: 十一酸睾酮
- D: 舍尼通

答案：C

4. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠宜选用

- A: 氟西泮
- B: 氯美扎酮
- C: 夸西泮
- D: 谷维素

答案：B

5. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

- A: 治疗剂量下不会引起血小板减少
- B: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶
- C: 选择性高
- D: 可预测抗凝效果，无需监测 INR

答案：B

6. 属于阴道杀精药的是

- A: 米非司酮
- B: 氯地孕酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 壬苯醇醚

答案：D

7. 长期应用高剂量的雄激素需监测()

- A: 肾功能
- B: 血压
- C: 血糖
- D: 血钙

答案：D

8. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)

- A: 左乙拉西坦
- B: 地西泮
- C: 丙戊酸钠
- D: 乙琥胺

答案：C

9. 铂类化合物

- A: 丝裂霉素
- B: 喜树碱类
- C: 顺铂
- D: 环磷酰胺

答案：C

10. 格列本脲的作用特点是

- A: 增强胰岛素的作用
- B: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生
- C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- D: 抑制胰高血糖素的分泌

答案：B

11. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A: 去甲肾上腺素

- B: 异丙肾上腺素
- C: 去氧肾上腺素
- D: 多巴胺

答案：C

12. 适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

- A: 卡维地洛
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氯沙坦
- D: 米力农

答案：B

13. 与呋喃妥因特性不符的叙述是()

- A: 碱性尿液中杀菌作用增强
- B: 主要用于泌尿系感染
- C: 在小肠吸收迅速
- D: 有广谱抗菌活性

答案：A

14. 属于短效胰岛素制剂的是

- A: 地特胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案：C

15. 属于第三代氨基二膦酸盐类骨代谢调节药，与骨内的羟基磷灰石有强亲和力的药物是()

- A: 帕米膦酸二钠
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 氯屈膦酸二钠
- D: 依替膦酸二钠

答案：B

16. 用于肝病的氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液（6AA）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 复方氨基酸注射液（18AA）
- D: 赖氨酸注射液

答案：A

17. 属于第一代头孢菌素口服制剂的是（）。

- A: 头孢克肟
- B: 头孢克洛
- C: 头孢拉定
- D: 头孢吡肟

答案：C

18. 对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是

- A: 氯硝柳胺
- B: 葡萄糖酸锑钠
- C: 伯氨喹
- D: 三苯双脒

答案：D

19. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 胺碘酮
- B: 美托洛尔
- C: 地尔硫
- D: 维拉帕米

答案：A

20. 疥疮及阴虱病可选用()

- A: 林旦霜
- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 酮康唑

答案：A

21. 可致男性胎儿外生殖器发育畸形，妊娠期或备孕期妇女不宜接触其破碎制剂的药物是()

- A: 特拉唑嗪
- B: 赛洛多辛
- C: 非那雄胺
- D: 多沙唑嗪

答案：C

22. 属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

- A: 利那洛肽
- B: 番泻叶
- C: 多库酯钠
- D: 欧车前

答案：A

23. (2019 年真题) 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物 ()

- A: 氟喹诺酮类
- B: 大环内酯类
- C: 四环素类
- D: 氨基糖苷类

答案：A

24. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 奈替米星
- C: 红霉素
- D: 庆大霉素

答案：D

25. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

- A: 曲妥珠单抗
- B: 西妥昔单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 贝伐珠单抗

答案：C

26. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 口服
- B: 皮下
- C: 舌下含服
- D: 静脉

答案：D

27. 氨苄西林

- A: 对支原体有效
- B: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效
- C: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
- D: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效

答案：D

28. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 丙卡特罗
- B: 沙美特罗
- C: 沙丁胺醇
- D: 福莫特罗

答案：D

29. ACEI 与()联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

- A: 人促红素
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: 留钾利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：B

30. 以上属于阿片类药物严重戒断症状的是

- A: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐
- B: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- C: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- D: 惊厥、震颤、反射加速、发热

答案：B

31. 吗啉类抗真菌药()

- A: 阿莫罗芬
- B: 特比萘芬
- C: 两性霉素
- D: 氟康唑

答案：A

32. 重组人促红素的最佳适应证是

- A: 慢性肾衰竭所致贫血
- B: 化疗药物所致贫血
- C: 严重缺铁性贫血
- D: 严重再生障碍性贫血

答案：A

33. 属于第三代喹诺酮类药物的是

- A: 吡哌酸
- B: 萘啶酸
- C: 莫西沙星
- D: 诺氟沙星

答案：D

34. 主要经胆汁排泄的是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢哌酮
- C: 阿莫西林
- D: 庆大霉素

答案：B

35. 抗酸作用较强、较快，有导泻作用

- A: 碳酸钙
- B: 氢氧化镁
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：B

36. 急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 地高辛

答案：C

37. 可引起复视或视觉蓝绿模糊的是()

- A: 度他雄胺
- B: 坦洛新
- C: 他达拉非
- D: 西地那非

答案：D

38. 阻断 M

- A: 哌仑西平
- B: 雷尼替丁
- C: 氢氧化铝
- D: 奥美拉唑

答案：A

39. ACTH 的血浆浓度波动大，变化也很快，这是因为它是以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期是

- A: 8 小时
- B: 10~25 分钟
- C: 4 小时
- D: 7~12 分钟

答案：D

40. β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

- A: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦
- B: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- C: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- D: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

答案：A

41. 下列具有抗血小板作用的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 维生素 K

答案：A

42. 接受多西他赛治疗的患者为减少多西他赛导致的水钠潴留和超敏反应所采取的下列预处理方案中确的是（）

- A: 使用多西他赛前先口服叶酸片,5mg,BiD 持续 3 天
- B: 输注多西他赛前先肌注苯海拉明,25mgq8h,持续 3 天
- C: 输注多西他赛前 30 分钟肌注维生素 B120|mg
- D: 在使用多西他赛前先口服地塞米松 8mg,BiD,持续 3 天

答案：D

43. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是（）

- A: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- B: 克罗米通具有局部麻醉作用
- C: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用
- D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案：A

44. 复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

- A: 雌二醇
- B: 维生素 B6
- C: 去氧孕烯
- D: 炔雌醇

答案：D

45. 催眠药应（）

- A: 饭前内服
- B: 空腹内服
- C: 定时内服

D: 睡前内服

答案: D

46. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是()

A: 巯嘌呤

B: 长春瑞滨

C: 吉西他滨

D: 甲氨蝶呤

答案: C

47. 调血脂药中，升高 HDL-ch 作用最强，且具有降低脂蛋白 a 作用的是

A: 依折麦布

B: 阿昔莫司

C: 苯扎贝特

D: 烟酸

答案: D

48. 可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是

A: 苄星青霉素

B: 阿莫西林

C: 青霉素

D: 头孢唑林

答案: B

49. 属于脂肪酸类抗癫痫药的代表药物是

A: 加巴喷丁

B: 丙戊酸钠

C: 苯巴比妥

D: 氯硝西泮

答案: B

50. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

A: 竞争性抑制 α -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解

B: 增强胰岛素的作用

C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

D: 拮抗胰岛高血糖素的作用

答案: A

51. 下列保肝药中属于必需磷脂类的是

A: 联苯双酯

B: 甘草酸二铵

C: 复方甘草酸苷

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: D

52. 患者，男性，55 岁。每年冬春季常有哮喘发作，近日来上呼吸道感染，咳嗽加哮喘，门诊测血压亦升高，治疗方案：给予抗感染及平喘治疗外，尚考虑给予降压药，其中欲选择一种 β 肾上腺素受体阻断药，应选用

A: 纳多洛尔

B: 普萘洛尔

C: 美托洛尔

D: 吲哚洛尔

答案: C

53. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 利血平

答案: D

54. 需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 艾塞那肽
- C: 那格列奈
- D: 二甲双胍

答案: B

55. 在体内不易蓄积,适用于老年和肾功能不全患者的胰岛素促泌剂类降糖药是()

- A: 艾塞那肽
- B: 利拉鲁肽
- C: 罗格列酮
- D: 瑞格列奈

答案: D

56. 睾酮替代治疗的给药方式不包括

- A: 透皮给药
- B: 肠道外给药
- C: 注射给药
- D: 直肠给药

答案: D

57. 合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 异甘草酸镁
- C: 双环醇
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：C

58. 不属于中枢性镇咳药典型不良反应的是

- A: 心率增快
- B: 情绪激动
- C: 腹泻
- D: 成瘾性

答案：C

59. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 普萘洛尔
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: 碳酸锂

答案：C

60. 促进钙剂吸收可选用

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 阿法骨化醇
- D: 依降钙素

答案：C

61. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

- A: 急性前壁心肌梗死
- B: 收缩压<90mmHg 的严重低血压
- C: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄
- D: 梗阻性肥厚型心肌病

答案：A

62. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 胶体果胶铋
- C: 多潘立酮
- D: 山莨菪碱

答案：B

63. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

- A: 哌替啶
- B: 可待因
- C: 布桂嗪
- D: 阿司匹林

答案：A

64. 患者，男，67 岁，既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗，在脑脊液标本的病原学结果回报之前，可经验性选用的抗菌药物是（）

- A: 卡泊芬净
- B: 头孢曲松
- C: 米诺环素

D: 亚胺培南西司他丁

答案: B

65. 下列属于窄谱抗菌药物的是

A: 阿莫西林

B: 氨曲南

C: 环丙沙星

D: 头孢唑啉

答案: B

66. 恶心性祛痰药尤其适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰患者的药物是

A: 氨溴索

B: 溴己新

C: 氯化铵

D: 乙酰半胱氨酸

答案: C

67. (2018 年真题) 肾结石患者禁用的药物是 ()

A: 别嘌醇

B: 苯溴马隆

C: 秋水仙碱

D: 非布索坦

答案: B

68. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

A: 阿莫西林

B: 埃索美拉唑

C: 克拉霉素

D: 胶体果胶铋胶囊

答案: D

69. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

A: 奎宁

B: 哌嗪

C: 伯氨喹

D: 替硝唑

答案: C

70. 室性心律失常可用

A: 地尔硫卓

B: 美西律

C: 普萘洛尔

D: 地高辛

答案: B

71. 骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

A: 服药后第 6 个月

B: 服药后第 4 周

C: 服药后第 3 个月

D: 服药后第 2 周

答案: B

72. 氯霉素的抗菌作用机制是()

A: 干扰细菌的细胞壁合成

- B: 干扰细菌的 RNA 转录
- C: 抑制细菌的 DNA 合成
- D: 抑制细菌的蛋白质合成

答案：D

73. 常用治疗胃肠道癌，是结直肠癌的首选药之一的药物是()

- A: 丝裂霉素
- B: 塞替派
- C: 环磷酰胺
- D: 奥沙利铂

答案：D

74. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 美托洛尔
- B: 伊伐布雷定
- C: 卡托普利
- D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：D

75. 易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 氟胞嘧啶
- C: 氟康唑
- D: 卡泊芬净

答案：B

76. 利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 螺内酯

答案：C

77. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

- A: 立克次体
- B: 支原体
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 衣原体

答案：C

78. 维生素 A 缺乏时引起

- A: 脚气病
- B: 角膜软化症
- C: 坏血病
- D: 成人佝偻病

答案：B

79. 可导致“类流感样”反应的药物是

- A: 依替膦酸二钠
- B: 氯屈膦酸二钠
- C: 帕米膦酸二钠
- D: 唑来膦酸钠

答案：D

80. 骨折患者、低磷血症患者不宜服用

- A: 氢氧化镁
- B: 碳酸钙
- C: 氢氧化铝
- D: 三硅酸镁

答案：C

81. 与诺氟沙星合用可提高对致病性细菌感染的疗效的是

- A: 酚酞
- B: 双八面体蒙脱石
- C: 莫沙必利
- D: 地芬诺酯

答案：B

82. 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是()

- A: 茶碱
- B: 噻托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 孟鲁司特

答案：B

83. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 核糖霉素
- B: 妥布霉素
- C: 链霉素
- D: 卡那霉素

答案：D

84. (2017 年真题) 属于 DPP-4 抑制剂的药物是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 阿格列汀
- C: 那格列奈
- D: 伏格列波糖

答案: B

85. 适用于治疗精神分裂症、躁狂症的药物是

- A: 利培酮
- B: 氯氮平
- C: 碳酸锂
- D: 阿立哌唑

答案: B

86. 左氧氟沙星用于治疗 ()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 鼠疫、土拉菌病
- C: 布鲁菌病
- D: 伤寒、副伤寒

答案: D

87. (2019 年真题) 因易导致新生儿溶血，妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是 ()

- A: 庆大霉素
- B: 甲硝唑
- C: 呋喃妥因
- D: 苄星青霉素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/075241221122012033>