精神科护理考试试题含参考答案

1、某患者,男,43 岁,商人,自称是超级司令,有九十个军,一千架飞机,中国是他解放的,有巨大财富等,此症状可能是( )

A、错觉

B、虚构

C、错构

D、夸大妄想

E、思维奔逸

答案：D

2、关于癔症的叙述正确的是( )A 癔症又称歇斯底里

A、一般有相应的器质性病变基础

B、一般认为癔症的预后较差

答案：A

3、对抗精神病药物所致心血管系统不良反应及处理说法错误的是( )

A、直立性低血压多发生在治疗初期

B、直立性低血压的病人常表现为突然改变体位时头晕目眩,血压下降,甚至出现休克

C、对直立性低血压的病人应给与肾上腺素处理

D、心电图改变的病人必要时可给与普萘洛尔处理

E、对于有心电图改变的病人尽可能定期查心电图,避免抗精神病药物与抗帕金森和抗抑郁

答案：C

4、患者,女性,30 岁。述自己经常听到一个声音在议论她,此症状为幻觉,真性幻觉和假性幻觉的区别是( )

A、二者均缺乏客观刺激

B、二者来源和感知方式不同

C、二者感知的幻觉形象生动

D、二者均是对客观事物的错误感受

E、二者均是对客观事物的胡思乱想

答案：B

5、躁狂发作睡眠障碍的特点是( )

A、入睡困难

B、多梦

C、早醒

D、睡眠需要量减少

E、易惊醒

答案：D

6、下列何种疾病预后最好( )

A、精神分裂症偏执型

B、精神分裂症青春型

C、精神分裂症单纯型

D、精神分裂症紧张型

E、精神分裂症未分化型

答案：D

7、对精神障碍患者进行安全护理错误的说法是( )

A、熟悉病情、建立良好护患关系

B、严格执行医嘱、护理常规及工作制度

C、加强安全管理

D、加强巡视,严防以外

E、为了避免患者的暴力行为,尽量将患者约束在床上

答案：E

8、对焦虑症患者的心理护理,不恰当的是( )

A、建立良好的治疗性护患关系

B、指导患者进行放松训练

C、励惑者倾诉内心感受

D、关注患者过多躯体不适的主诉

E、帮助患者认识症状

答案：D

9、患者,男性,42 岁。突感心慌、气短,伴有濒死感,被“120”送入急诊。心电图及其他检查均正常。该患者的症状为( )

A、焦虑

B、抑郁

C、惊恐发作

D、恐惧

E、癔症

答案：C

10、20 世纪 50 年代后,随着精神药物的出现,人们开始研究药物、神经介质和脑中相关受体之间的关系,被称为( )。

A、精神医学的第一次革命

B、精神医学的第二次革命

C、精神医学的第三次革命

D、精神医学的第四次革命

E、精神医学的第五次革命

答案：D

11、抑郁症睡眠障碍的特点是( )

A、入睡国难

B、易惊配

C、多梦

D、平醒

E、睡眼过多

答案：D

12、一个病人意识清晰,智能相对良好,但有进事记忆障碍和言谈虚构倾向,最可能的综合征是( )

A、谵妄综合征

B、慢性脑病综合征

C、急性脑病综合征

D、遗忘综合征

E、精神发育迟滞

答案：D

13、女,32 岁,已婚,近 3 个月来无明显诱因出现兴趣缺乏,言语减少,动作迟缓,自觉脑子笨,觉得前途暗淡,悲观失望,早醒,食欲减退,便秘,性欲减退,自责自罪,症状晨重暮轻。多次自杀未遂。社区精神卫生服务中心采取的措施不应包括( )

A、与患者进行有效沟通,积极阻断其负向的思考

B、指导患者家属积极主动地关心患者,给患者融洽的家庭环境

C、报告公安机关,干预患者的自杀企图

D、劝患者去有精神科的医院就诊

E、指导家属送患者去有精神科的医院就诊

答案：C

14、医生用棉签轻触病人的面部,病人感到火辣辣的灼烧感,他的症状可能是( )

A、感觉过敏

B、感觉减退

C、感觉倒错

D、内感性不适

E、以上都不对

答案：C

15、可能造成睡眠障碍的因素不包括( )

A、急性应激反应

B、饮用浓咖啡

C、过度担心失眼

D、睡前进食过多

E、安静环境

答案：E

16、患者,女,73 岁,2 年前丈夫病故后,经常独自流泪,近 1 年来常出现当天发生的事,刚说的话和做的事就能忘记,忘记进食或物品放何处,外出找不到家门,失眠,焦躁不安。根据临床表现,护士评估患者最可能发生了( )

A、老年精神病

B、抑郁症

C、大脑慢性缺血改变

D、早期阿尔海默症

E、脑肿瘤

答案：D

17、男性,41 岁,首次发作精神分裂症,经药物治疗后症状缓解,自知力部分恢复,家属询问继续服药时间是( )

A、医生指导下长期治疗

B、医生指导下不少于 1 年

C、医生指导下不少于 3 年

D、医生指导下不少于 5 年

E、医生指导下不少于 2 年

答案：B

18、患者为了得到“硬骨头精神”,将整块排骨吞食此为( )

A、真性幻想

B、语词新作

C、夸大妄想

D、强迫性思维

E、病理性象征性思维

答案：E

19、精神分裂症的临床症状一般没有( )

A、意识障碍

B、情感障碍

C、感知障碍

D、思维障碍

E、行为障碍

答案：A

20、患者女,18 岁,以焦虑症入院,护理措施中最重要的是( )

A、深入了解引发惠者焦虑的来源

B、鼓励患者描述焦虑的感受

C、保护患者安全,降低焦虑程度

D、指导患者认识个人的焦虑行为

E、护护士应与患者保持一定距商

答案：A

21、医生问:“你在哪里工作?”患者答:“这是多余的问题,卫星照在太阳上,阳光反射到玻璃上,跟着我不能解决任何问题,马马虎虎,捣捣糨糊。”医生问:“你近来好吗?”,患者答:“我不是坏人,家中没有房产,计算机病毒是谁捣的鬼,我想回家。”此患者的症状可能是( )

A、思维奔逸

B、病理性赘述

C、刻板语言

D、思维破裂

E、逻辑倒错性思维

答案：D

22、主要影响精神健康心理社会因素大致包括( )

A、人格特征

B、心理应激因素

C、环境因素

D、文化因素

E、以上均正确

答案：E

23、听幻觉最常见于( )

A、神经症

B、抑郁症

C、癔症

D、精神分裂症

E、强迫症

答案：D

24、谵妄最多见的幻觉是( )

A、听幻觉

B、味幻觉

C、视幻觉

D、本体幻觉

E、触幻觉

答案：C

25、男性,65 岁。近半年来情绪低落,活动迟缓,不再参与以前感兴趣的活动,终日独处,不愿与他人交往,最近发展到终日独坐,不吃饭,不顾个人卫生,也不说话。这种状态称为( )

A、定向障碍

B、抑郁型痴呆

C、老年痴呆

D、意志活动减退

E、抑性木僵

答案：E

26、关于精神疾病病人的知情同意说法正确的是( )。

A、由于精神病人往往没有自知力,因此必须强制住院治疗

B、由于精神病人往往没有自知力,因此不需要向精神病人提供疾病的诊断和治疗的信息

C、由于精神疾病病人通常存在做决定能力受损的状况,因此他们需要有合法的代理人来履

D、知情同意的合法代理人的等级顺序为父母、配偶、姐妹兄弟

E、若病人或家属理解专业性医疗、护理知识方面有障碍,医护人员可以自行决定治疗的方

答案：C

27、女性,30 岁。表现为口若悬河,滔滔不绝,一个话题未完又转入另一个话题,此患者的精神症状属于( )

A、感觉过敏

B、思推奔逸

C、妄想

D、思维散漫

E、语词新作

答案：B

28、女性,46 岁。表现为非常欢快,讲话时兴高采烈,自觉无比舒畅和幸福,对他人有很大的感染力。此患者的精神症状属于( )

A、情感高涨

B、欣快

C、情感暴发

D、感觉过敏

E、思维散漫

答案：A

29、下列症状中不属于精神分裂症阴性症状的是( )

A、思维贫乏

B、假性幻觉

C、动力缺乏

D、情感平淡

E、孤僻离群

答案：B

30、患者男性,31 岁,首次发作精神分裂症,经药物治疗 2 年期间先后复发三次,家属询问服药的时间,护士的回答下列哪个比较合适( )

A、在医生指导下终身服药

B、在医生指导下不少于

C、在医生指导下不少于

D、在医生指导下不少于

E、在医生指导下不少于

答案：A

31、患者女性,35 岁,3 天来不吃饭,只喝水,说有人一直在告诉她饭里有毒,要求家人陪同去派出所报案。患者入院后护士最基础的评估是( )

A、有无冲动行为

B、有无躯体感染

C、有无躯体受伤

D、精神症状严重程度

E、基本生理需要量是否满足

答案：E

32、对精神障碍患者进行饮食护理时,错误的说法是( )

A、有被害妄想者,疑心饭菜有毒,可让其任意挑选饭菜,或者让他人先尝

B、对有罪恶妄想的患者,自认为不配吃好拒绝进食者,可给其进食剩菜剩饭

C、对于木僵患者,可将饭菜置于床边,有时患者会自行进食

D、对于暴饮暴食患者安排单独进食,并适当限制进食量

E、对于药物反应严重,吞咽困难者,给予软食或者半流质饮食

答案：B

33、男性,32 岁。郁反复发作。有严重自金图。对此患者较好的处理方法是( )

A、抗抑都药物治

B、抗精神病药物治疗

C、行为认知疗法

D、电体克治疗

E、心理护理

答案：D

34、睡眠障碍不包括哪种失眠( )

A、适应性失眠

B、矛盾性失眠

C、白天过度睡眠

D、心理生理性失眠

E、其他疾病引起的失眠

答案：D

35、某运动员,近来越来越易激惹,情绪不稳,曾两次殴打对手被罚。且他常闻到一股臭鸡蛋味,感觉“在梦里一样”,而且常破口大骂。此现象称为( )

A、错觉

B、想象

C、错构

D、虚构

E、嗅幻觉

答案：E

36、该患者的症状是( )

A、违拗症

B、缄默状态

C、木僵状态

D、意志减退

E、兴趣减退

答案：C

37、女性,18 岁。以焦虑症入院,护理措施中最重要的是( )

A、深入了解引发患者焦虑的来源

B、鼓励患者描述焦虑的感受

C、保护患者安全,降低焦虑程度

D、指导患者认识个人的焦虑行为

E、护士应与患者保持一定距离

答案：A

38、男性,65 岁。患有焦虑症。护士护理患者时错误的做法是( )

A、提供安全与舒适的环境

B、减少对患者的感官刺激

C、用医学术语解释治疗措措施

D、指导患者使用松弛术

E、倾听患者的诉说

答案：C

39、某社区卫生服务中心积极开展精神障碍的二级预防工作,他们采取的措施是( )

A、健康教育及心理咨询

B、对有或者怀孕有精神障碍的人群指导其就诊

C、防止病情恶化、防止病残

D、以上都是

E、以上都不是

答案：B

40、关于失眠症患者的护理,错误的是( )

A、评估失眠症患者的失眠表现

B、消除失眠症患者的失眠诱因

C、白天让患者多睡以弥补夜间睡眠不足

D、可以使用一些镇静药物

E、采用心理治疗可以消除或减轻某些因素

答案：C

41、阿尔茨海默病的病理特征是( )

A、大脑皮质弥漫性缩

B、老年斑和神经原纤维缠结

C、脑沟回增宽

D、陆室扩大、神经元大量减少

E、神经元气球样肿胀

答案：B

42、思维贫乏( )

A、是急性精神分裂症的常见症状

B、是焦虑症的常见症状

C、是抑郁症的常见症状

D、是恐惧症的常见症状

E、是慢性精神分裂症的常见症状

答案：E

43、某女与同事吵架之后,突然倒地,全身挺直,双手乱动,几分钟后,号啕大哭,捶胸顿足,10 分钟后安静下来。其症状包括( )

A、假性痴呆

B、情感暴发

C、精神病态

D、情感倒错

E、情感不协调

答案：B

44、男性,42 岁,律师,已婚。因 4 个月来情结低落。性欲减退,不 1 上班,严重丧失工作热情而就诊。诊断为抑郁症,医生生给予抗抑郁药物治疗。护士需告知患者药物的起效时间为( )

A、2~3 周

B、6-8 周

C、1-2 周

D、4-6 周

E、8-10 周

答案：A

45、关于抗焦虑药物的说法正确的是( )

A、与抗精神病药物类似,能引起严重的自主神经症状和锥体外系等反应

B、苯二氮卓类除了抗焦虑作用外,常作为镇静催眠药物使用

C、苯二氮卓类不宜长期使用,以免导致依赖性和戒断症状

D、非苯二氮卓类对重度焦虑效果差,不适用于惊恐发作

E、小剂量的抗精神病药物舒必利对焦虑症有效

答案：A

46、关于工娱治疗的说法错误的是( )

A、丰富患者的文化生活

B、防止精神衰退

C、提高人际交往能力和环境适应能力

D、治疗和控制精神病性症状

E、为患者回归社会做好准备

答案：D

47、失眠的认知疗法不包括下列哪项( )

A、对睡眠保持符合实际的期望

B、不把白天发生的不愉快都归咎于失眠

C、不给睡眠施加压力

D、一夜睡不好后不要悲观

E、尽量试图入睡

答案：E

48、某患者对周围一切事物缺乏兴趣,不愿活动,学习感到非常吃力,整日呆坐或卧床不起,头发也懒得梳洗,该患者可能的症状有( )

A、意志增强

B、意志减退

C、意志缺乏

D、矛盾意向

E、以上都不对

答案：B

49、下面关于恶性综合征的描述错误的是( )

A、发生率低,但死亡率高

B、几乎所有的抗精神病药物均可引起恶性综合征,尤其是高效价低剂量的抗精神病药物,

C、往往出现在更换抗精神病药物的种类或加量过程中以及合并用药时

D、男病患者发生率要高于女病患者

E、临床特点有严重的锥体外系症状、自主神经功能紊乱、急性肾衰和意识障碍等

答案：D

50、男性患者,22 岁,大学二年级学生,近一年来听课注意力不集中,常发呆,有时自语自笑,动作迟缓,吃一段饭要一个多小时。5 天前终日卧床,不吃饭,不知如厕。精神检查:意识清晰,卧床不动不语,针刺其身体无反应。肌张力增高。令患者张嘴,反把嘴闭得更紧,把患者肢体摆成不舒服的姿势,可以保持很久不变,躯体及神经系统检查未见其他异常体征。患者不存在的护理诊断是( )

A、营养失调,低于机体的需要量

B、思维过程改变

C、部分智力能力缺陷

D、不合作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/076003134223010041