

妇产科泌尿生殖系统试题

1. 患者女性，60岁。自诉腰骶部酸痛，劳累后尤其明显。嘱患者平卧用力向下屏气时，发现宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$ ，未达处女膜缘。该患者属于 ☐

A. 子宫脱垂Ⅰ度轻型

B. 子宫脱垂Ⅰ度重型

C. 子宫脱垂Ⅱ度轻型

D. 子宫脱垂Ⅱ度重型

E. 子宫脱垂Ⅲ度

2. 下列属于女性青春期开始的重要标志是 ☐

A. 卵泡开始发育

B. 出现周期性排卵

C. 月经初潮

D. 第一性征开始发育

E. 第二性征开始发育

3. 患者，女性，35岁，主诉白带呈乳白色，量增多。初步诊断为慢性宫颈炎，治疗前需排除的情况是 ☐

A. 尿路感染

B. 子宫内膜癌

C. 真菌性阴道炎

D. 早期宫颈癌

E. 淋病

4. 以下不是阴道正常菌群的是 ☐

- A.支原体
- B.衣原体
- C.乳杆菌
- D.肠球菌
- E.葡萄球菌

5 .拟作宫颈刮片或阴道分泌物涂片细胞学检查时，可用的润滑剂是 ○

- A.石蜡油
- B.酒精
- C. 生理盐水
- D.肥皂水
- E.其它

6 .女 40 岁，因急性盆腔炎住院治疗，护士指导患者采取的卧位是 ○

- A.半卧位
- B.平卧位
- C.头低位
- D.侧卧位
- E.俯卧位

7 .保持子宫在骨盆正中位置的主要韧带是 ○

A 阔韧带(确作案)

- 8 .圆韧带
- C.主韧带
- D.宫骶韧带
- E.骶结节韧带

8 . 阴道脱落细胞的固定液为 O。

A.75%酒精

B.0.5%碘伏

C.20%乳酸

D.10%醋酸

E.95%酒精

9 . 女 33 岁，慢性宫颈糜烂，护士做健康宣教，正确的治疗指导是 O

A.子宫颈锥形切除是常用方法

B.治疗原则是使糜烂面鳞状上皮脱落由新生柱状上皮替代

C.物理疗法是目前疗效好、疗程短的方法

D.糜烂面大，可用硝酸银局部腐蚀

E.月经干净即可行物理治疗

10.患者女性，38 岁。宫颈中度糜烂，颗粒型，无盆腔及阴道炎症，宫颈刮片未见癌细胞。应选用最恰当的治疗是 O

A.硝酸银腐蚀法

B.中药内服

C.激光治疗

D.全子宫切除

E.抗生素治疗（正确；

11 . 患者女性，58 岁，医生诊断为外阴炎，护士指导患者正确的是 O

A.搔抓

B.热水烫

C.穿紧身内衣

D.输液治疗

E.坐浴,

12 .关于阴道穹隆, 与临床诊疗关系密切的是 O

A.左侧穹隆

B.右侧穹隆

C.两侧穹隆

D.前穹隆

E.后穹隆

13. 患者女性, 48 岁, 体检时发现子宫肌瘤, 非常焦虑, 询问发生子宫肌瘤的原因, 护士回答, 可能的相关因素是 O

A 早婚、早育

B.高血压、肥胖

C.雌激素持续性刺激

D.不良饮食习惯

E.性生活紊乱

14 . 患者女性, 38 岁, 体检时发见子宫脱出, 膀胱及直肠膨出。诊断为子宫脱垂, 患者非常紧张询问护士, 护士告知与发生子宫脱垂无关的是()

A.多产

B.产伤

C.产后过早参加体力劳动

D.习惯性便秘

E.手取胎盘

15 . 患者女性, 36 岁, 因急性下腹痛伴高热就诊, 妇科检查: 宫颈充血有举痛。医生诊断为: 急性盆腔炎, 并考虑有盆腔脓肿存在, 护士应配合进一步检查确诊的项目是()

A.后穹窿穿刺抽出脓液

B.宫颈分泌物培养

- C.尿培养
- D.血培养
- E.血常规

16. 患者女性，36 岁，被诊断为慢性宫颈炎，患者思想压力较大，认为自己得了性病，护士向她正确的解释慢性宫颈炎最常见的病变就是 OO

- A.宫颈糜烂 {;
- B.宫颈肥大
- C. 宫颈息肉
- D.宫颈腺囊肿
- E.宫颈管炎

17. 在施行附件切除或结扎子宫动脉时，最易损伤的邻近器官是 O

- A.尿道
- B.膀胱
- C 输尿管 「
- D.直肠
- E.阑尾

18. 患者女性，37 岁，已产，医生诊断为宫颈重度糜烂；宫颈 TCT 检查正常，需局部物理治疗。患者询问物理治疗的时间，护士告知最佳时间是 O

- A.月经来潮前 3~7 天
- B.排卵期
- C.无时间限制
- D.确诊后
- A.小剂量雌激素周期治疗
- B.人工周期治疗
- C.促排卵药物治疗

D.继续观察暂不处理

E.中药治疗

23. 患者女性，58 岁，患老年性阴道炎，护士与之沟通时，肯定了该患者对此认识正确的是 O

A.阴道分泌物稀少

B.可用碱性溶液冲洗阴道

C.雌激素可改善症状

D.阴道分泌物稠厚

E.阴道 PH 值正常

24. 患者女性，38 岁，因外阴瘙痒，灼痛，白带呈豆渣样就诊医生诊断为外阴阴道念珠菌病。关于该病的发生，患者认知错误的是 O

A.白色念珠菌是寄生在阴道、口腔、肠道的条件致病菌

B.常见于妊娠、糖尿病患者及接受大量雌激素等

C.性交是该病的主要传播途径，

D.实验室检查培养法阳性率最高，多用于难治性或复发性 VVC

E.VVC 的典型症状是外阴瘙痒、灼痛，白带呈豆渣样

25. 关于急性盆腔炎，下列处理正确的是 O

A.立即手术治疗

B.侧卧位休息

C.补液及纠正电解质失衡

D.口服消炎药

E.低热量、低蛋白、高维生素流质饮食 26. 患者女性，30 岁，3 天前外出洗浴，白带增多及外阴瘙痒，医生诊断滴虫性阴道炎。护士告知患者滴虫性阴道炎白带的典型特征是 O

A.稀薄泡沫

B.淡黄脓性

- C.豆渣样
- D.均匀一致稀薄
- E.黄鱼水样

27 .患者女性，39岁，继发痛经进行性加重，非月经期下腹痛，妇科检查：可触及较大异位囊肿及子宫粘连的肿块。医生诊断为：子宫内膜异位症。该患者最佳的诊断方法是 O

- A.超声波检查
- B.C125 值测定
- C.腹腔镜检查
- D.宫腔镜检查
- E.阴道镜检查

28 .某孕妇，患有外阴阴道念珠菌病，孕妇担心胎儿被感染，向护士咨询其正确用药途径是 O

- A.阴道予制霉菌素片
- B.口服制霉菌素片
- C.口服抗生素
- D.全身用药
- E.酸性溶液坐浴

29 .患者女性，60岁，患老年性阴道炎，该患者询问护士发病原因，护士告知直接影响阴道自净作用的激素下降，这个激素是 O

- A.孕激素
- B.雌激素
- C.促性腺素
- D.促卵泡素
- E.促性腺激素释放激素

30 .患者女性，36 岁。工作紧张，近 2 年来未避孕，欲生育，但一直未孕。月经不规则，经期延长。医生建议患者行诊断性刮宫以了解黄体功能，护士告知刮宫时间应在月经来潮 O

A.后 72 小时

B.后 48 小时

C 前 2 周

D.后 24 小时

E 后 6 小时

31.35 岁已婚妇女，近年来，月经周期 30~32 天，月经持续 10~15 天，经量时多时少。基础体温呈双相，为明确诊断需行刮宫术，时间应在 O

A.月经来潮前 1 周

B.月经来潮 12 小时内

C.月经第 3 天

D.月经第 5 天

E.月经来潮 24 小时内

32. 患者女性，40 岁。外阴右侧疼痛伴发热 2 天，体检：体温：39.2C,右侧大阴唇后部触及 4cmx5cmx4cm 大小囊性肿物，有触痛，表面皮肤红肿，诊断为右侧前庭大腺脓肿。下列治疗方案中正确的是 O

A.全身抗生素治疗

B.脓肿剥除术+抗生素应用

C.脓肿切开引流造口术+抗生素应用 J”)

D.脓肿切开引流术+抗生素应用

E.局部应用抗生素

33 .真假骨盆的分界线是 O

A.耻骨联合上缘，髂耻缘及舐岬中部的连线

B.耻骨联合上缘，髂耻缘及撕岬上缘的连线 11u 片-小

C.耻骨联合下缘，髂耻缘及舐岬上缘的连线

D.耻骨联合下缘，髂耻缘及撕岬上缘的连线

E.耻骨联合上缘，髂耻缘及舐岬中部的连线

34 . 某妇女，28 岁，妊娠 16 周初产前检查时被诊断患有梅毒。护士回答该病人关于梅毒的问题，错误的是（）

A.最主要传播途径是性接触

B.可能通过胎盘传给胎儿

C.首选青霉素治疗

D.妊娠早期治疗有可能避免胎儿感染

E.青霉素过敏者首选头孢菌素，施 案)

35.某女，38 岁，患盆腔炎性疾病，其对该疾病后遗症的认识不正确的是 O

A.可引起不孕、异位妊娠

B.常出现下腹部坠胀感

C.可导致盆腔炎性疾病反复发作

D.慢性盆腔痛的有效疗法是手术治疗 I

E.盆腔组织破坏、广泛粘连、增生及瘢痕形成

36 . 某淋病初产妇，29 岁，足月顺产一活女婴，护士应为该女婴提供的护理措施是 O

A.严密的床边隔离

B.不需要进行任何干预

C.尽快使用 0.5%红霉素眼膏（子「:W）

D.消毒液浸泡消毒新生儿

E.阴道分泌物进行淋菌培养

37 .某女，29 岁，已婚。常规体检发现宫颈糜烂样改变，接触性出血阴性，宫颈细胞学检查未发现异常，病人最佳的处理方案是 O

- A.定期随访
- B.激光治疗
- C 微波治疗
- D.抗生素治疗
- E.干扰素治疗

38. 女，15 岁，骑自行车时不慎发生骑跨伤，最易发生血肿的部位是 O

- A.阴道
- B.外阴
- C.肛门
- D.直肠

E.臀部 39.某女，24 岁，健康，月经周期规律，每 34 日一次，其排卵时间约在月经周期（）

- A.第 7 日
- B.第 14 日
- C 第 17 日
- D 第 20 日
- E.第 24 日

40.某女，26 岁，月经周期为 28 日，现在是月经干净后第 8 日。宫颈黏液涂片显示典型的羊齿植物叶状结晶，表面其处于 O

- A.月经期
- B.月经前期
- C.排卵后期
- D.妊娠期
- E.接近排卵期

41.某女，32岁，4年前经阴道分娩一子，则其宫颈口形状最可能是 O

- A.圆形
- B.横椭圆形
- C.横裂状
- D.纵椭圆形
- E.竖裂状

42. 某妇女，卵巢功能逐渐减退，月经不规则，生殖器开始萎缩，则其正处于人生的
()

- A.老年期
- B.绝经过渡期
- C.性成熟期
- D.青春期
- E.儿童期

43. 关于阴道灌洗，错误的描述是 O

- A.有清洁、收敛、热疗的作用
- B.冲洗筒高挂离床沿 1 米高处
- C.月经期、产褥期禁用
- D.未婚女子一般不做阴道灌洗
- E.宫颈癌病人有活动性出血者，禁止灌洗

44 . 外阴尖锐湿疣的病原体是 O

- A.支原体
- B.衣原体
- C.风疹病毒
- D.疱疹病毒
- E.人乳头瘤病毒 (

45 . 以下不是女性生殖器自然防御功能的是 ○

- A.两侧大阴唇自然合拢
- B.阴道 PH 在 3.8~4.4
- C.子宫颈粘液栓的形成
- D.子宫内膜周期性剥脱
- E. 阴道内同时寄居需氧菌、厌氧菌（正确件案）

46. 患者女性，38 岁，孕 2 产 1,2 年前产钳分娩，长时间站立、下蹲后腰背酸痛有下坠感，清洗外阴可及一肿物。妇科检查：可看见宫颈已脱出阴道口，宫体仍在阴道内。诊断为子宫脱垂几度 ○

- A.子宫脱垂Ⅰ度轻型
- B.子宫脱垂Ⅰ度重型
- C 子宫脱垂Ⅱ度轻型 ,C
- D.子宫脱垂Ⅱ度重型
- E.子宫脱垂Ⅲ度

47. 患者女性，38 岁，孕 2 产 1,2 年前产钳分娩，长时间站立、下蹲后腰背酸痛有下坠感，清洗外阴可及一肿物。妇科检查：可看见宫颈已脱出阴道口，宫体仍在阴道内。术后患者适宜的卧位为 ○

- A.半坐位
- B.截石位
- C.平卧位
- D.侧卧位
- E.俯卧位

48. 患者女性，38 岁，孕 2 产 1,2 年前产钳分娩，长时间站立、下蹲后腰背酸痛有下坠感，清洗外阴可及一肿物。妇科检查：可看见宫颈已脱出阴道口，宫体仍在阴道内。护士指导患者盆底肌肉组织锻炼的方法为 ○

A.下肢运动

B.收缩肛门的运动，

C.仰卧起坐

D.俯卧撑

E.上肢运动

49. 关于宫颈活组织检查，下列描述正确的是（）

A.在宫颈外口鳞状上皮与柱状上皮交界处取材

- B.在可疑病灶（碘着色区）上取材
- C.怀疑有恶变者，在宫腔内刮取组织
- D.钳取组织后，用 75%酒精进行固定
- E.宫颈局部有出血时，不需止血

50 .关于滴虫阴道炎的治疗，下列说法不正确的是（）

- A.夫妻双方应同时治疗
- B.哺乳期不宜口服甲硝唑
- C.常用 2%～4%碳酸氢钠溶液冲洗阴道（
- D.治疗后复查转阴，仍需治疗一疗程
- E.局部治疗与全身治疗相结合

51 .女性盆腔炎疾病多发生在 O

- A.初潮期
- B.绝经后
- C 未婚者
- D.老年期
- E.性活跃期

52 .患者女性，18 岁，高三学生，月经来潮 3 年，有痛经史，今日月经第一天，下腹部疼痛，坠胀伴腰痛就诊，医生诊断为：原发性痛经。

53 该疾病的护理为 O

54 .患者女性，18 岁，高三学生，月经来潮 3 年，有痛经史，今日月经第一天，下腹部疼痛，坠胀伴腰痛就诊，医生诊断为：原发性痛经。

告知患者（）

- A.合理休息，充足睡眠，摄取足够的营养
- B.增加运动，减少睡眠，进食清淡饮食
- C.减少运动，充足睡眠，增加饮食

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076041002025010050>