

2024 年安徽省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题真题题库含答案（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可引起驾驶员视物模糊的药物是

- A: 阿米洛利
- B: 双嘧达莫
- C: 东莨菪碱
- D: 抗过敏药

答案：C

2. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

- A: 血小板计数增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：C

3. （2016 年真题）患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是（）。

- A: 吡嗪酰胺
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：B

4. (2017 年真题) 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘, 宜选择的药物是 ()

- A: 东莨菪碱
- B: 硫酸镁
- C: 比沙可啶
- D: 乳果糖

答案：D

5. 起效较慢, 需要 3 个月才可以改善由前列腺增生所导致的尿路梗阻, 减少残余尿量的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 氟伏沙明
- B: 特拉唑嗪
- C: 阿夫唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：D

6. 患者, 女性, 62 岁, 自述近日常有一过性黑矇, 雾视、视野中有黑点, 一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

- A: 2.0~3.5
- B: 2.0~4.0
- C: 2.0~3.0
- D: 3.0~4.0

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

7. (2018 年真题) 患者, 女, 45 岁, 6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁, 在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗, 症状控制较好, 近 3 个月服用西咪替丁, 患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱, 该患者各地求医, 服用各种药物, 具体药物品种不详。围绕该病例, 医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 苯巴比妥
- D: 地西洋

答案: A

8. 服用时应多饮水, 同时应碱化尿液以防止尿酸结石形成的药物是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 氨基西林
- C: 苯溴马隆
- D: 氨茶碱

答案: C

9. (2019 年真题) 患者, 女, 55 岁, 因持续性中上腹疼痛 2 日入院。

查体: 体温 38℃, 中上及左上腹有压痛。化验结果: 白细胞计数

18.7x10⁹/L, 血清淀粉酶 1993U/L, 血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性胆囊炎
- B: 急性胰腺炎
- C: 急性胃炎
- D: 急性阑尾炎

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

10. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1%硫酸镁

B: 3%过氧化氢

C: 1%硫酸铜

D: 1%氯化钠

答案：A

11. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

A: 尿胆红素阳性

B: 尿淀粉酶增高

C: 尿血红蛋白阳性

D: 尿葡萄糖阳性

答案：C

12. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

A: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

B: 瑞格列奈片应于餐前服用

C: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药

D: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

答案：D

13. 药物代谢酶系不成熟或分泌不足，2 周后肝功能趋于完备可影响

A: 药物排泄

B: 药物吸收

C: 药物中毒

D: 药物代谢

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

14. 长期使用会产生耐受性，一般不适宜作为胃食管反流病长期维持治疗的抑酸剂是

- A: 伊托必利
- B: 泮托拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 奥美拉唑

答案：C

15. 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是：

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 磺胺甲恶唑
- D: 头孢呋辛

答案：C

16. 我国育龄妇女的主要避孕措施为

- A: 口服避孕药
- B: 男性绝育术
- C: 宫内节育器
- D: 阴茎套

答案：C

17. 竞争自肾小管排泄、延长半衰期的是

- A: 青霉素+丙磺舒
- B: 西咪替丁+格列本脲
- C: 四环素+硫酸亚铁
- D: 多潘立酮+维生素 C

答案：A

18. 应用胆碱酯酶复活剂应注意

- A: 中毒已超过 3 日使用复活剂仍然有效
- B: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加
- C: 复活剂不需稀释，直接注射
- D: 复活剂对毒蕈碱样作用较强

答案：B

19. 以下所列药物中，适宜用于儿童患者的是（）。

- A: 万古霉素
- B: 氨基糖苷类
- C: 氟喹诺酮类
- D: 青霉素

答案：D

20. 轻症、慢性疾病治疗时，因用药持久，适宜选用

- A: 栓剂
- B: 软膏剂
- C: 片剂
- D: 注射剂

答案：C

21. 痛风患者发作间歇期应使用苯溴马隆或者丙磺舒，以阻止肾小管对尿酸盐的重吸收。

- A: 促进尿酸排泄
- B: 抑制尿酸生成
- C: 抑制前列腺素合成

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 抑制粒细胞浸润

答案：A

22. 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是：

A: 骨质疏松症或骨桥

B: 骨骼发育不良或骨软化

C: 横纹肌溶解或肌痛

D: 间质性骨炎或肾结石

答案：D

23. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

A: 1/2 片 qd

B: 1.5 片 qd

C: 1 片 qd

D: 1 片 bid

答案：C

24. (2018 年真题) 患者,男,69 岁,因高血压长期服用抗高血压药,近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是 ()

A: 多沙唑嗪

B: 非洛地平

C: 普萘洛尔

D: 卡托普利

答案：B

25. (2018 年真题) 由带状疱疹所致的严重后遗神经痛,应选的药物是 ()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 羟考酮缓释片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 芬太尼透皮贴剂
- D: 卡马西平片

答案：D

26. 患者，男，32 岁。急性铅中毒，应用硫酸镁导泻，适宜的给药途径是

- A: 口服给药
- B: 静脉注射
- C: 吸入给药
- D: 直肠给药

答案：A

27. 0.5%硫酸铜溶液洗胃用于解救

- A: 铅中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 磷化锌中毒
- D: 汞中毒

答案：C

28. 以下药物中，不属于 WHO 划定的一线抗结核药物的是()

- A: 利福平(R)
- B: 吡嗪酰胺(Z)
- C: 链霉素(S)
- D: 异烟肼(H)

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

29. 避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

- A: 阿托伐他汀钙
- B: 链激酶
- C: 胺碘酮
- D: 氯吡格雷

答案：C

30. 1 天给药 1 次；需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍针对

- A: 半衰期 8~24 小时
- B: 半衰期大于 30 小时
- C: 半衰期小于 30 分钟
- D: 半衰期大于 24 小时

答案：D

31. (2018 年真题) 患者, 男, 60 岁, 因水疱型足癣到药店购药药师应推荐的药品是 ()

- A: 特比萘芬乳膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 10%樟脑软膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：A

32. 可引起嗜睡的是

- A: 抗过敏药
- B: 右美沙芬
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案：A

33. 脂肪乳用于急性肝损伤、急性胰腺炎、脂质肾病患者

- A: 过度治疗用药
- B: 有禁忌证用药
- C: 无适应证用药
- D: 超适应证用药

答案：B

34. 患者,77岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维C银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

- A: 银翘
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 氯苯那敏
- D: 维生素

答案：C

35. 遭遇蛇类咬伤,最先采取的应急措施是

- A: 用绳索等在伤口的近心端捆扎
- B: 就地取材在伤口的远心端捆扎
- C: 用布带等在伤口的近心端 5cm 处捆住
- D: 就地取材将伤口捆扎

答案：C

36. 同时服用有利于铁的吸收的药物是

- A: 维生素 B
- B: 维生素 A
- C: 维生素 C
- D: 维生素 D

答案：C

37. 服用磺胺甲噁唑不宜同食

- A: 咖啡
- B: 葡萄柚汁
- C: 食醋
- D: 高蛋白食物

答案：C

38. 对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

- A: 在 8℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- B: 在 10℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- C: 在 0℃ 以下时，温度越低，对保管越有利
- D: 在 2℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

答案：D

39. 设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

- A: 《马丁代尔药物大典》
- B: 《美国药典药物信息》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《药物事实与比较》

答案：B

40. 依据规定，医师必须单独开具处方的药物是

- A: 生物制剂
- B: 化学药品
- C: 中药饮片
- D: 中成药

答案：C

41. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 蔗糖
- B: 馒头
- C: 无糖饼干
- D: 葡萄糖

答案：D

42. 下列药物中，解救三唑仑中毒的特效药是

- A: 维生素 C
- B: 碳酸氢钠
- C: 维生素 K
- D: 氟马西尼

答案：D

43. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

- A: 氯己定含漱液
- B: 西地碘含片
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 替硝唑含漱液

答案：C

44. 原发性蛛网膜下腔出血常见病因为

- A: 动脉炎

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 颅内动脉瘤
- C: 脑血管畸形
- D: 高血压性动脉硬化

答案：B

45. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

- A: 氯苯那敏
- B: 卡托普利
- C: 铋制剂
- D: 氟西汀

答案：A

46. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A: 奥司他韦
- B: 金刚乙胺
- C: 利巴韦林
- D: 金刚烷胺

答案：A

47. 具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 3%鞣酸溶液
- C: 1: 5000 高锰酸钾
- D: 淀粉溶液

答案：B

48. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次 / 分、血压 160 / 100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A: 130 / 80mmHg

B: 140 / 80mmHg

C: 140 / 90mmHg

D: 150 / 100mmHg

答案：A

49. 双侧肾动脉狭窄患者禁用的抗高血压药物为 ()。

A: 利尿剂（噻嗪类）

B: ACEI

C: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

D: 利尿剂（袢利尿药）

答案：B

50. 中度贫血，Hb 为 ()

A: 小于 60g/L

B: 60~90g/L

C: 60~120g/L

D: 90~120g/L

答案：B

51. 常见的患者用药咨询内容不包括

A: 药物相互作用

B: 药品适应证

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 药品名称

D: 国外新药动态

答案: D

52. 患者男性，35 岁，髌关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 氯吡格雷

B: 利伐沙班

C: 肝素

D: 华法林

答案: A

53. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

A: 人员培训

B: 环境与流程的优化与持续改进

C: 科学发展

D: 管理规范到位

答案: A

54. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

A: 2HRE / 7HR

B: 3HRZE / 9HR

C: 2HRZE / 4HR

D: 2HRZE / 4HR

答案: B

55. (解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

- A: 磷化锌中毒
- B: 三唑仑中毒
- C: 丙戊酸钠中毒
- D: 丙米嗪中毒

答案：A

56. 患者，女，75 岁，因腰痛无法起床 2 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行。夜间经常失眠，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史，但是患慢性阻塞性肺疾病 10 余年。经 x 线检查诊断为老年性骨质疏松症导致的腰椎压缩性骨折。

- A: 唑吡坦
- B: 苯巴比妥
- C: 水合氯醛灌肠
- D: 地西洋

答案：A

57. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丙醇
- C: 亚甲蓝
- D: 维生素 K

答案：A

58. 当创伤应激严重时，给予肠外营养的热氮比调整为

- A: NPC5: 5
- B: 150kcal:1gN
- C: 100kcal:1gN
- D: NPC7:3

答案: C

59. 给失眠患者开具地西洋，医师应采用的处方纸是

- A: 淡绿色处方纸
- B: 白色、右上角有标识处方纸
- C: 淡黄色处方纸
- D: 白色、右上角无标识处方纸

答案: B

60. 患者，男，67岁，主诉腰背疼痛、乏力，负荷增加时疼痛加重，严重时翻身、起坐及行走困难，疑似老年性骨质疏松症。经双能 X 线吸收测定，T 值 ≤ -2.5 ，确诊。药师应告知患者在服用维生素 D 软胶囊、碳酸钙片基础上，可加服

- A: 依替膦酸二钠
- B: 艾司奥美拉唑
- C: 泼尼松龙
- D: 苯妥英钠

答案: A

61. 患者 12 岁，近 1 周夜间持续咳嗽宜首选

- A: 右美沙芬?
- B: 盐酸吗啡?
- C: 羧甲司坦?

D: 苯丙哌林?

答案: A

62. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 坏血病

B: 佝偻病

C: 智障

D: 脑瘫

答案: B

63. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

A: 奥利司他

B: 别嘌醇

C: 二甲双胍

D: 替米沙坦

答案: A

64. 禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括 ()

A: 三环类药物

B: 5-HT_{1A} 受体部分激动剂

C: 苯二氮类药物

D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

答案: C

65. 用于评价肝功能不全严重程度的是 ()

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: Cochrane 证据分级

B: APACHE 评分系统

C: CTP 评分标准

D: 数字评分法

答案：C

66. 患者，女，55 岁，化验结果：TC4.0mmol/L（参考值参<5.2mmol/L），TG8.1mmol/L（参考值 0.56~1.70mmol/L），应首选的调脂药物为

A: 苯扎贝特

B: 烟酸

C: 氟伐他汀

D: 依折麦布

答案：A

67. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

A: II 期临床试验

B: I 期临床试验

C: 临床预试验

D: III 期临床试验

答案：B

68. 可使驾驶员出现定向力障碍的药物是

A: 哌替啶

B: 右美沙芬

C: 吲达帕胺

D: 东莨菪碱

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

69. 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于()

- A: 成本-效益分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效果分析

答案：A

70. (2015 年真题) 处方中“餐前给药”的外文缩写是()。

- A: pc
- B: qn
- C: Ac
- D: po

答案：C

71. 对抗胆碱阻断的解毒剂是()。

- A: 乙酰胺
- B: 卡马西平
- C: 阿托品
- D: 毒扁豆碱

答案：D

72. 稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

- A: 硝酸甘油
- B: 阿司匹林
- C: 氯贝丁酯
- D: 低分子肝素

答案：B

73. 救治磷化锌中毒的过程中，立即应用的催吐药是

- A: 硫酸镁
- B: 硫酸铜
- C: 阿扑吗啡
- D: 硫酸钠

答案：B

74. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- B: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
- C: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- D: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同

答案：C

75. (2018 年真题) 患者,女,71 岁,2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA1c) 9.2%,空腹血糖 10.5mmol/L,餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo,格列美脲片 2mgtidpo,罗格列酮片 2mgbidpo,甲钴胺片 0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 门冬胰岛素餐前 30~60min,皮下注射,tid
- B: 普通胰岛素餐前 30min,皮下注射,qd
- C: 低精蛋白锌胰岛素餐前 30min,皮下注射
- D: 甘精胰岛素睡前 30min,皮下注射,qd

答案：D

76. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是：

- A: 胺碘酮

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 福辛普利
- C: 地高辛
- D: 美托洛尔

答案：A

77. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 多潘立酮片
- B: 阿嗝米特肠溶片
- C: 乳酶生
- D: 奥美拉唑

答案：C

78. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 氟桂利嗪
- C: 呋塞米
- D: 胺碘酮

答案：C

79. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品

- A: 权威性
- B: 合理性
- C: 新颖性
- D: 归因性

答案：B

80. 可帮助人短时间内急速降低体重

A: 蛋白同化制剂

B: 肽激素类

C: 麻醉药品

D: 利尿剂

答案：D

81. 对肾功能不全患者的给药方案调整，说法正确的是

A: 可采用延长给药间隔法，即每次给药剂量不变而用药间隔延长，但
该法很难达到有效血药浓度

B: 可采用减量法给药，即每次剂量减少而用药间隔不变，但该法的血
药浓度波动幅度较大

C: 尽可能选用经肝消除的药物，肝毒性大的药物不必减量

D: 必须使用具有明显肾毒性药物时，宜进行血药浓度监测，实行个体
化给药

答案：D

82. (2019 年真题) 患者，女，25 岁，两天前淋雨后开始发热体温
39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细
胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物

A: 头孢他啶

B: 阿奇霉素

C: 阿米卡星

D: 头孢唑林

答案：D

83. 尿酸减少提示

- A: 核蛋白代谢增强
- B: 痛风
- C: 肾小管重吸收障碍
- D: 肾功能不全

答案：D

84. 患者,男,34岁,有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救,表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制,可选用的解救药物是()

- A: 二巯丙醇
- B: 纳洛酮
- C: 维生素K
- D: 亚甲蓝

答案：B

85. 患者,男,73岁,因腰痛无法起床1天就诊。患者已有多年的腰痛病史,经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难,行走为小步慢行,昨夜睡眠正常,早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经X线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A: 老年性骨质疏松症
- B: 长期服用抗癫痫药
- C: 维生素D中毒
- D: 长期服用糖皮质激素

答案：A

86. 自我药疗时,初治滴虫性阴道炎,每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/076121021102011030>