

2023-24 年广东省廉江市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试大全 A4 版

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 容易氧化的药物是

- A: 胃蛋白酶
- B: 青霉素类、头孢菌素类
- C: 牛痘菌苗
- D: 阿朴吗啡、水杨酸钠

答案：D

2. 合并 3 度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

- A: 卡托普利
- B: 维拉帕米
- C: 多沙唑嗪
- D: 哌唑嗪

答案：B

3. 能减弱华法林的抗凝作用的食物是

- A: 韭菜
- B: 芒果
- C: 维生素 K
- D: 地瓜

答案：A

4. 低 HDL-C 血症，宜选用的药物是

- A: 烟酸
- B: 贝特类
- C: 他汀类
- D: ω -3 脂肪酸

答案：A

5. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于循证医学证据推荐强度的

- A: E 级
- B: B 级
- C: D 级
- D: C 级

答案：C

6. (2015 年真题) 处方中“餐前给药”的外文缩写是 ()。

- A: qn
- B: Ac
- C: pc
- D: po

答案：B

7. 属于护士用药咨询的是

- A: 减肥、补钙、补充营养素
- B: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- C: 抗菌药物的合理应用
- D: 注射剂溶媒的正确选择

答案：D

8. (2015 年真题) 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是 ()。

- A: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- B: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快
- C: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时内
- D: 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药

答案: D

9. 患儿，男，2 岁，患有尿路感染，适宜的治疗药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿莫西林
- D: 链霉素

答案: C

10. (2017 年真题) 依那普利的妊娠毒性分级是 ()

- A: A 级
- B: X 级
- C: D 级
- D: C 级

答案: C

11. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 利多卡因
- B: 肾上腺素
- C: 苯妥英钠

D: 阿托品

答案: D

12. 二巯丙醇用于解救

A: 有机磷中毒

B: 三唑仑中毒

C: 汞中毒

D: 氰化物中毒

答案: C

13. 以下所列药物中，适宜用于儿童患者的是()。

A: 氟喹诺酮类

B: 氨基糖苷类

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案: D

14. 在《中国药典临床用药须知》以外的权威性文献中记载的应该做皮肤敏感试验的品种是

A: 肉毒抗毒素

B: 降纤酶

C: 右旋糖酐

D: 鱼肝油酸钠

答案: C

15. (2018 年真题) 患者,男,60 岁,因轻度冻疮(无破溃)到药店购药,药师应推荐的药品是()

A: 10%樟脑软膏

- B: 特比萘芬乳膏
- C: 利巴韦林软膏
- D: 氢化可的松软膏

答案：A

16. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

- A: 抗癫痫药所致的骨质疏松
- B: 老年性骨质疏松
- C: 原发性骨质疏松
- D: 妇女绝经后骨质疏松

答案：B

17. 真菌引起阴道炎（）

- A: 咪康唑
- B: 聚甲酚磺醛
- C: 庆大霉素
- D: 甲硝唑

答案：A

18. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是的是

- A: 药品类易制毒化学品
- B: 肽类激素
- C: 蛋白同化激素
- D: 精神刺激剂

答案：A

19. (用药导致的血常规异常)硝酸甘油

- A: 血小板减少

B: 嗜酸性粒细胞减少

C: 中性粒细胞减少

D: 血红蛋白量增多

答案: D

20. 首次给药在睡前上床后服用，适用于高血压伴前列腺增生，也用于难治性高血压患者降压药种类是

A: ACEI 和 ARB

B: α 受体阻断剂

C: β 受体阻断剂

D: 钙通道阻滞剂

答案: B

21. 避免与辛伐他汀合用的药物是 ()

A: 美罗培南

B: 头孢哌酮

C: 万古霉素

D: 克拉霉素

答案: D

22. 下列哪种药对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A: 普萘洛尔

B: 阿托品

C: 普鲁卡因胺

D: 苯妥英钠

答案: D

23. (2019 年真题) 患者，男，60 岁，坏死性胰腺炎剖腹探查术术后 2 年，恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

- A: 蒙脱石散
- B: 复方阿嗪米特肠溶片
- C: 干酵母片
- D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：B

24. 使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是

- A: 林可霉素类
- B: 氨基糖苷类
- C: 大环内酯类
- D: 头孢菌素类

答案：B

25. (2019 年真题) 患者，男，50 岁，临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是

- A: 氟西汀应于睡前服用
- B: 服用氟西汀期间不能饮酒
- C: 不得随意自行调整氟西汀剂量
- D: 不能突然停止服用氟西汀

答案：A

26. 根据《药品召回管理办法》，药品召回的主体是

- A: 药品监督管理部门
- B: 药品经营企业
- C: 药品研究机构

D: 药品生产企业

答案: D

27. 接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

A: 乙型肝炎病毒表面抗体

B: 乙型肝炎病毒 e 抗原

C: 乙型肝炎病毒表面抗原

D: 乙型肝炎病毒 e 抗体

答案: A

28. (2019 年真题) 患者，女，67 岁，出现认知功能障碍 5 年诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是

A: 氯化铵

B: CYP3A4 抑制剂

C: CYP2D6 抑制剂

D: 碳酸氢钠

答案: D

29. 医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。OS. 是()

A: 右眼

B: 立即

C: 适量

D: 左眼

答案: D

30. (有关物质中毒的特效解毒剂)，有机磷中毒的特效解毒剂是

- A: 维生素 K
- B: 氯解磷定
- C: 烯丙吗啡
- D: 乙酰胺

答案：B

31. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 卡马西平
- B: 氯化钾
- C: 奥美拉唑
- D: 红霉素

答案：D

32. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

- A: 急性肾盂肾炎
- B: 慢性肾盂肾炎
- C: 急性膀胱炎
- D: 急性肾小球肾炎

答案：A

33. (2016 年真题) 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是 ()。

- A: 孟鲁斯特纳咀嚼片

- B: 多索茶碱注射液
- C: 布地奈德混悬液
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案: C

34. 患者男,78 岁实施右侧髋关节置换术,术后第 10 日,患侧下肢出现肿胀、疼痛,诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是 ()

- A: 阿司匹林
- B: 血凝酶
- C: 依诺肝素
- D: 氯吡格雷

答案: C

35. 有家族血栓栓塞性疾病史人群禁用的痤疮药是

- A: 过氧化苯甲酰
- B: 口服短效避孕药
- C: 米诺环素
- D: 维 A 酸

答案: B

36. 具有抗肿瘤作用的抗风湿药

- A: 塞来昔布
- B: 利妥昔单抗
- C: 甲氨蝶呤
- D: 布洛芬

答案: C

37. 疾病预防和控制中心 (www. cdagov. cn) 刊载的主要内容是

- A: 卫生事业发展的总体规划和战略
- B: 国内外医学新闻、最新科研动态
- C: 综合药学信息，药学服务
- D: 有关感染性疾病的预防信息

答案：D

38. 高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于()

- A: 双侧肾动脉狭窄患者
- B: 痛风患者
- C: 胃溃疡患者
- D: 心力衰竭患者

答案：A

39. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用二甲双胍肠溶片
- B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片
- D: 停用阿托伐他汀钙片

答案：D

40. 女性，32 岁，3 年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 7×10^9

- A: 巨幼红细胞性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：D

41. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 高热
- B: 正常
- C: 低热
- D: 中等度热

答案：C

42. 贫血患者常出现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 血小板计数增高
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：B

43. 食入何种物质对抗高血压药有影响

- A: 食醋
- B: 蛋白质
- C: 脂肪
- D: 食盐

答案：D

44. 合并心力衰竭的高血压患者，降压目标值为

- A: $<125 / 75\text{mmHg}$

B: $<140 / 90\text{mmHg}$

C: $<150 / 90\text{mmHg}$

D: $<130 / 80\text{mmHg}$

答案：B

45. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 在葡萄糖溶液中稳定

B: 与氯化钠存在配伍禁忌

C: 其神经毒性与剂量大小无关

D: 遇冷可加重其神经毒性

答案：C

46. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，诊断为 2 型糖尿病，既往有磺胺过敏史，不宜选用的药物是

A: 阿卡波糖

B: 吡格列酮

C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案：D

47. 为保证用药安全，一些药物应用前需要实施皮肤敏感试验。一些权威性较高的二次文献中记载的需进行皮肤敏感试验的药品是

A: 玻璃酸酶注射剂

B: 链霉素注射剂

C: 鱼肝油酸钠注射剂

D: 青霉素钠注射剂

答案：A

48. 网站的内容是否及时更新

- A: 归因性
- B: 合理性
- C: 权威性
- D: 新颖性

答案：D

49. 双侧肾动脉狭窄抗高血压药物的禁忌证

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 依那普利
- D: 维拉帕米

答案：C

50. 患者，女，38岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力2日；查体：神清、气稍促，心律95bpm，律齐，体温39.1℃，血压110/70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 60mg
- B: 120mg
- C: 80mg
- D: 100mg

答案：D

51. 长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

- A: 美金刚

B: 铝碳酸镁

C: 多奈哌齐

D: 匹伐他汀

答案: C

52. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 对因治疗

B: 姑息治疗

C: 缓和治疗

D: 对症治疗

答案: D

53. (2015 年真题) 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用 ()。

A: 左旋多巴

B: 多巴丝肼

C: 司来吉兰

D: 苯海索

答案: D

54. 为提高叶酸治疗营养性巨幼细胞贫血的疗效，应同时用

A: 维生素 B1

B: 维生素 B12

C: 维生素 K

D: 维生素 D

答案：B

55. 患者男,70 岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是()

- A: 卡比多巴
- B: 甲基多巴
- C: 普拉克索
- D: 苯海索

答案：D

56. 下列药物中，属于抗风湿植物药制剂的是

- A: 紫杉醇
- B: 青藤碱
- C: 青蒿素
- D: 银杏叶

答案：B

57. (2018 年真题) 患者,女,30 岁,妊娠 7 个月,既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧,发痒、分泌物多,有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状,疗效较好,今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是()

- A: 磺胺醋酰钠滴眼液
- B: 酞丁安滴眼液
- C: 利巴韦林滴眼液
- D: 硫酸锌滴眼液

答案：D

58. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 甲钴胺片 0.5mgtidpo
- B: 二甲双胍片 0.5gtidpo
- C: 格列美脲片 2mgtidpo
- D: 罗格列酮片 2mgbidpo

答案：C

59. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的饮食是

- A: 酒
- B: 脂肪
- C: 食醋
- D: 食盐

答案：C

60. 引起白细胞增多的常见疾病可能是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 肺结核
- C: 病毒性感冒
- D: 肺炎

答案：D

61. 女性红细胞沉降率的正常范围值

- A: 0~20mm/h
- B: 0~10mm/h
- C: 0~5mm/h

D: 0~15mm/h

答案: A

62. 用于口服后吸收迅速而完全，解热镇痛作用明显的非处方药是

A: 谷维素

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案: C

63. 高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于()

A: 心力衰竭患者

B: 痛风患者

C: 双侧肾动脉狭窄患者

D: 胃溃疡患者

答案: B

64. 属于浓度依赖性抗菌药，评估此类药物的 PK / PD 参数主要有 C_{max} / MIC 或 $AUC_{0\sim 24} / MIC$ ，提高此类抗菌药物疗效的策略主要是提高 C_{max} ，一般推荐日剂量单次给药方案的药物是

A: 利奈唑胺

B: 氨茶碱

C: 头孢克洛

D: 左氧氟沙星

答案: D

65. 糖浆剂给药时的注意事项是

A: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

B: 宜用温开水送服，以免药品黏附在咽喉和食管壁上引起刺激，产生恶心等不适

C: 宜含服于舌下，以达到迅速缓解病情的作用

D: 服用时在口咽部黏膜表面形成一层保护膜，不宜立刻饮水，以免冲淡药物，降低疗效

答案：D

66. 按上述方案治疗 3 个月后，查空腹血糖 7.5mmol/L，餐后血糖 12.2mmol/L 糖化血红蛋白 7.0%。该患者经常出差，进食不规律，希望选择每日使用一次的降糖药。宜选用的药物是（）

A: 格列美脲片

B: 阿卡波糖片

C: 二甲双胍片

D: 瑞格列奈片

答案：A

67. 可引起再生障碍性贫血

A: 氯霉素

B: 苯妥英钠

C: 维生素 A

D: 抗组胺药

答案：A

68. （2017 年真题）与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是（）

A: 左旋多巴片

B: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

C: 非洛地平片

D: 维 A 酸片

答案：C

69. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

- A: 速克感冒片
- B: 速感宁胶囊
- C: 复方酚咖伪麻胶囊
- D: 维 C 银翘片

答案：C

70. （2017 年真题）可能影响儿童骨骼发育的药物是（）

- A: 头孢克洛
- B: 阿莫西林
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 诺氟沙星

答案：D

71. 首要标准是

- A: 药物治疗的有效性
- B: 药物治疗的安全性
- C: 药物治疗的规范性
- D: 药物治疗的方便性

答案：A

72. 服用左旋多巴时应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开

- A: 1～1.5 小时
- B: 2～3 小时
- C: 0.5～1 小时

D: 1.5~2 小时

答案: B

73. 耳、肾毒性大，肾功能不全患者不宜使用的药物是

A: 莫西沙星

B: 阿米卡星

C: 头孢哌酮

D: 阿奇霉素

答案: B

74. (血常规检查异常的病症)骨髓增生病

A: 红细胞沉降率减慢

B: 白细胞增多

C: 淋巴细胞增多

D: 血小板增多

答案: D

75. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

A: 柔红霉素

B: 白消安

C: 博来霉素

D: 氟尿嘧啶

答案: D

76. 属于 B 级的药物是

A: 万古霉素

B: 沙利度胺

C: 葡萄糖

D: 阿莫西林

答案: D

77. 患者，女，50 岁，50kg，157cm，患复发转移性乳腺癌，术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育，错误的是

A: 用药期间应每 3 个月监测心脏功能

B: 每周给药 1 次，第 1 周给药剂量 200mg，静脉滴注 90min

C: 从第 2 周起，每次给药 100mg，静脉滴注 30min

D: 用药前应进行 RAS 基因筛查

答案: D

78. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

A: <50mg / dl

B: <40mg / dl

C: <70mg / dl

D: <60mg / dl

答案: C

79. 有潜在的肺毒性的是

A: 双嘧达莫

B: 苯巴比妥

C: 呋喃妥因

D: 氯苯那敏

答案: C

80. 患者，男，28 岁，主诉：发作性四肢抽搐 2 年，加重 2 月，化验结果显示 TSH 增高，FT3，FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

- A: 100 μ g，qd，早餐后半小时，顿服
- B: 100 μ g，qd，早餐前半小时，顿服
- C: 100mg，qd，晚餐后顿服
- D: 100mg，qd，睡前顿服

答案：B

81. 可单独用于轻度、早期高血压的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 阿米洛利
- D: 甘露醇

答案：A

82. （2019 年真题）合并闭角型青光眼的前列腺增生患者，不宜选用的药物是

- A: 非那雄胺
- B: 多沙唑啉
- C: 托特罗定
- D: 坦索罗辛

答案：C

83. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片依那普利的主要不良反应是

A: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

B: 出血

C: 横纹肌溶解症

D: 高钾血症

答案: D

84. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是

A: 氨氯地平

B: 缬沙坦

C: 氨苯蝶啶

D: 维拉帕米

答案: C

85. 药师应告知医师"血药浓度监测是提高治疗效果的重要措施"的事例是

A: 阿昔洛韦致急性肾衰竭

B: 利巴韦林致畸与肿瘤

C: 替加色罗存在心绞痛

D: 地高辛用于肾功能不全者须监测血药浓度

答案: D

86. 红肿较严重而起水泡，疼痛较剧烈，感觉迟钝或麻木，1~2 日后水泡吸收结痂，2~3 周后结痂脱落的为

A: 4 度冻伤

B: 3 度冻伤

C: 1 度冻伤

D: 2 度冻伤

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/076135143105011030>