

2024 河南省龙亭区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库往年题考

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2017 年真题）药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括（）

- A: 仔细核对药品
- B: 自行修改错误处方
- C: 进行用药指导
- D: 严格审核处方

答案：B

2. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 有机硫类
- B: 阿托品
- C: 间羟胺
- D: 地西洋

答案：B

3. 归属于药历“用药记录”项下的是

- A: 临床诊断
- B: 联合用药
- C: 医保和费用支付情况
- D: 主要实验室检查数据

答案：B

4. (2021 年真题) 患者,男,52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是 ()

B: 低血压

C: 骨质疏松

D: 消化性溃疡

答案: A

5. 耳蜗神经损伤及耳毒性

A: 阿奇霉素

B: 米诺环素

C: 庆大霉素

D: 氯霉素

答案: C

6. 具有心脏毒性的药物是

A: 奥美拉唑

B: 莫沙必利

C: 碳酸氢钠

D: 西沙必利

答案: D

7. 药师应当主动对药物的风险/效益进行定量评估和分析,将全部信息进行反馈,改进相关监督、管理及所使用的法律、法规这一药学服务工作属于

A: 药物重整

B: 药物评价

C: 药物警戒

D: 药物治疗管理

答案: C

8. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体:咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史:高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

A: 胃食管反流病

B: 支气管哮喘

C: 心绞痛

D: 胃溃疡

答案: A

9. 去甲肾上腺素和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药

A: 氟伏沙明

B: 吗氯贝胺

C: 氯米帕明

D: 米氮平

答案: D

10. 从事药学服务的药师必须具备的专业技能是

A: 药物警戒技能

B: 沟通技能

C: 药历书写技能

D: 调剂技能

答案: D

11. 一些药物的副作用是嗜睡、眩晕、视力模糊或定向力障碍等；为安全起见驾驶员应该

- A: 开车前 4 小时服用
- B: 开车前 4 小时慎用
- C: 开车前 2 小时慎用
- D: 开车前 2 小时服用

答案：B

12. 贫血的临床表现与下列哪项有关

- A: 红细胞减少
- B: 血红蛋白下降的速度
- C: 缺乏叶酸
- D: 铁元素缺乏

答案：B

13. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇片 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋、话不成句，被紧急送往医院。

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 沙丁胺醇片
- C: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂
- D: 布地奈德气雾剂

答案：A

14. 可引起性功能障碍的药物是

- A: 维生素 E
- B: 沙美特罗

C: 西地那非

D: 度洛西汀

答案: D

15. 与单胺氧化酶抑制剂合用有发生高血压危象的潜在风险的是

A: 酚酞

B: 八面体蒙脱石

C: 地芬诺酯

D: 莫沙必利

答案: C

16. 采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

A: 1.5~2.0

B: 0.8~1.5

C: 3.0~4.0

D: 2.0~3.0

答案: D

17. 帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）

A: 神经精神障碍

B: 姿势反射障碍

C: 不安腿综合征

D: 体位性低血压

答案: B

18. 以餐后血糖升高为主，伴有餐前血糖轻度升高可以应用

A: 胰岛素注射液

B: 磺酰脲类

C: 胰岛素增敏剂

D: α -糖苷酶抑制剂

答案: D

19. 肺炎药物治疗时应注意

A: 一旦怀疑为细菌性肺炎应给予首剂抗菌药物，病情稳定后可从静脉途径改为口服治疗

B: 抗菌药一般不良反应较少，不需要注意与预防

C: 肺炎的抗菌药物疗程大多数为 5 天，极少数需要 7~10 天或更长疗程

D: 观察抗菌药物疗效应在药物治疗后 12~24 小时对病情进行评价

答案: A

20. 抗结核治疗中，细胞内外均有杀菌作用，且单一杀菌力最强的药物是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 异烟肼

答案: D

21. 关于非甾体抗炎药的叙述正确是

A: 发热时可首选非甾体抗炎药

B: 非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素

C: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全

D: 出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药

答案: B

22. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的人员

A: 归因性

B: 合理性

C: 新颖性

D: 权威性

答案: D

23. (2017 年真题) 下列关于失眠药物治疗策略的说法, 正确的是 ()

A: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

B: 焦虑症患者存在失眠时以失眠药物为主

C: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮卓类抗失眠药

D: 失眠继发于或伴发于其他疾病时, 应同时治疗原发或伴发疾病

答案: D

24. 抑制 5-a 还原酶而用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 黄酮哌酯

C: 前列康

D: 非那雄胺

答案: D

25. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

A: 乐果中毒

B: 巴比妥类中毒

C: 3911 中毒

D: 1605 中毒

答案：B

26. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 妊娠 1~2 周

B: 妊娠 3~5 周

C: 妊娠 1~3 周

D: 妊娠 3~4 周

答案：B

27. 是前药，其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂，通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

A: 更昔洛韦

B: 干扰素

C: 氟胞嘧啶

D: 奥司他韦

答案：D

28. 治疗痔疮的常用内服药是

A: 九华膏

B: 地奥司明

C: 联苯苄唑乳膏

D: 聚甲酚磺醛栓

答案：B

29. 服用后不宜立刻饮水，以免冲淡咽部药物浓度的是

- A: 舌下片
- B: 糖浆剂
- C: 胶囊剂
- D: 粉剂

答案：B

30. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 卡托普利

答案：A

31. 可提示急性肝炎的是

- A: γ -谷氨酰转移酶升高
- B: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- C: A/G 值低于 1
- D: 血清碱性磷酸酶升高

答案：B

32. 易引湿的药物是()。

- A: 硫酸镁
- B: 硝酸甘油
- C: 青霉素
- D: 胃蛋白酶

答案：D

33. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A: 叶酸+维生素 B12

B: 硫酸亚铁

C: 亚叶酸钙

D: 维生素 C

答案：D

34. 下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

A: 新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征

B: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：C

35. 随着社会的发展，生活的节奏越来越快，科技给我们带来便利的同时，也给我们的生活和工作增添了不少压力，焦虑、抑郁、失眠等病症的发生率随之上升。

A: 帕罗西汀

B: 曲唑酮

C: 度洛西汀

D: 劳拉西泮

答案：B

36. “沟通医、药、患的重要纽带”的工作是

A: 处方调剂

B: 参与临床药物治疗

C: 静脉药物配置

D: 治疗药物监测

答案：A

37. 以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

- A: 肾病综合征
- B: 高血压
- C: 高脂血症
- D: 急性胰腺炎

答案：D

38. 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加，减少尿酸沉积

- A: 阿司匹林
- B: 丙磺舒
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：B

39. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药物不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

- A: 可能无关
- B: 可能
- C: 很可能
- D: 待评价

答案：B

40. 患者，女，35 岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

- A: 心脏相关风险
- B: 肾毒性

C: 胃肠道反应

D: 肝毒性

答案: C

41. 排便在一日内超过 3 次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

A: 谷维素

B: 磷霉素

C: 天麻素

D: 黄连素

答案: D

42. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是()

A: 铜绿假单胞菌

B: 肠球菌

C: 大肠埃希菌

D: 克雷伯杆菌

答案: C

43. 依药品采购-验收-入库-出库-调配-使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

A: 对可疑药品进行封存

B: 药品召回

C: 反向追踪

D: 查找供货方

答案: C

44. 药物的成本与产生的收益之间进行对比，评价治疗方案的经济性，以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效果分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效用分析
- D: 最小成本分析

答案：B

45. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 动力性腹泻
- B: 分泌性腹泻
- C: 消化不良性腹泻
- D: 感染性腹泻

答案：D

46. 下列药品中，应该贮存在棕色玻璃瓶内的是

- A: 硝酸甘油片
- B: 硫糖铝片
- C: 狂犬疫苗
- D: 硫酸镁

答案：A

47. 在体外无抗凝作用，在体内有凝血作用的是

- A: 尿激酶
- B: 噻氯匹定
- C: 华法林
- D: 肝素

答案：C

48. （2019 年真题）患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 氟桂利嗪
- C: 呋塞米
- D: 硝酸异山梨酯

答案：C

49. 洗胃液 1：5000～1：10000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 乐果中毒
- B: 巴比妥类中毒
- C: 1605 中毒
- D: 3911 中毒

答案：B

50. 应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

- A: 10%～30%
- B: 0.3
- C: 0.4
- D: 10%～20%

答案：D

51. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 氯吡格雷
- B: 氨氯地平
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

52. 依据 CTP 评分，肝功能不全 A 级病人用药剂量为正常患者剂量的

- A: 70%维持剂量
- B: 80%维持剂量
- C: 50%维持剂量
- D: 60%维持剂量

答案：C

53. 患者，女，32 岁，妊娠 20 周。1 天前发热，体温 39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

- A: 金刚烷胺片
- B: 阿昔洛韦片
- C: 奥司他韦胶囊
- D: 利巴韦林片

答案：C

54. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 450kcal
- B: 1150kcal
- C: 200kcal
- D: 700kcal

答案：D

55. 哺乳期妇女应用后可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大的药物是

- A: 四环素
- B: 卡托普利
- C: 含雌、孕激素的避孕药
- D: 喹诺酮类药物

答案：C

56. 用于锑、铅、汞、砷中毒的解救药物是()。

- A: 氯丙嗪
- B: 二巯基丁二钠
- C: 谷胱甘肽
- D: 盐酸烯丙吗啡

答案：B

57. 一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

- A: 磷化锌等灭鼠药
- B: 拟除虫菊酯类杀虫药

C: 克仑特罗(瘦肉精)

D: 香豆素类杀鼠药

答案: D

58. 尿中白细胞增多见于

A: 肝硬化

B: 服用磺胺药

C: 慢性肾盂肾炎

D: 甲状腺功能亢进

答案: C

59. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是()

A: D 级

B: X 级

C: C 级

D: A 级

答案: D

60. 对于 ACEI 类药描述错误的是

A: 唯一的抑制心肌及血管重构药物

B: 抑制血管紧张素转化酶(ACE)活性

C: 明显降低全身血管阻力

D: 抑制交感神经活性作用

答案: D

61. 属于浓度依赖性抗生素的是

A: 林可霉素

B: 青霉素

C: 美沙拉秦肠溶片

D: 多黏菌素

答案: D

62. 结核病化学治疗的基本原则是 ()

A: 早期、联合、适量、规律、全程

B: 早期、联合、足量、规律、全程

C: 早期、单一、足量、规律、全程

D: 早期、单一、适量、规律、全程

答案: A

63. 一般由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

A: 100kcal:1gN

B: NPC5: 5

C: 150kcal:1gN

D: NPC7:3

答案: D

64. 患者女 29 岁孕 25+6 周近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状,化验结果为 Hb71g/L,诊断为缺铁性贫血,予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是 ()

A: 口服, 每次 5ml, 一日 3 次

B: 先静脉注射负荷剂量再静脉滴注余下剂量

C: 先少量缓慢静滴, 观察无过敏反应后再继续静脉滴注余下剂量

D: 快速静脉注射

答案: C

65. 钙制剂+维生素 D+雌激素（选择性雌激素受体调节剂）用于治疗

- A: 妇女绝经后骨质疏松症
- B: 抗癫痫药所致的骨质疏松症
- C: 老年性骨质疏松症
- D: 原发性骨质疏松症

答案：A

66. （2018 年真题）患者，男，65 岁，因腹胀，呕吐就诊，医生处方，甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于（）

- A: 有禁忌证用药
- B: 无适应证用药
- C: 用法、用量不适宜
- D: 有配伍禁忌

答案：C

67. 对于窦性心动过速，最宜选用

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 硝酸酯类
- D: 地高辛

答案：B

68. 下列药物中，可引起黑便的药物为（）

- A: 硫酸铝片
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 铝碳酸镁
- D: 复方氢氧化铝

答案：B

69. 下列药物中，不属于三环类抗抑郁药的是（）

- A: 氟伏沙明
- B: 阿米替林
- C: 氯米帕明
- D: 丙米嗪

答案：A

70. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

- A: 加巴喷丁
- B: 布洛芬
- C: 山莨菪碱
- D: 吗啡

答案：A

71. 患者，男性，35 岁，因间断上腹痛 5 年、加重 1 周来诊。患者自 5 年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1 周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

- A: 化学物质的刺激
- B: 吸烟
- C: 胃窦部幽门螺杆菌感染
- D: 遗传因素

答案：C

72. 适宜于餐前给药的药物是

- A: 复方铝酸铋
- B: 二甲双胍
- C: 缬沙坦
- D: 法莫替丁

答案：A

73. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 阻塞肾小管、肾小球
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾小管坏死
- D: 肾间质纤维化

答案：C

74. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 头孢辛酯片
- B: 莫沙必利片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 伊马替尼片

答案：B

75. 妊娠后 3~5 周服用容易导致胎儿出现肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 四环素
- B: 沙利度胺
- C: 氯霉素
- D: 叶酸拮抗剂

答案：B

76. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

- A: 0.8g，5 次 / 日
- B: 0.8g，3 次 / 日
- C: 0.8g，2 次 / 日
- D: 0.8g，4 次 / 日

答案：B

77. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 左眼

- A: NS
- B: 0
- C: DOL
- D: LD

答案：C

78. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: III 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: 临床预试验

答案：A

79. 使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是()

- A: ALT
- B: APTT
- C: RBC

D: INR

答案：B

80. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

A: 空腹血糖

B: 血红蛋白

C: 糖化血红蛋白

D: 餐后 2 小时血糖

答案：C

81. 用 10%的氯化钠注射液和注射用水配制 3%的氯化钠注射液 100ml, 所需的 10%氯化钠注射液的毫升数是()

A: 10

B: 30

C: 25

D: 33.3

答案：B

82. 静脉滴注红霉素的适宜溶媒是

A: 5%葡萄糖注射液

B: 复方氯化钠注射液

C: 0.9%氯化钠注射液

D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

83. 轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

A: 口服给药

- B: 肌肉注射
- C: 外用给药
- D: 腔道给药

答案：A

84. (2015 年真题) 上市后药品临床再评价阶段是 ()。

- A: IV 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：A

85. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

- A: 人员培训
- B: 管理规范到位
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 科学发展

答案：A

86. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

- A: 洛匹那韦
- B: 阿巴卡韦
- C: 雷特格韦
- D: 奈韦拉平

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/076144151054011030>