

助产班外科护理学练习题与答案

1. 颅内压增高最客观的证据是（）
 - A. 头痛
 - B. 视神经乳头水肿(正确答案)
 - C. 呕吐
 - D. 血压升高
 - E. 心跳缓慢
2. 形成脑疝的根本原因是（）
 - A. 急性颅内压增高
 - B. 慢性颅内压增高
 - C. 严重脑挫裂伤
 - D. 严重颅骨骨折
 - E. 颅内各分腔压力差(正确答案)
3. 关于小脑幕切迹疝的表现，以下不正确的是（）
 - A. 颅内压增高症状进行性加重
 - B. 意识障碍进行性加重
 - C. 患侧瞳孔先缩小再散大
 - D. 患侧肢体中枢性瘫痪(正确答案)
 - E. 晚期双侧瞳孔散大
4. 急性硬脑膜外血肿意识障碍的典型特点是（）
 - A. 原发性昏迷
 - B. 继发性昏迷
 - C. 中间清醒期(正确答案)
 - D. 持续性昏迷
 - E. 浅昏迷
5. 关于颅骨骨折的治疗原则，以下叙述不正确的是（）

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- A. 颅底骨折和颅盖骨的线形骨折，不需特殊处理
- B. 颅盖骨骨折出现神经症状时，需要手术治疗
- C. 颅盖骨骨折线通过脑膜中动脉沟时，应观察硬脑膜外血肿
- D. 颅底骨骨折合并脑脊液漏时，应使用抗生素和 TAT
- E. 颅底骨骨折合并脑脊液漏时，应及早手术修补硬脑膜(正确答案)

6. 男性，67 岁。因严重脑挫裂伤入院。查体：病人处于昏迷状态，GCS 计分 3 分，留置导尿管，已行气管切开，施行鼻饲已 6 日，未解大便。以下除哪项外，都可能是该病人的护理诊断（）

- A. 有泌尿系感染和肺部感染的危险
- B. 有皮肤完整性受损的危险
- C. 自理缺陷
- D. 便秘
- E. 营养失调，高于机体需要量(正确答案)

7. 男性，因头部外伤入院。医疗诊断：脑干损伤。医嘱：冬眠合剂 I 号加入 10%葡萄糖溶液 250ml 中持续静点，持续物理降温。王护士采取了以下措施，哪项不正确（）

- A. 静脉用药前测量生命体征
- B. 静脉用药同时给病人戴冰帽(正确答案)
- C. 定时更换冰袋放置的部位
- D. 维持肛温在 $34^{\circ}\text{C} \sim 33^{\circ}\text{C}$
- E. 定时为病人翻身拍背

8. 护理查房时，某护生对冬眠低温疗法的并发症做了如下回答，不正确的是（）

- A. 低血压
- B. 体液失衡
- C. 脑损害(正确答案)
- D. 褥疮
- E. 肺炎

9. 下列不属于甲亢手术适应证的是（）
- A. 继发性甲亢
 - B. 中度以上甲亢
 - C. 儿童甲亢(正确答案)
 - D. 有压迫症状的甲亢
 - E. 内科治疗效果不佳或复发的甲亢
10. 甲状腺次全切除术后 9 小时，病人出现颈部迅速肿胀、呼吸困难、烦躁不安，应首先考虑（）
- A. 切口内出血(正确答案)
 - B. 喉部水肿
 - C. 气管软化塌陷
 - D. 喉返神经损伤
 - E. 甲状腺危象
11. 以下仅见于原发性甲亢的是（）
- A. 杂音及震颤征
 - B. 手颤及舌颤
 - C. 眼球突出(正确答案)
 - D. 脉压差大
 - E. 食欲亢进
12. 术后甲状腺危象，多发生在手术后（）
- A. 6～12h
 - B. 12～24h
 - C. 12～36h(正确答案)
 - D. 24～36h
 - E. 24～48h
13. 甲状腺次全切除术后第 2 日，宜取的卧位是（）
- A. 平卧位
 - B. 侧卧位

C. 半卧位(正确答案)

D. 头低足高位

E. 自主体位

14. 甲亢手术后最危急的并发症是 ()

A. 喉返神经损伤

B. 呼吸困难和窒息(正确答案)

C. 喉上神经损伤

D. 手足抽搐

E. 甲状腺危象

15. 乳腺癌早期的临床表现是 ()

A. 乳房疼痛

B. 皮肤“橘皮样”变

C. 无痛性肿块(正确答案)

D. 乳头位置异常

E. 出现“酒窝征”

16. 甲亢术后病人出现手足抽搐，应限制的饮食 ()

A. 肉、蛋类(正确答案)

B. 钙盐

C. 脂肪

D. 碳水化合物

E. 维生素

17. 乳癌根治术后，患侧上肢功能锻炼的目标是 ()

A. 能触及对侧耳廓

B. 能上举和下垂

C. 能触及同侧耳廓

D. 能触及头顶

E. 能经头顶扪及对侧耳廓(正确答案)

18. 关于预防急性乳腺炎，以下错误的是 ()

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- A. 每次哺乳要将乳汁排空
 - B. 妊娠期即开始矫正乳头内陷
 - C. 妊娠期经常清洗乳头
 - D. 预防性使用抗生素(正确答案)
 - E. 及时治疗婴儿口腔炎症和乳头皲裂
19. 嵌顿性疝与绞窄性疝最主要区别是 ()
- A. 疝块的大小
 - B. 腹痛的部位
 - C. 触痛的严重程度
 - D. 疝内容物能否回纳
 - E. 疝内容物有无坏死(正确答案)
20. 关于腹外疝的护理，以下错误的是 ()
- A. 术前消除咳嗽、便秘、排尿困难等引起腹内压增高的因素
 - B. 对巨大疝病人，术前劝其卧床休息
 - C. 术后用“丁”字带托起或用小枕抬高阴囊
 - D. 术后鼓励病人早期下床活动，以防止肠粘连(正确答案)
 - E. 告知病人出院后 3 个月内避免重体力劳动
21. 反常呼吸常发生于 ()
- A. 单处肋骨骨折
 - B. 多根多处肋骨骨折(正确答案)
 - C. 单根肋骨多处骨折
 - D. 多根肋骨单处骨折
 - E. 胸壁软组织损伤
22. 多根多处肋骨骨折发生胸壁软化后的急救措施是 ()
- A. 止痛
 - B. 给氧
 - C. 加压包扎固定胸壁(正确答案)
 - D. 胸腔闭式引流

E. 肋骨牵引固定

23. 开放性气胸应首先（）

A. 抗休克

B. 封闭伤口(正确答案)

C. 清创缝合

D. 吸氧

E. 剖胸探查

24. 开放性气胸产生纵隔扑动的主要原因是（）

A. 伤侧肺萎缩

B. 健侧肺膨胀不全

C. 纵隔移向健侧

D. 吸气与呼气时两侧胸腔内压力差改变(正确答案)

E. 伤侧胸膜腔内压力超过大气压

25. 以下哪项护理不利于预防肺部并发症（）

A. 保持呼吸道通畅

B. 疼痛时用吗啡止痛(正确答案)

C. 鼓励深呼吸和有效咳嗽

D. 协助病人翻身、拍背

E. 应用抗生素

26. 关于血胸的护理，以下哪项不正确（）

A. 建立静脉通路

B. 密切观察病情

C. 伤侧锁骨中线第2肋间穿刺抽血(正确答案)

D. 及时用止血药

E. 准备胸穿用物

27. 检查胸腔引流管是否通畅最简单的方法是（）

A. 听病人呼吸音是否正常

B. 检查引流管有无扭曲

C. 观察水封瓶中长玻璃管内水柱波动(正确答案)

D. 观察水封瓶内有无引流液

E. 观察引流管内有无液体

28. 进行性血胸的主要处理措施是（）

A. 剖胸探查止血(正确答案)

B. 应用升压药

C. 输血输液

D. 胸腔闭式引流

E. 吸氧

29. 损伤性血胸，胸腔内积血不凝固的原因是（）

A. 凝血因子减少

B. 出血量多，血液稀释

C. 凝血酶原减少？

D. 肺、心脏及膈肌活动(正确答案)

E. 损伤后发生弥散性血管内凝血

30. 单纯性肋骨骨折用宽胶布固定前应嘱病人（）

A. 深呼气末屏住气(正确答案)

B. 深吸气末屏住气

C. 浅吸气末屏住气

D. 浅呼气末屏住气

E. 正常呼吸

31. 全肺叶切除术后护理，下列哪项不正确（）

A. 拔除气管插管后 4~6 小时，如无禁忌即可进食

B. 输液量 < 3000ml/24h，滴速 < 40 滴/分(正确答案)

C. 如无禁忌在拔除胸腔引流管后即可下床活动

D. 使用足量抗生素

E. 限制氯化钠用量

32. 关于腹腔穿刺的叙述，以下错误的是（）

- A. 髂前上棘与脐连线的中外 1/3 交界处为穿刺点
- B. 抽出不凝固血液，提示腹腔内出血
- C. 抽出血液迅速凝固，提示误穿入血管
- D. 抽出胃内容物，提示胃肠道损伤
- E. 穿刺阴性，说明无腹腔内脏器损伤(正确答案)

33. 关于盆腔脓肿的护理，以下错误的是（）

- A. 观察有无直肠刺激症状
- B. 早期定时温盐水灌肠
- C. 安置病人于半卧位
- D. 术后 24~48h 拔除引流管(正确答案)
- E. 嘱病人高营养饮食

34. 以下除哪项外，均不是原发性腹膜炎的病因（）

- A. 腹腔内脏器穿孔
- B. 腹腔内脏器破裂
- C. 病原菌经血行到达腹腔(正确答案)
- D. 腹腔内脏器炎症
- E. 腹腔内脏器手术污染

35. 男，28 岁，因车祸撞伤腹部，腹痛难忍，伴恶心、呕吐，腹膜刺激征(+)。以下处理哪项不妥。（）

- A. 禁食、输液
- B. 给予胃肠减压
- C. 给予大剂量抗生素
- D. 给予吗啡止痛(正确答案)
- E. 行腹部 X 线透视检查

36. 下列哪个内脏损伤后，可暂无症状，而在数日或数周后出现急性大出血症状（）

- A. 胰脏
- B. 肾脏

C. 脾脏(正确答案)

D. 胆囊

E. 膀胱

37. 诊断急性腹膜炎的可靠体征是 ()

A. 腹胀

B. 肝浊音界缩小

C. 腹膜刺激征(正确答案)

D. 肠鸣音减弱

E. 移动性浊音。

38. 胃大部切除术后 4 日，出现不含胆汁的频繁呕吐，可能是 ()

A. 胃肠吻合口炎症水肿(正确答案)

B. 近侧空肠段梗阻

C. 远侧空肠段梗阻

D. 倾倒综合征

E. 低钾血症

39. 胃十二指肠溃疡急性大出血，有明显的休克表现，估计失血量为 ()

A. 300~400ml

B. 400~500ml

C. 500~600ml

D. 600~700ml

E. 800ml 以上(正确答案)

40. 下列哪种肠梗阻，需要尽快做好紧急手术前准备 ()

A. 急性肠扭转(正确答案)

B. 早期肠套叠

C. 麻痹性肠梗阻

D. 蛔虫性肠梗阻

E. 粘连性肠梗阻

41. 绞窄性肠梗阻的腹痛特点是 ()

- A. 阵发性绞痛
- B. 持续性隐痛
- C. 持续性腹痛阵发性加剧(正确答案)
- D. 全腹胀痛
- E. 刀割样疼痛

42. 阑尾切除术后早期，应注意观察的并发症是（）

- A. 盆腔脓肿
- B. 膈下脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 内出血(正确答案)

43. 当化脓性阑尾炎细菌侵入阑尾系膜小静脉时，可引起的严重并发症是（）

- A. 坏疽性阑尾炎
- B. 阑尾穿孔腹膜炎
- C. 阑尾周围脓肿
- D. 腹腔脓肿
- E. 化脓性门静脉炎(正确答案)

44. 下列肛门疾患不需手术治疗的是（）

- A. 肛门周围脓肿
- B. 肛瘘
- C. 前哨痔(正确答案)
- D. 外痔血栓形成
- E. 肛裂

45. 男性，50岁。阑尾穿孔腹膜炎手术后第5日，体温39℃，切口无红肿，大便次数增多，混有粘液，伴里急后重，应考虑并发（）

- A. 盆腔脓肿(正确答案)
- B. 膈下脓肿
- C. 肺部感染

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

D. 肠道感染

E. 切口感染

46. 某病人行肛瘘切除术后，每日须行温水坐浴和换药，合理的安排是（）

A. 换药一大便一坐浴

B. 坐浴一换药一大便

C. 大便一换药一坐浴

D. 坐浴一大便一换药

E. 大便一坐浴一换药。(正确答案)

47. 下列哪项不是痔的成因（）

A. 便秘

B. 排尿困难

C. 门静脉高压

D. 长期腹泻(正确答案)

E. 妊娠

48. 肠梗阻解除的主要标志是（）

A. 腹痛减轻

B. 呕吐减少

C. 腹胀减轻

D. 肛门排便排气(正确答案)

E. 肠鸣音减弱

49. 引起腹外疝的两个主要原因为(C)

A. 妊娠与重体力劳动(正确答案)

B. 腹水与便秘

c. 腹壁强度低与腹内高压

D. 外伤与感染造成腹壁缺损

E. 腹股沟管与股管宽大

50. 护理疝修补术后病人时，下列哪项是错误的（）

A. 及时处理粪便秘结

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077012111142010023>