妇产科护理学》复习题及答案

妇产科护理学》复题及答案

一、单选题

1.维持子宫前倾位的主要韧带是（）

A。主韧带 B。宫骶韧带 C。圆韧带 D。阔韧带 E。骶棘韧带

正确答案：B。宫骶韧带

2.月经后子宫内膜有下列哪层修复（）

A。功能层 B。基底层 C。肌层 D。蜕膜层 E。浆膜层

正确答案：B。基底层

3.胎儿附属物不包括（）

A。胎盘 B。胎膜 C。脐带 D。羊水 E。蜕膜

正确答案：E。蜕膜

4.妊娠前 5 个月胎儿身长（cm)计算公式为（）

A。月数×5 B。月数×4 C。月数×3 D。月数×2 E。月数平方

正确答案：C。月数×3

5.妊娠期母体的变化，错误的是（）

A。妊娠 32～34 周血容量增加达高峰 B。妊娠晚期易发生外阴及下肢静脉曲张

C。子宫峡部在妊娠 12 周后逐渐形成子宫下段

D。妊娠末期孕妇血液处于低凝状态

E。妊娠期卵巢不排卵

正确答案：E。妊娠期卵巢不排卵

6.初产妇胎头衔接的时间一般在（）

A。预产期前 2～3 周 B。分娩前 24～48 小时 C。临产后 D。破膜后

正确答案：B。分娩前 24～48 小时

7.下述属于第二产程临床表现的是（）

A。子宫颈口扩张 B。宫颈管消失 C。胎头拨露 D。胎盘剥离 E。胎盘娩出

正确答案：C。胎头拨露

8.初乳的特点错误的是（）

A。含分泌型 IgA 较成熟乳多 B。初乳中脂肪和乳糖含量较成熟乳多

C。初乳是指产后 7 日内分泌的乳汁 D。初乳中含蛋白质较成熟乳多

E。初乳含 β—胡萝卜素呈淡黄色

正确答案：C。初乳是指产后 7 日内分泌的乳汁

9.可能引起凝血功能障碍的流产类型是（）

A。先兆流产 B。难免流产 C。不全流产 D。惯流产 E。稽留流产

正确答案：E。稽留流产

10.胎盘早剥的病因哪项错误（）

A。血管病变 B。外伤 C。子宫腔内压骤降 D。胎盘面积过大 E。外转胎位术操作不当

正确答案：D。胎盘面积过大

11.早产的护理措施哪项除外（）

A。先兆早产应卧床休息，避免刺激 B。使用宫缩抑制剂抑制宫缩

C。产前给孕妇注射地塞米松促胎肺成熟

D。产前给孕妇注射维生素 K 预防早产儿颅内出血

E。胎儿较小容易分娩，尽量不作会阴切开

正确答案：E。胎儿较小容易分娩，尽量不作会阴切开

12.中骨盆平面狭窄常表现为（）

A。持续性枕后位或枕横位 B。臀位 C。产程进展过快

D。羊水过多 E。横位

正确答案：B。臀位

13.下列哪项不是胎儿窘迫的表现（）

A。胎心率＞160 次／分钟 B。胎儿头皮血 Ph＜7．20

C。头先露羊水呈绿色 D。胎动<10 次／12 小时

E。宫缩时胎心率<120 次／分钟

正确答案：C。头先露羊水呈绿色

14.会阴切开缝合术后护理，错误的是（）

A。常规做好会阴护理 B。每日用苯扎溴铵棉球擦洗外阴 2 次

C。会阴水肿可用 95％乙醇湿敷 D。伤口化脓延期拆线

E。伤口正常 5 天拆线

正确答案：D。伤口化脓延期拆线

15.了解子宫位置、大小及形状的最常用检查方法是（）

A。外阴检查 B。窥器检查 C。双合诊

正确答案：C。双合诊

16.女性生殖器中最常见的恶性肿瘤是什么？

A。外阴癌 B。子宫颈癌 C。癌 D。子宫内膜癌 E。卵巢癌

17.以下哪项不是诊断葡萄胎的依据？

A。停经后流血及妊娠反应严重 B。子宫大于妊娠月份、柔软

C。血、尿中 HCG 测定高于正常水平 D。排出水泡状物

E。B 超检查见妊娠囊和胎心

18.关于无排卵性功血，下列哪项不正确？

A。青春期、围绝经期多见 B。卵巢无排卵 C。生育期多见

D。月经周期紊乱 E。内膜呈增生期改变

19.造成子宫脱垂的主要病因是什么？

A。分娩损伤 B。产褥期过早体力劳动 C。腹压长期增加

D。盆底组织发育不良 E。盆底组织退行性改变

20.下面哪项不是心脏病孕妇的护理措施？

A。避免过度劳累及情绪激动 B。每日睡眠至少 10 小时

C。防治贫血及上呼吸道感染 D。如有便秘，应予灌肠

E。预产期前 2 周住院待产

21.下面哪项不属于胎盘功能检查范畴？

A。尿雌三醇测定 B。缩宫素激惹试验（OCT） C。B 超检查

D。雌激素与肌酐（E/C）比值测定 E。胎儿大小

22.下述哪项属于第一产程表现？

A。子宫颈口扩张 B。拨露 C。着冠 D。胎儿娩出 E。胎盘娩出

23.早期流产是指什么？

A。妊娠于 8 周前终止 B。妊娠于 8～12 周终止

C。妊娠于 12 周前终止 D。妊娠于 12～28 周终止 E。妊娠于 20 周前终止

24.关于不全流产的处理，下面哪项是错误的？

A。严密观察，待出血多时行清宫术 B。确诊不全流产，立即清宫

C。清宫术时可静滴缩宫素 D。术后给抗生素

E。出血多者，应在输液输血的同时清宫

25.妊娠合并贫血对妊娠的影响，正确的是什么？

A。孕妇抵抗力低下，易导致感染 B。可造成胎儿生长受限

C。早产发生率增加 D。可导致胎儿窘迫，甚至死胎 E。以上均正确

26.为预防产后出血，胎盘娩出后不妥的护理措施是什么？

A。按摩子宫底 B。观察宫底高度和硬度 C。避免膀胱充盈

D。建立静脉通道，输血 E。检查胎盘胎膜的完整性

27.产褥感染中最常见的是什么？

A。急性输卵管炎 B。急性外阴炎 C。急性盆腔结缔组织炎

D。急性子宫内膜炎 E。急性盆腔腹膜炎

28.使用胎头吸引术助产时，牵引时间不宜超过多久？

A。10 分钟 B。15 分钟 C。20 分钟 D。25 分钟 E。30 分钟

29.某孕妇子宫底于脐上 3 指，估计妊娠时间是多久？

A。12 周末 B。16 周末 C。24 周末 D。28 周末 E。32 周末

30.XXX27 岁，已停经 37 周，突然出现无明显诱因的出血半小时，腹部检查未发现压痛，胎位正常，胎心 146 次/分钟，可见少量活动性出血。最可能的诊断是（）。

A。胎盘早剥

B。早产

C。前置胎盘

D。自然临产

E。凝血功能障碍

31.产妇 30 分钟前胎儿已经娩出，20 分钟后胎盘也娩出，但持续出血，检查发现胎盘不完整。首选措施是（）。

A。按摩子宫

B。按摩子宫，同时肌内注射宫缩剂

C。积极术前准备

D。清宫

E。监测生命体征，注意观察尿量

32.新生儿出生后 1 分钟内情况是：心率 92 次/分钟，无呼吸，四肢稍屈，有喉反射但无咳嗽，躯干红，四肢青紫。按新生儿 Apgar 评分为（）。

A。4 分

B。5 分

C。6 分

D。7 分

E。8 分

33～35 题共用题干) XXX29 岁，初产妇，妊娠 41 周。突然出现腹痛，前往医院就诊。骨盆外测量径线：髂棘间径 23cm，髂嵴间径 26cm，骶耻外径 18cm，出口横径 9cm。产科检查发现头先露，胎心正常，估计胎儿体重约 3600g。跨耻征可疑阳性。

33.产妇的骨盆情况最可能为（）。

A。漏斗骨盆

B。可疑头盆不称

C。均小骨盆

D。畸形骨盆

E。扁平骨盆

34.拟定试产，试产时间应为（）。

A。1 小时

B。2～4 小时

C。5～7 小时

D。8～10 小时

E。11～12 小时

35.试产 1 小时后，检查宫口已开大 4cm 并行人工破膜后，流出浅绿色的混浊羊水，提示（）。

A。宫内感染

B。胎盘早剥

C。胎儿窘迫

D。胎儿死亡

E。先兆子宫破裂

36～37 题共用题干) 28 岁妇女，孕 38 周，行会阴左侧切开术分娩。

36.该产妇术后的日常护理错误的是（）。

A。保持外阴清洁

B。嘱患者健侧卧位

C。用碘伏棉球擦洗外阴，每日 1 次

D。大便后也需擦洗

E。及时更换会阴垫

37.产后 3 天，护理评估时发现会阴切口处红肿，有轻压痛。应采取的护理措施是（）。

A。绝对卧床休息

B。流质饮食

C。床脚抬高

D。药液温水坐浴

E。红外线照射

38~40 题共用备选答案)

A。耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点间的距离

B。两侧坐骨棘间的距离

C。两侧坐骨结节前端内侧缘距离

D。两侧髂前上棘外缘距离

E。两侧坐骨结节前端外侧缘距离

38.骨盆出口横径（）。

39.中骨盆横径（）。

40.骨盆人口前后径（）。

41～43 题共用备选答案)

A。宫缩乏力

B。胎盘剥离不全

C。软产道损伤

D。子宫胎盘卒中

E。凝血功能障碍

41.以下出血最可能的原因是：

41.在胎盘娩出前，出现间歇性大量出血，颜色为暗红，带有血块。

42.胎盘娩出后，大量出血，宫体软，轮廓不清。

43.胎儿娩出后，持续出现鲜红色出血。

44-45.可以使用以下哪种方法治疗滴虫性炎或外阴假丝酵母菌性病？

A。甲硝唑

B。全身或局部给予小剂量雌激素

C。全身广谱抗生素

D。2%碳酸氢钠溶液

E。物理局部治疗

46.在月经周期的第几天，雌激素和孕激素同时达到高峰？

B。9-14 天

47.早期妊娠是指怀孕多少周以前？

A。8 周

48.临产后，哪种力量是主要的产力？

A。子宫收缩力

49.第一产程的主要临床表现是什么？

A。宫口扩张

50.产后多久在腹部扪不到宫底？

C。2 周左右

51.新生儿吸吮母亲可以促进哪种物质的分泌，有助于子宫收缩？

B。催乳素

52.先兆流产最早出现的症状是什么？

D。少量流血

53.前置胎盘出血的特点是什么？

A。无痛性流血

54.妊娠合并心脏病的处理，以下哪项是不正确的？

B。不宜妊娠者，应 12 周以前行人工流产术

55.巨幼红细胞性贫血的病因是什么？

C。缺乏维生素 B12 及叶酸

56.关于子宫，哪项是正确的？

C。子宫体与子宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部

57.子宫内膜最适于受精卵着床的时期是什么时候？

B。分泌期

58.正常胎心率的范围是多少？

C。120-160 次/分

59.最小的骨盆平面是什么？

无法回答，因为缺少备选答案。

A。骨盆入口平面、B。中骨盆平面、C。骨盆出口平面、D。骨盆轴。正确的指导产妇屏气的时间是在第二产程进行，且在做好接生准备的情况下进行。

产后六小时，一产妇的体温为 38℃，脉搏为 68bpm，BP 为 120 / 80mmHg。适当的回答是解释因分娩关系，所以体温稍有增高。

一产妇产后第四天，乳房胀，因为觉得穿胸罩不舒服而未穿。护士指导她要穿胸罩，理由是为了予以乳房适当支托，促进乳腺管通畅。

急诊异位妊娠的病人在进行妇科检查时不会出现宫颈有明显的举痛的体征。

下列情况中易并发胎盘早期剥离的是妊娠高血压综合征。

下列哪项不是妊娠合并糖尿病的产科并发症？是新生儿高血糖。

造成子宫收缩乏力的原因不正确的是胎先露压迫宫颈时间过长。

骨盆入口平面狭窄时主要引起胎儿先露不能衔接。

有关狭窄骨盆的处理原则，严重畸形骨盆应该剖宫产，均小骨盆，如胎儿估计不大可试产，轻度头盆不称可试产，中骨盆狭窄先露达坐骨棘水平，可经助产。

持续性枕后位的特点是产妇感肛门坠胀，过早屏气用力。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/077035145141010023