专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2023-24年湖北省建始县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题完整版附答案

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是()

A：吡嗪酰胺

B：对氨基水杨酸

C：利福平

D：乙胺丁醇

答案：D

2.（2019年真题）用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达600mg，但一般应控制在100mg以内的利尿剂是（）

A：托拉塞米

B：依他尼酸

C：呋塞米

D：布美他尼

答案：C

3.低分子量肝素的作用靶点是

A：因子Xa

B：因子IIa

C：凝血酶III（AT—III）

D：因子IXa

答案：C

4.（2017年真题）药师在急诊药房值班时,接听病房咨询电话,得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的7岁儿童患者,出现高热、肺纹加重,患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

A: 头孢曲松

B: 阿米卡星

C: 头孢哌酮

D: 替考拉宁

答案：D

5.噻嗪类利尿药略增加HCO3-的排泄，是因为其可以抑制

A: 碳酸酐酶

B: Na+-Cl⁻共转运子

C: 磷酸二酯酶

D: Na+-K+-2Cl⁻同向转运子

答案：A

6.按作用时间分类，属于超长效的胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 地特胰岛素

C: 预混胰岛素

D: 普通胰岛素

答案：B

7.患者，女，26岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

A: 特布他林

B: 普茶洛尔

C：利多卡因

D：碘化钾

答案：B

8.中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A：化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

B：化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

C：化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

D：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

答案：C

9.治疗金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎及关节感染的首选药是

A：林可霉素类

B：氨基糖苷类

C：头孢菌素类

D：大环内酯类

答案：A

10.甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

A：促进代谢类药物及维生素

B：解毒类药

C：抗炎类药

D：必需磷脂类

答案：C

11.良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

A: 延缓疾病临床进展
B: 缓解患者的下尿路症状
C: 缓解患者的上尿路症状
D: 预防急性尿潴留
答案：B

12.属于Ⅰc类抗心律失常药的是
A: 利多卡因
B: 奎尼丁
C: 普罗帕酮
D: 胺碘酮
答案：C

13.日晒时有光敏现象的药品是
A: 头孢哌酮
B: 多西环素
C: 加替沙星
D: 庆大霉素
答案：B

14.肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵
A: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病
B: 可升高门脉压力，诱发出血
C: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病
D: 可降低门脉压力，诱发出血
答案：A

15.下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

A：诺氟沙星
B：氧氟沙星
C：环丙沙星
D：氟罗沙星
答案：B

16.（2016年真题）患者，女，26岁，妊娠3个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是
A：阿莫西林
B：青霉素G
C：头孢氨苄
D：左氧氟沙星
答案：D

17.属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是
A：氯苯那敏
B：唑吡坦
C：苯妥英钠
D：丙戊酸钠
答案：C

18.普通儿童感冒患者,体温升高(>385° C),宜选用的药物是()
A：茶碱缓释片
B：氯苯那敏片
C：对乙酰氨基酚滴剂
D：右美沙芬片
答案：C

19.下述药物可引起药物性鼻炎的是

A：酚甘油滴耳液

B：过氧化氢溶液

C：硼酸甘油滴耳液

D：麻黄碱

答案：D

20.嵌入DNA干扰转录RNA的抗恶性肿瘤药是

A：环磷酰胺

B：多柔比星

C：吉非替尼

D：5-氟尿嘧啶

答案：B

21.用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染的药物是

A：万古霉素

B：克拉霉素

C：红霉素

D：克林霉素

答案：A

22.引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于5岁以下儿童的药物是

A：奥布卡因

B：阿托品

C：羟苄唑

D：20%甘露醇

答案：B

23.（2018年真题）可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是（）

A：阿司匹林

B：双氯芬酸

C：对乙酰氨基酚

D：塞来昔布

答案：A

24.关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A：是二氢叶酸合成酶抑制剂

B：强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

C：主要用于治疗急性白血病

D：是二氢叶酸还原酶抑制剂

答案：A

25.患者男性，56岁。有糖尿病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

A：格列齐特

B：短效胰岛素

C：珠蛋白锌胰岛素

D：三碘甲状腺原氨酸

答案：B

26.麻黄碱滴鼻剂的适应证是

A：药物性鼻炎

B：鼻黏膜充血

C: 萎缩性鼻炎

D: 过敏性鼻炎

答案：B

27.严重中毒性感染采用

A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

B: 抗结核病药与糖皮质激素合用

C: 糖皮质激素小剂量代替疗法

D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：D

28.扎鲁司特属于

A: M胆碱受体阻断剂

B: 白三烯调节剂

C: β 肾上腺素受体激动剂

D: 黄嘌呤类药物

答案：B

29.（2019年真题）原发性肾病综合征患者，在院治疗时给予“注射用甲泼尼龙40mgqd”静脉滴注，出院前调整为等效剂量的口服药物序贯治疗，适宜的方案是（）

A: 泼尼松片20mgqd

B: 泼尼松片30mgqd

C: 泼尼松片50mgqd

D: 地塞米松片10mgqd

答案：C

30.属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

A: 孟鲁司特
B: 异丙托溴铵
C: 沙丁胺醇
D: 茶碱
答案：A

31.主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是
A: 瑞舒伐他汀
B: 阿昔莫司
C: 依折麦布
D: 利血平
答案：A

32.关于NSAIDS类药物所致不良反应的说法，正确的是()
A: 非选择性NSAIDS类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
B: NSAIDs类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见
C: 非选择性NSAIDS类药物导致的心血管风险高于选择性COX-2抑制剂
D: 选择性COX-2抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性NSAIDS类药物
答案：A

33.与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是
A: 甲氨蝶呤
B: 阿糖胞苷
C: 柔红霉素
D: 右雷佐生月德
答案：C

34.（2015年真题）属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的是（）。

A: 阿米替林

B: 文拉法辛

C: 吗氯贝胺

D: 氟西汀

答案：D

35.通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

A: 甲苯咪唑

B: 哌嗪

C: 左旋咪唑

D: 阿苯达唑

答案：A

36.以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

A: 收缩压<90mmHg的严重低血压

B: 梗阻性肥厚型心肌病

C: 急性前壁心肌梗死

D: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄

答案：C

37.是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘9%～12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

A: 过氧乙酸
B: 聚维酮碘
C: 依沙吖啶
D: 氯己定
答案：B

38.患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:（1）心绞痛急性发作;（2）心功能不全、心功能III级;（3）高血压病3级;（4）高脂血症。
A: 硝酸甘油片已经过期
B: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
C: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
D: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服
答案：C

39.患者，男，55岁。1小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B型超声波检查：肾结石。
A: 镇痛和解痉作用
B: 增加镇痛作用
C: 增加解痉作用
D: 防止成瘾
答案：A

40.口服可用于防治血栓性疾病如心肌梗死和脑梗死的是

A：肝素

B：维生素K

C：维生素B

D：香豆素类

答案：D

41.促进子宫颈成熟的是()

A：米非司酮

B：达那唑

C：普拉睾酮

D：戈那瑞林

答案：C

42.与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

A：四环素

B：苯巴比妥

C：环孢素

D：利福平

答案：C

43.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A：脑瘤

B：慢性淋巴细胞白血病

C：纤维瘤

D：恶性淋巴瘤

答案：A

44.患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

A：血常规

B：茶碱血药浓度

C：腹部B超

D：胸部CT

答案：B

45.可中效、稳定的降低糖化血红蛋白的是

A：西格列汀

B：吡格列酮

C：阿卡波糖

D：胰岛素皮下注射

答案：A

46.与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

A：维生素D

B：铁剂

C：双膦酸盐类骨吸收抑制剂

D：钙剂

答案：C

47.作用更为持久和抑制新骨形成的作用极低，可长期滞留于骨组织中，半衰期最长可达300日的第二代钙代谢调节药是

A：帕米膦酸二钠

B：唑来膦酸

C：依替膦酸二钠

D：阿仑膦酸钠

答案：A

48.常用的外用痤疮治疗药不包括

A：维A酸

B：特比萘芬

C：过氧苯甲酰

D：阿达帕林

答案：B

49.双香豆素与保泰松合用可

A：产生协同作用

B：与其竞争结合血浆蛋白

C：诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

D：竞争性对抗

答案：B

50.可用于对乙酰氨基酚中毒解救，颗粒剂还能加入果汁中服用的祛痰药物是

A：溴己新

B：羧甲司坦

C：氨溴索

D：乙酰半胱氨酸

答案：D

51.阿卡波糖是

A：α-葡萄糖苷酶抑制剂

B：中效类胰岛素

C：磺酰脲类

D: 长效类胰岛素

答案：A

52.羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶A的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶A还原酶（HMG—CoA还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

A: 阿托伐他汀

B: 辛伐他汀

C: 瑞舒伐他汀

D: 普伐他汀

答案：B

53.支气管哮喘急性发作时宜使用的药物是（）

A: 孟鲁司特钠咀嚼片

B: 吸入用布地杂德混悬液

C: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

54.（2016年真题）铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

A: 罗红霉素

B: 利奈唑胺

C: 头孢曲松

D: 头孢他啶

答案：D

55.（2021年真题）患者，男，54岁。拟行膝关节置换术，围手术期宣选用的预防用抗菌药物（）

A: 头孢噻肟

B: 头孢唑林

C: 头孢曲松

D: 头孢他啶

答案：B

56.具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类伐物是()

A: 预混胰岛素注射液

B: 精蛋白锌胰岛素注射液

C: 普通胰岛素注射液

D: 甘精胰岛素注射液

答案：D

57.关于他汀类药物降脂特点的描述，错误的是

A: 降低高密度脂蛋白固醇(HDL-ch)

B: 降低血总胆固醇(TC)

C: 降低血低密度脂蛋白固醇(LDL-ch)

D: 较弱的降低三酰甘油(TG)的作用

答案：A

58.属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

A: 多索茶碱

B: 孟鲁司特

C: 布地奈德

D: 沙美特罗

答案：B

59.胃肠道不良反应较轻的是

A：硫酸亚铁片

B：硫酸亚铁缓释片

C：硫酸亚铁糖浆

D：琥珀酸亚铁胶囊

答案：B

60.毛果芸香碱对眼的作用是

A：扩瞳、升眼压，调节麻痹

B：缩瞳、降眼压，调节痉挛

C：缩瞳、升眼压，调节痉挛

D：扩瞳、降眼压，调节痉挛

答案：B

61.适用心绞痛患者的钙通道阻滞剂药物是

A：哌唑嗪

B：硝酸甘油

C：硝苯地平

D：普萘洛尔

答案：C

62.用1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A：收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

B：收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

C：收缩血管，降低其通透性

D：收缩血管，减轻炎症反应

答案：A

63.服用叶酸治疗巨幼细胞贫血，需同时联合使用的药品是()

A: 维生素B2

B: 维生素B1

C: 对乙酰氨基酚

D: 维生素B12

答案：D

64.患者，男，35岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

A: 氯霉素

B: 庆大霉素

C: 林可霉素

D: 哌拉西林

答案：D

65.抑制碳酸酐酶，利尿作用弱的药物是

A: 氨苯蝶啶

B: 乙酰唑胺

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案：B

66.强阿片类药物注射剂连续应该3-5日易出现

A: 尿频、尿急、尿潴留

B: 身体和精神依耐性

C: 便秘、恶心、镇静功能受损

D：认知障碍

答案：B

67.红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

A：白喉带菌者

B：婴幼儿支原体肺炎

C：空肠弯曲杆菌肠炎

D：骨髓炎

答案：D

68.对呼吸无抑制的外周性镇咳药是

A：苯丙哌林

B：右美沙芬

C：N-乙酰半胱氨酸

D：可待因

答案：A

69.关于治疗功能性胃肠病药的叙述，不正确的是

A：匹维溴铵宜空腹吞服

B：曲美布汀可使胃排空功能的减弱得到改善

C：匹维溴铵为钡灌肠做准备时，应于检查前3日开始用药

D：匹维溴铵可用于对症治疗与胆道功能紊乱有关的疼痛

答案：A

70.以下使用雌激素类药物的方法错误的是

A：有子宫的女性在周期的最后5～7日加用孕激素

B：应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应

C：女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药3周后停药1周

D: 男性患者采用周期性治疗。即用药3周后停药1周

答案：A

71.患者女性，40岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。

A: 碳酸钙

B: 维生素C

C: 碳酸氢钠

D: 维生素B

答案：C

72.可拮抗维生素B6或增加维生素B6经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

A: 异烟肼

B: 雌激素

C: 糖皮质激素

D: 丙磺舒

答案：A

73.散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

A: 碘苷滴眼液

B: 左氧氟沙星滴眼液

C: 毛果芸香碱滴眼液

D: 复方托吡卡胺滴眼液

答案：D

74.下列药物属于肾素抑制剂的是()

A: 硝苯地平

B: 阿利克仑

C：卡托普利

D：普萘洛尔

答案：B

75.以下关于睾酮替代治疗的描述，错误的是

A：在补充雄激素前，应常规进行前列腺直肠指检

B：丙酸睾酮应采用静脉注射

C：长期应用高剂量雄激素注意监测电解质、心功能与肝功能

D：最好选择能模拟睾酮生理分泌节律的药物

答案：B

76.氨基糖苷类作用机制

A：干扰细菌核酸代谢

B：抑制细菌细胞壁合成

C：抑制细菌蛋白质合成

D：抑制细菌糖代谢

答案：C

77.抗菌谱极窄，仅对细胞外的结核分枝杆菌有抑制作用的是

A：克拉霉素

B：氨曲南

C：红霉素

D：对氨基水杨酸

答案：D

78.扩张脑血管作用较强,能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是（）

A：拉西地平

B：尼莫地平

C: 氨氯地平

D: 非洛地平

答案：B

79.大剂量炔诺酮()

A: 抗着床

B: 减少精子数目

C: 促进蛋白质合成

D: 抑制排卵作用

答案：A

80.与胆汁酸结合而降血脂的药物是

A: 烟酸

B: 洛伐他汀

C: 氯贝丁酯

D: 考来烯胺

答案：D

81.奥司他韦对下列哪种病毒有效

A: 甲型、乙型流感病毒

B: 巨细胞病毒

C: 甲型肝炎病毒

D: 疱疹病毒

答案：A

82.地高辛最适合用于()

A: 肺源性心脏病

B: 急性心力衰竭

C：心律失常

D：心力衰竭伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全

答案：D

83.华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()。

A：依诺肝素

B：维生素B

C：维生素B

D：维生素B

答案：A

84.阿片类药物可影响患者驾驶能力属于

A：身体和精神依耐性

B：便秘、恶心、镇静功能受损

C：认知障碍

D：尿频、尿急、尿潴留

答案：C

85.用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A：雷洛昔分

B：地塞米松

C：米非司酮

D：黄体酮

答案：A

86.对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

A：咪康唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/077043063056010024